

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

妇科护理学

模拟试卷(二)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(二)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 肝门静脉压力增高时,下列病理变化中最早出现的是
 - 腹水
 - 充血性脾大
 - 上消化道出血
 - 食管胃底静脉曲张
 - 腹壁静脉怒张
- 属于手术室限制区的是
 - 走廊
 - 更衣室
 - 手术间及刷手间
 - 休息室
 - 敷料准备间
- 肛裂好发生于膝胸位时的
 - 12 点处
 - 8 点处
 - 10 点处
 - 4 点处
 - 3 点和 6 点处
- 在普查和诊断肺癌时,下列检查占重要地位的是
 - 肺功能检查
 - 胸部 X 线摄片检查
 - 痰细胞学检查
 - 纤维支气管镜检查
 - 胸腔积液检查
- 胎盘早剥的病因除外
 - 妊娠高血压综合征
 - 外伤
 - 肾炎
 - 母体有血管病变
 - 胎膜早破
- 肿瘤转移途径最常见的是
 - 直接蔓延
 - 跳跃性转移
 - 血行转移
 - 种植性转移
 - 淋巴道转移
- 股骨下 1/3 骨折,易造成
 - 股动脉损伤
 - 腓动脉损伤
 - 皮神经损伤
 - 肱静脉损伤
 - 坐骨神经损伤
- 阴道毛滴虫最适合的生长环境 pH 为
 - 2~3.5
 - 3.6~4.2
 - 4.3~5.2
 - 5.5~6
 - 6.3~6.8
- 导致产后出血原因中最常见的是
 - 胎盘残留
 - 胎盘嵌顿
 - 软产道损伤
 - 血友病
 - 子宫收缩乏力
- 外科最常见的脱水类型是
 - 原发性脱水
 - 慢性脱水
 - 高渗性脱水

- D.低渗性脱水
E.等渗性脱水
- 11.胃癌的转移途径中主要是
- A.直接浸润
B.淋巴转移
C.血行转移
D.腹腔种植
E.肝肾转移
- 12.可以反映心脏后负荷的指标是
- A.血压
B.脉搏
C.中心静脉压
D.肺动脉楔压
E.周围血管阻力
- 13.阻塞性肺气肿的病理分型按累及肺小叶的部位,可分为
- A.小叶中央型、气肿型、混合型
B.小叶中央型、气肿型、全小叶型
C.小叶中央型、全小叶型、混合型
D.气肿型、全小叶型、混合型
E.全小叶型、气肿型、支气管炎型
- 14.病毒性脑炎最常见的病原体是
- A.肠道病毒
B.科萨奇病毒
C.EB病毒
D.腺病毒
E.疱疹病毒
- 15.临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是
- A.窒息、产伤
B.脑血管先天畸形
C.脑膜炎
D.血友病
E.输注高渗液体
- 16.以下疾病可表现为前囟早闭或过小的的是
- A.佝偻病
B.小头畸形
C.呆小病
D.早熟
E.脑肿瘤
- 17.乳牙出齐的年龄一般在
- A.10~12个月
B.12~18个月
C.20~24个月
D.2~2.5岁
E.3~3.5岁
- 18.最严重的肾损伤类型是
- A.肾挫伤
B.肾盂部分裂伤
C.肾实质部分裂伤
D.肾横断
E.肾蒂损伤
- 19.微循环的灌注状态取决于
- A.心功能、血容量、血压
B.心功能、周围血管张力、脉压
C.血容量、血压、周围血管张力
D.心功能、血容量、周围血管张力
E.血容量、脉压、周围血管张力
- 20.每人每天需要氨基酸的量是
- A.0.6~1.0 g/(kg·d)
B.1.0~1.5 g/(kg·d)
C.1.3~1.8 g/(kg·d)
D.2.0~2.5 g/(kg·d)
E.2.6~3.0 g/(kg·d)
- 21.确诊恶性肿瘤最可靠的方法是
- A.血清酶学检查
B.CT
C.MRI
D.病理检查
E.X线造影
- 22.确诊菌血症的可靠证据是
- A.表现脉搏、呼吸快,体温高
B.神志淡漠、嗜睡
C.出现黄疸、皮下淤血
D.肝、脾大
E.血细菌培养阳性
- 23.成年人体液量约占体重的

- A.35%
B.45%
C.50%
D.60%
E.65%
- 24.丹毒指的是
A.急性管状淋巴管炎
B.急性网状淋巴管炎
C.疖病
D.淋巴结炎
E.痈
- 25.肠套叠病人特征性 X 线表现为
A.杯口状阴影
B.鸟嘴状阴影
C.立位 X 线片见多个气-液平面
D.鱼肋骨刺征
E.充盈缺损
- 26.正常 5 个月小儿的体重是出生体重的
A.1.5 倍
B.2 倍
C.3 倍
D.3.5 倍
E.5 倍
- 27.输卵管通液检查的禁忌情况是
A.月经干净 5 天
B.术前体温 36.8 °C
C.阴道炎治疗中
D.婚后 2 年不孕
E.脂肪瘤
- 28.暴发性脑膜炎的病原体是
A.大肠埃希菌
B.肺炎链球菌
C.金黄色葡萄球菌
D.流感嗜血杆菌
E.脑膜炎双球菌
- 29.急性心肌梗死临床上特征性的心电图改变是
A.ST 段弓背向上抬高
B.ST 段弓背向下
C.高大的 R 波
D.ST 段水平下移
E.T 波倒置
- 30.与慢性胃炎发病有关的细菌为
A.大肠埃希菌
B.沙门球菌
C.空肠弯曲菌
D.幽门螺杆菌
E.嗜盐杆菌
- 31.胃壁细胞的功能是分泌
A.盐酸
B.胃蛋白酶
C.血清促胃液素
D.胃泌素
E.雌激素
- 32.出生时存在但 3~4 个月后消失的反射是
A.拥抱反射
B.喉反射
C.腹壁反射
D.角膜反射
E.吞咽反射
- 33.引起新生儿颅内出血的病因除外
A.产伤
B.臀位产
C.滴注高渗性溶液
D.新生儿窒息
E.妊娠早期母患风疹
- 34.易导致枕骨大孔疝的是
A.小脑蚓部
B.小脑扁桃体
C.大脑颞叶
D.下丘脑
E.小脑绒球小结叶
- 35.导致前列腺增生的主要原因是
A.慢性咳嗽
B.雌激素和雄激素水平失调
C.膀胱结石

- D.老龄化
E.雄激素增多
- 36.下列最常引起心搏、呼吸骤停的是
- A.感染
B.冠心病
C.颅内高压
D.麻醉
E.溺水
- 37.妊娠期母体心脏负荷最重的时间是妊娠
- A.24~28周
B.30~32周
C.32~34周
D.34~36周
E.36~40周
- 38.习惯性流产定义为
- A.连续2次流产
B.连续2次自然流产
C.连续3次流产
D.连续3次自然流产
E.连续3次人工流产
- 39.CO中毒时最先受损的器官是
- A.肝
B.肺部
C.胃肠道
D.肾
E.心、脑
- 40.导致心肌炎最主要的病原体是
- A.病毒
B.细菌
C.药物中毒
D.螺旋体
E.寄生虫
- 41.法洛四联症患者,2岁,喜蹲踞,其原理是
- A.保证重要器官供血
B.缓解腹部不适
C.腔静脉回心血量增加
D.休息,缓解疲劳
E.增加体循环阻力,减少右向左分流血量
- 42.肝硬化腹水的性质是
- A.渗出液
B.漏出液
C.乳糜液
D.黏液性
E.血性液
- 43.我国产妇死亡第一位的原因是
- A.妊娠合并心脏病
B.产后出血
C.羊水栓塞
D.产褥感染
E.妊娠期高血压疾病
- 44.细菌引发细菌性肝脓肿的最主要入侵途径是
- A.胆道系统
B.肝动脉
C.门静脉系统
D.淋巴系统
E.直接入侵
- 45.发生急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是
- A.肿大胆囊压迫胆总管
B.胆总管狭窄
C.胆总管结石
D.胆总管肿瘤合并梗阻
E.肝脓肿并发出血,阻塞胆管
- 46.引起颅内压增高的主要原因
- A.颅内、外感染
B.颅内占位性病变
C.颅外占位性病变
D.脑缺血缺氧
E.脑脊液循环异常
- 47.胸膜腔内的压力为负压,其生理意义正确的是
- A.组成肺的弹性回缩力
B.使肺维持扩张状态
C.降低肺泡表面张力

- D.维持肺泡稳定性
E.不能促进淋巴液的回流
- 48.典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏
- A.苯丙氨酸羟化酶
B.酪氨酸羟化酶
C.谷氨酸羟化酶
D.二氢生物蝶呤合成酶
E.羟苯丙酮酸氧化酶
- 49.慢性阻塞性肺气肿患者不会出现的体征是
- A.胸廓呈桶状
B.呼吸运动减弱
C.两肺语颤增强
D.双肺叩诊过清音
E.两肺肺泡呼吸音减弱
- 50.引起新生儿窒息的因素不包括
- A.母亲患糖尿病
B.急产
C.脐带绕颈
D.早产儿
E.胎粪吸入
- 51.引起早产儿发生新生儿颅内出血的主要原因是
- A.缺氧
B.产伤
C.过快输入高渗液体
D.机械通气不当
E.脑血管畸形
- 52.慢性呼吸系统疾病发生急性呼吸衰竭最常见的诱因是
- A.呼吸道感染
B.吸烟
C.剧烈活动
D.电解质紊乱
E.营养不良
- 53.符合产后循环系统变化特征的是
- A.循环血容量于产后3天恢复至未孕状态
B.血小板数量减少
C.红细胞计数和血红蛋白值变化不大
D.白细胞于产褥早期较高
E.血液处于低凝状态,易出血
- 54.阑尾炎直接蔓延可引起急性盆腔炎,其主要病原体是
- A.淋病奈瑟菌
B.支原体
C.链球菌
D.结核杆菌
E.大肠埃希菌
- 55.子宫脱垂的主要病因是
- A.营养不良
B.盆底组织先天发育不良
C.长期站立工作
D.便秘或长期咳嗽等致腹压增力
E.分娩损伤
- 56.子宫颈癌普查常用的检查方法是
- A.阴道镜检查
B.宫颈脱落细胞学检查
C.宫颈活组织检查
D.诊断性刮宫
E.女性激素测定
- 57.判断心肌梗死最具敏感性和特异性的生化指标是
- A.肌钙蛋白
B.酸激酶
C.肌酸激酶同工酶
D.C反应蛋白
E.中性粒细胞
- 58.非特异性感染病理改变不包括
- A.炎症介质、细胞因子释放
B.血管通透性增加
C.血浆成分渗出
D.干酪样坏死
E.转为慢性炎症
- 59.不属于闭合性单根单处肋骨骨折治疗原则的是
- A.手术治疗
B.对症止痛

- C.固定胸廓
D.防止并发症
E.鼓励患者咳嗽咳痰
- 60.急性心肌梗死最基本的病因是
A.体力活动
B.情绪激动
C.血压剧升
D.冠状动脉张力增高
E.冠状动脉粥样硬化
- 61.慢性浅表性胃炎的最主要病因是
A.幽门螺杆菌感染
B.自身免疫
C.饮食和环境因素
D.十二指肠液反流
E.长期食用刺激性食物和药物
- 62.符合铁代谢特征的是
A.缺铁时正常肠黏膜对铁吸收减少
B.铁主要在回肠吸收
C.在肠黏膜内能合成铁蛋白
D.人体所需铁完全依靠从食物中摄取
E.血清铁一般是亚铁离子
- 63.急性白血病出血的主要原因是
A.弥散性血管内凝血
B.血小板数量减少
C.血小板功能异常
D.凝血因子减少
E.血管损伤
- 64.不符合糖尿病临床特征的是
A.糖尿病是一组常见的内分泌代谢疾病
B.糖尿病是由多种原因导致的,绝对或相对胰岛素分泌不足或作用的缺陷而引起的代谢紊乱
C.糖尿病特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低及胰岛素释放试验异常
D.糖尿病可引起糖、蛋白质、脂肪、水及电解质等代谢紊乱
E.糖尿病是一种遗传病
- 65.与宫缩乏力导致的产后出血无关的因素是
A.巨大儿
B.双胎妊娠
C.胎膜早破
D.羊水过多
E.产程延长
- 66.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性
A.不变
B.升至正常人的70%以上
C.降至正常人的70%以下
D.升至正常人的90%以上
E.降至正常人的90%以下
- 67.微生态失衡会引起
A.自身和交叉感染
B.菌群失调和移位
C.定植抵抗力提高
D.内源性和外源性感染
E.非特异性免疫功能增强
- 68.不符合内脏性疼痛临床特点的是
A.疼痛过程缓慢、持续
B.痛感弥散,定位不准确
C.痛觉迟钝,对刺、割、灼等刺激不敏感
D.感觉敏锐,定位准确
E.对较强的张力及缺血、炎症等刺激较敏感
- 69.下肢深静脉血栓形成的原因之一是
A.吸烟
B.静脉腔狭窄
C.静脉内膜损伤
D.长久站立
E.大隐静脉曲张
- 70.良性前列腺增生好发于
A.外周区
B.移行区
C.中央区
D.纤维区
E.基质区
- 71.骨折早期并发症不包括

- A. 血管损伤
B. 内脏损伤
C. 脂肪栓塞
D. 畸形愈合
E. 神经损伤
72. 正常成人颅内压的范围是
A. 20~30 mmH₂O
B. 50~100 mmH₂O
C. 70~200 mmH₂O
D. 80~200 mmH₂O
E. 100~220 mmH₂O
73. 供移植器官的保存原则是
A. 常温保存
B. 低温原则
C. 延长热缺血时间
D. 变冷缺血为热缺血
E. 中断血流后不应立即降温
74. 新生儿低血糖的病因中属于葡萄糖消耗增加的是
A. 早产儿
B. Rh 溶血病患儿
C. 小于胎龄儿
D. 败血症患儿
E. 先天性心脏病患儿
75. 猩红热的主要传染源是
A. 患者及带菌者
B. 恢复期患者
C. 链球菌携带者
D. 家畜
E. 蚊蝇
76. 中毒性痢疾多见于
A. 新生儿
B. 婴幼儿
C. 儿童
D. 青年
E. 成人
77. 卵子排出后如未受精, 黄体开始萎缩的时间是
A. 排卵后第 24 小时
B. 排卵后第 7 日
C. 排卵后 9~10 日
D. 排卵后 14 日
E. 下次月经来潮前
78. 符合产后泌乳特征的是
A. 雌激素是产后泌乳的基础
B. 产后雄激素水平急剧下降, 解除了对垂体催乳素的抑制作用
C. 雌磁素有抑制垂体催乳素对乳腺的发育作用
D. 乳汁的分泌很大程度上取决于哺乳时的吸吮刺激
E. 吸吮动作可以反射性地引起腺垂体释放缩宫素, 促进乳汁排出
79. 软产道裂伤多见于
A. 阴道手术操作不当
B. 胎盘植入
C. 凝血功能障碍
D. 软产道充分扩张
E. 产程延长
80. 青春期功能失调性子宫出血的主要发病机制是
A. 黄体功能不足
B. 缺乏雌激素的负反馈作用
C. 孕激素分泌不足, 导致子宫内膜分泌反应不良
D. 垂体分泌 FSH 相对不足, 无 LH 高峰, 卵巢不能排卵
E. 子宫内膜含有过多前列腺素
81. 患者, 女性, 37 岁。孕 1 产 0, 孕 14 周出现口渴多饮症状, 孕 24 周糖筛查血糖值为 10.5 mmol/L, 下一步检查为
A. 尿糖检测
B. 空腹血糖
C. OGTT
D. 尿酮体
E. 羊水穿刺

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~84 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 杂音

82. 主动脉瓣肺动脉关闭时产生的振动音为

83. 二尖瓣和三尖瓣关闭时振动产生的为

84. 心室舒张早期血流自心房急流入心室使心室振动产生的为

(85~86 题共用备选答案)

- A. 病史
- B. 临床表现
- C. 脑脊液病原学检查
- D. 脑电图检查
- E. 头部 CT

85. 确诊化脓性脑膜炎的主要依据是

86. 确诊脑积水的主要依据是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 正常
- B. 延长
- C. 减少
- D. 正常或增多
- E. 正常或减少

87. 特发性血小板减少性紫癜巨核细胞数目

88. 特发性血小板减少性紫癜白细胞数目

(89~90 题共用备选答案)

- A. 尿培养
- B. 痰培养
- C. 血培养
- D. 粪便培养
- E. 骨髓培养

89. 临床诊断败血症的重要方法是

90. 临床诊断白血病的重要依据是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 大片炎症浸润影或实变影
- B. 肺蜂窝状肺脓肿
- C. 肺部多种形态浸润影,见于肺下野为
- D. 双肺弥漫性结节性浸润
- E. 肺下叶斑片状浸润

91. 军团菌肺炎 X 线所见是

92. 肺炎支原体肺炎 X 线所见是

93. 肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线所见是

94. 肺炎链球菌肺炎 X 线所见是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红

95. 由带状疱疹病毒引起的疾病是

96. 发热 3~4 天出现斑丘疹,疹间皮肤正常,出疹后热度增高见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 呼吸道梗阻
- D. 头痛
- E. 全脊髓麻醉

97. 全麻时麻醉过深可能引起

98. 硬膜外麻醉最危险的并发症是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

99. 疝内容物很容易纳入腹腔多见于

100. 疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内多见于

相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 医院感染漏报调查年监测患者数及漏报率分别为

- A. 不少于 5%, 漏报率应低于 10%
- B. 不少于 10%, 漏报率应低于 10%
- C. 不少于 10%, 漏报率应低于 15%
- D. 不少于 10%, 漏报率应低于 20%
- E. 不少于 10%, 漏报率应低于 30%

2. 糖尿病病人学习皮下注射方法时, 常采用

- A. 无意模仿
- B. 有意模仿
- C. 强迫模仿
- D. 主动交往
- E. 被动交往

3. 计划工作中, 评估形势的主要内容

包括

A. 社会关系、社会经济、社会竞争、服务对象的需求

B. 社会需求、社会竞争、组织资源、社会

经济的需求

C. 社会竞争、社会关系、社会需求、服务对象的需求

D. 社会需求、社会竞争、组织资源、服务对象的需求

E. 社会需求、社会关系、社会竞争、组织资源的需求

4. 下列是协调活动的重要手段和依据准则的为

- A. 规章制度
- B. 行政法规
- C. 基本法
- D. 刑法
- E. 民法

5. 拉斯韦尔模式的正确表述是

A. 传者 → 信息 → 传播途径 → 受者 → 效果

B. 传者 → 传播途径 → 信息 → 效果 → 受者

C. 信息 → 传者 → 传播途径 → 受者 → 效果

D. 信息 → 传者 → 传播途径 → 效果 → 受者

E. 传者 → 信息 → 传播途径 → 效果 → 受者

6. 授权的步骤不包括

A. 选择授权对象

B. 明确授权内容

C. 形成沟通渠道

D. 实施授权计划

E. 排除被授权者的工作障碍

7. 医患关系要做到真诚相处, 最主要的是

A. 关系和谐

B. 尽职尽责

C. 平等相待

D. 互相尊重

E. 互相信任

8. 属于多线型组织结构的为

A. 直线型

B. 直线-参谋型

C. 职能型

D. 主导型

E. 综合型

9. 脓性指头炎若需要切开引流, 应采用

A. 鱼口状切开

B. 手指侧面纵切开

C. 手指掌面纵切开

D. 在波动明显处横行切开

- E.从原伤口处放射状切开
- 10.空气消毒不宜使用
- A.紫外线照射
- B.臭氧消毒
- C.甲醛熏蒸
- D.醋酸熏蒸
- E.过氧化氢喷雾消毒
- 11.肠道隔离使用的标志是
- A.黄色标志
- B.蓝色标志
- C.橙色标志
- D.红色标志
- E.棕色标志
- 12.健康教育的核心为
- A.促进人们自身护理能力和行为
- B.促进人们住院适应能力
- C.促进人们自我保健能力和行为
- D.促进人们的健康行为和生活方式
- E.帮助人们建立健康行为
- 13.领导效能的内容不包括
- A.时间效能
- B.用人效能
- C.决策办事效能
- D.组织整体贡献效能
- E.结构效能
- 14.三度原位菌群失调的主要原因为
- A.免疫功能降低
- B.大量应用广谱抗菌药物
- C.慢性病诱发
- D.插管或介入治疗
- E.细菌结构变化
- 15.护理部发现问题及时纠正,遵循的管理原则是
- A.整分合原则
- B.能级原则
- C.激励原则
- D.随机制宜原则
- E.反馈原则
- 16.从健康计划实施时开始,并贯穿于计划执行全过程的评价活动是指
- A.形成评价
- B.总结评价
- C.过程评价
- D.效应评价
- E.结局评价
- 17.不适宜血液病病区采用的空气净化方法是
- A.紫外线灯照射消毒
- B.化学消毒
- C.自然通风
- D.空气消毒器
- E.集中空调通风系统
- 18.不需要洗手的情况是
- A.护理两名病人之间
- B.穿隔离衣前
- C.给病人输液后,准备导尿管
- D.给病人伤口换药后
- E.与病人交谈后
- 19.吸毒行为应属于
- A.日常危害健康行为
- B.致病性行为模式
- C.不良疾病行为
- D.违规行为
- E.不良嗜好行为
- 20.不需进行消化道隔离的疾病是
- A.麻疹
- B.甲型肝炎
- C.脊髓灰质炎
- D.霍乱
- E.细菌性痢疾
- 21.以下可能导致偏倚的因素,哪项属于测量对象因素
- A.霍桑效应
- B.暗示效应
- C.评定错误
- D.干预组和对照组选择不均衡
- E.测量者成熟性
- 22.开放性肺结核应采取

- A. 保护性隔离
B. 血液隔离
C. 呼吸道隔离
D. 消化道隔离
E. 抗酸杆菌隔离
23. 直线参谋型组织结构的优点是
A. 组织适应性好
B. 组织反应灵敏
C. 满足统一指挥和严格责任制要求
D. 直线领导和职能部门职权明确
E. 联系便捷, 管理成本低
24. 抗感染药物的作用机制不包括
A. 抑制细菌核酸的合成
B. 影响细菌细胞壁的合成
C. 细菌缺乏药物的靶位点
D. 干扰细菌蛋白质的合成
E. 损伤细菌的细胞膜
25. 不属于责任心差引起的护患冲突表现在
A. 在班不在岗
B. 在岗不尽责
C. 医嘱执行不严格
D. 查对不认真
E. 知识有限
26. 手术前预防性应用抗生素方法错误的是
A. 术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素
B. 需有明确指征
C. 总的预防用药时间不超过 24 小时
D. 择期的结直肠手术前, 还需通过导泻或灌肠进行肠道准备
E. 污染手术使用万古霉素作为预防药物
27. 通风的目的与哪项无关
A. 调节室内温湿度
B. 降低微生物密度
C. 避免噪音的刺激
D. 使患者心情舒畅
E. 增加室内空气中含氧量
28. 炭疽患者用过的治疗性废物和有机垃圾应
A. 熟石灰浸泡消毒
B. 丢弃
C. 焚烧
D. 过氧乙酸喷洒
E. 深埋
29. 医院的 I 类环境的空气消毒适用于
A. 层流洁净手术室和层流洁净病房
B. 产房、婴儿室、早产儿室
C. 供应室无菌室
D. 注射室、治疗室、换药室
E. 急诊室、化验室及各类普通病房
30. 美国管理学家莱金提出的 ABC 时间管理方法中, C 级目标指
A. 必须完成的目标
B. 最重要的目标
C. 较重要的目标
D. 很想完成的目标
E. 不太重要的目标
31. 门诊教育往往侧重于以下哪项的防治教育
A. 危重疾病的教育
B. 慢性病的教育
C. 常见疾病的教育
D. 发病机制的教育
E. 传染性疾病的教育
32. 组织或个人为了完成某一目标而制订具体行动方案称为
A. 程序化决策
B. 非程序化决策
C. 目标决策
D. 战略决策
E. 战术决策
33. “鱼和熊掌不可兼得”属于
A. 双趋式冲突
B. 双避式冲突
C. 趋避式冲突

- D.双趋双避式冲突
 E.多重趋避式冲突
- 34.用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能,称为
- A.程序
 B.结构图
 C.规划图
 D.政策
 E.组织图
- 35.“动态”原理中管理工作动态特性是指
- A.稳定状态是相对的,运动状态是绝对的
 B.稳定状态是绝对的,运动状态也是绝对的
 C.稳定状态是绝对的,运动状态是相对的
 D.稳定状态是相对的,运动状态也是相对的
 E.稳定和运动状态的变化互不干扰
- 36.有效训导的方法错误的是
- A.用平等客观的态度对待下属
 B.对于反复发生的错误,逐步加重处罚
 C.批评对事不对人
 D.以行动强化语言
 E.提出防范错误的建议
- 37.关于抗菌药物的作用机制,错误的叙述是
- A.干扰细胞壁的合成
 B.抑制细菌芽孢生成
 C.抑制细菌核酸合成
 D.影响细菌蛋白质的合成
 E.损伤细胞膜
- 38.常规器械消毒灭菌合格率的评价属于
- A.基础质量评价
 B.服务质量评价
 C.环节质量评价
 D.综合评价
 E.终末质量评价
- 39.梅毒的病原体是
- A.奈瑟菌
 B.钩端螺旋体
 C.苍白螺旋体
 D.汉坦病毒
 E.人类乳头瘤病毒
- 40.四象限时间管理法的两个维度是指事情的
- A.战略性和战术性
 B.集体性和个人性
 C.时间性和紧迫性
 D.权威性和重要性
 E.重要性和紧迫性
- 41.不属于行政管理方法优点的是
- A.市管理系统达到高度统一
 B.利于对常规问题处理
 C.受决策者水平的限制
 D.保证整个系统计划、目标的实现
 E.灵活有效的解决各种例外问题
- 42.护理管理是现代医院管理的重要组成部分,其管理内容不包括
- A.角色管理
 B.组织管理
 C.人员管理
 D.业务管理
 E.质量管理
- 43.“霍桑实验”发现决定工作效率最重要的因素是
- A.人际关系
 B.严格的纪律
 C.统一的指挥
 D.科学的领导
 E.自我控制
- 44.不属于时间管理策略的是
- A.标准化消耗时间
 B.将一般事件安排在不干扰时间
 C.保持时间连续性
 D.充分利用最佳工作时间

- E.选择好的助手
- 45.经常出现的活动的决策是
- A.程序化决策
- B.非程序化决策
- C.战术决策
- D.不确定性决策
- E.确定性决策
- 46.护理组织文化建设不正确的是
- A.易接受性
- B.群众关注
- C.针对性
- D.独特性
- E.交流性
- 47.护理组织文化的核心是
- A.护理群体文化
- B.护理哲理
- C.社会文化
- D.护理价值观
- E.护理专业
- 48.不属于医院院外培训方法的是
- A.全脱产学习
- B.业余培训
- C.电视大学
- D.科室轮转
- E.自学高考
- 49.属于沟通过程中的一个步骤但却包括了信息沟通过程的几个环节的是
- A.信息源
- B.编码
- C.传递信息
- D.解码
- E.反馈
- 50.制定护理质量标准的原则不包括
- A.可衡量性原则
- B.科学性和先进性原则
- C.实用性原则
- D.严肃性和相对稳定性原则
- E.经济原则
- 51.“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
- A.年度评估指标
- B.质量评估指标
- C.差异度评估指标
- D.临床成果评估指标
- E.患者满意度评估指标
- 52.小组讨论是指在一位主持人的带领下,一小组人围绕某个主题进行座谈讨论。确保小组讨论效果的关键点不包括
- A.选择适当的主持人
- B.做好充分准备工作
- C.掌握小组讨论的技巧
- D.安排好小组人员座位排列
- E.现场提出讨论主题
- 53.影响传播效果的因素有多种,其中属于社会环境因素的是
- A.环境布置
- B.传播活动地点、场所
- C.相关的政策法规
- D.传播者的行为动机
- E.患者的心理需求
- 54.健康教育活动的目标是
- A.开展卫生宣传
- B.配合调查研究
- C.普及保健知识
- D.改善人类的健康相关行为
- E.实施系统的健康相关行为干预
- 55.下列不属于按教育目的分类的健康教育研究范畴的是
- A.营养健康教育
- B.生殖健康教育
- C.职业人群健康教育
- D.环境保护健康教育
- E.疾病防治健康教育
- 56.0~3岁时期,个体所处的行为发展阶段是
- A.初试发展阶段
- B.被动发展阶段
- C.主动发展阶段

- D.自主发展阶段
E.巩固发展阶段
- 57.以下属于“日常危害健康行为”的是
A.药物滥用
B.讳疾忌医
C.不遵医嘱
D.缺乏体育锻炼
E.违反法律法规
- 58.“您今天的气色好多了,是吧?”属于常见提问方式中的
A.封闭式
B.开放式
C.复合式
D.探索式
E.偏向式
- 59.选择健康传播途径的原则除准确性外还包括
A.针对性、速度性、经济性
B.科学性、速度性、经济性
C.针对性、科学性、通用性
D.速度性、通用性、经济性
E.针对性、速度性、科学性
- 60.关于健康教育计划目标的叙述,下列错误的是
A. Who 是指对象
B. What 是指实现什么变化
C. When 是指在多长期限内实现这种变化
D. How much 是指有多少对象发生行为变化
E. Where 是指在什么范围内实现这种变化
- 61.降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种
A.倾向因素
B.促成因素
C.强化因素
D.抑制因素
E.强制因素
- 62.为减少回归因素对评价结果正确性的影响,可采用的方法是
A.设立对照组
B.重复测量
C.抽样测量
D.比较分析
E.随机调查
- 63.适度变化语音引起对方注意属于非语言传播技巧中的
A.面部表情
B.仪表形象
C.动态语言
D.同类语言
E.体态语言
- 64.医院感染学是研究医院感染
A.发生、发展和控制的一门学科
B.病原体特征的一门学科
C.流行病学特征的一门学科
D.管理制度建立和完善的一门学科
E.控制措施的一门学科
- 65.去污染就是人为地将机体的
A.正常菌群或已定植的细菌部分去除
B.正常菌群或已定植的细菌全部去除
C.已定植的细菌部分或全部去除
D.正常菌群部分或全部去除
E.正常菌群或已定植的细菌部分或全部去除
- 66.ICU 最常见的条件致病菌是
A.肺炎克雷伯菌
B.大肠埃希菌
C.铜绿假单胞菌
D.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
E.洋葱伯克霍德菌
- 67.医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中,短时间内突然发生
A.许多医院感染病例
B.医院感染流行
C.医院感染集中
D.医院感染失控

- E. 医院感染蔓延
68. 手术器械和物品属于
- A. 消毒物品
- B. 无危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 中度危险性物品
- E. 高度危险性物品
69. 腹腔镜使用前必须经过
- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 减菌
- D. 灭菌
- E. 无害
70. 接触下列物品护士不需戴手套的是
- A. 患者的血液
- B. 患者的分泌物
- C. 患者的药物
- D. 患者的排泄物
- E. 污染的敷料
71. 下列属于决策步骤的是
- A. 列出对象
- B. 目标分类
- C. 追踪评价
- D. 排列顺序
- E. 分配时间
72. 护士长担任咨询、协调、激励者角色

的护理组织方式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

73. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等,体现了领导的

- A. 管理权
- B. 决策权
- C. 决定权
- D. 用人权
- E. 指挥权

74. 各要素配置达到科学化、最优化的基本要求是

- A. 解决问题要注重根本
- B. 及时协调出现的问题
- C. 调动组织成员积极性
- D. 协调问题注意合理原则
- E. 协调过程要相互尊重

75. 实施护理质量控制应注意

- A. 检查标准应人性化
- B. 重视细节的控制
- C. 质量控制应具体化
- D. 控制方法应体现管理技巧
- E. 强调综合系统的控制

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(76~77 题共用备选答案)

- A. 护士工作兴趣与满意度高
- B. 责任护士技能水平要求高
- C. 患者安全感与归属感增强
- D. 所需要的人力物力费用高
- E. 护士职责明确,责任心增强

76. 责任制护理的优点是

77. 综合护理的优点是

(78~80 题共用备选答案)

- A. 吸烟
- B. 戒烟
- C. 及时就医
- D. 讳疾忌医
- E. 药物滥用

78. 属于保健行为的是

79. 属于不良疾病行为的是

80. 属于戒除不良嗜好行为的是

(81~85 题共用备选答案)

- A. 消化道隔离
 B. 呼吸道隔离
 C. 血液、体液隔离
 D. 接触隔离
 E. 严密隔离
81. 皮肤白喉采取的隔离是
 82. 腮腺炎采取的隔离是
 83. 艾滋病采取的隔离是
 84. 伤寒采取的隔离是
 85. 疟疾采取的隔离是
 (86~89 题共用备选答案)
 A. 5%
 B. 10%
 C. 50%
 D. 80%
 E. 90%
86. 下排式灭菌剂的装载量不得超过柜室内容积的
 87. 预真空灭菌剂的装载量不得超过柜室容积的
 88. 预真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 89. 脉动真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 (90~91 题共用备选答案)
 A. 2 小时
 B. 4 小时
 C. 12 小时
 D. 24 小时
 E. 48 小时
90. 医疗机构发生 5 例以上疑似医院感染暴发事件的报告时限为
 91. 医疗机构发生 10 例以上的医院感染暴发事件的报告时限为
 (92~93 题共用备选答案)
 A. 个案护理
 B. 功能制护理
 C. 小组护理
 D. 责任制护理
 E. 综合护理
92. 由一名护理人员在当班期间承担一名患者所需要的全部护理, 被称为
 93. 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作, 被称为
 (94~96 题共用备选答案)
 A. 肯定性反馈
 B. 否定性反馈
 C. 模糊性反馈
 D. 动态体语
 E. 仪表形象
94. 护士小王在和患者交谈中, 适时插入了一些“是的”“很好”等语言或点头、微笑等非语言形式给予对方肯定和鼓励, 对患者的言行表示了赞同和支持, 小王在交谈中的反馈行为属于
 95. 当小王发现患者的言行不正确时, 她应当使用的恰当反馈形式是
 96. 在交谈中, 小王以关注的眼神注视患者, 表示在专心倾听对方的话, 小王的交流行为属非语言交流中的
 (97~98 题共用备选答案)
 A. 先天性
 B. 习得性
 C. 偶然性
 D. 一致性
 E. 可控性
97. 属于促进健康行为的特点是
 98. 属于危害健康行为的特点是
 (99~100 题共用备选答案)
 A. 食用生的污染贝类
 B. 直接接触有传染性的分泌物感染
 C. 破损的皮肤接触被病原菌污染的物品感染
 D. 输血感染
 E. 吸入被病原菌污染的空气感染
99. 淋病的传播途径是
 100. 炭疽的传播途径是

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不能估计预产期的项目是
 - A. 早孕反应始出现的时间
 - B. 胎动开始的办间
 - C. 测子宫底高度
 - D. 腹围
 - E. 尺测耻骨联合上子宫长度
2. 临床 B 型超声用来判断胎儿大小的径线是
 - A. 双顶径
 - B. 枕额径
 - C. 枕颞径
 - D. 右斜径
 - E. 枕下前凶径
3. 不是胎盘剥离征象的是
 - A. 产妇感到轻松, 血压下降
 - B. 阴道少量流血
 - C. 阴道口外露的一段脐带自行延长
 - D. 宫体变硬呈球形, 宫底上升达脐上
 - E. 用手掌尺侧在耻骨联合上方轻压子宫下段时, 外露的脐带不再回缩
4. 不属于高危妊娠范畴的是
 - A. 有剖宫产史
 - B. 双胎妊娠
 - C. 有阑尾炎手术史
 - D. 过期妊娠
 - E. 胎盘功能不全
5. 关于双卵双胎的描述, 正确的是
 - A. 双卵双胎占双胎妊娠的 1/3
 - B. 双卵双胎可形成一个胎盘
 - C. 双卵双胎两胎儿性别相同
 - D. 双卵双胎间隔膜为两层夹膜
 - E. 双卵双胎是由两个卵子分别受精形成
6. 对第二产程延长的处理, 错误的是
 - A. 应行阴道检查, 除外头盆不称
 - B. 判定头盆相称的基础上, 指导产妇配合宫缩, 增加腹压缩短第二产程
 - C. $S>+3$, 提示双顶径已越过中骨盆横径, 可行头吸引器或产钳助产
 - D. $S<+3$, 伴胎儿窘迫, 行剖宫产终止妊娠
 - E. $S<+3$, 胎头下降停滞有产瘤, 胎心正常, 加强宫缩, 经阴道助产
7. 关于子宫破裂的分类, 错误的是
 - A. 根据子宫破裂的原因可分为自然破裂和创伤性破裂
 - B. 根据子宫破裂发生的时间可分为妊娠期破裂和分娩期破裂
 - C. 根据子宫破裂发生的部位可分为子宫体部破裂和子宫下段破裂
 - D. 根据子宫破裂发生的部位可分为子宫体部破裂和子宫颈破裂
 - E. 根据子宫破裂的程度可分为完全性破裂和不完全性破裂
8. 羊水栓塞最早出现的症状是
 - A. 急性肝衰竭
 - B. 急性呼吸衰竭
 - C. 急性左心衰竭
 - D. 急性肾衰竭
 - E. 急性 DIC
9. 关于滴虫阴道炎的治疗, 错误的是
 - A. 夫妇双方应同时治疗
 - B. 哺乳期妇女慎用甲硝唑
 - C. 常用 2%~4% 碳酸氢钠溶液冲洗阴道
 - D. 治疗后复查转阴, 仍需治疗一疗程
 - E. 局部治疗与全身治疗相结合
10. 子宫颈中度糜烂是指
 - A. 糜烂面积占整个宫颈面积的 1/3

- B.糜烂面积占整个宫颈面的 1/3 以上
 C.糜烂面积占整个宫颈面积的 1/3 ~ 2/3
 D.糜烂面积占整个宫颈面积的 2/3 以上
 E.以上均不是
- 11.急性盆腔炎患者行妇科检查时,不会发现
- A.阴道黏膜充血
 B.宫颈充血,有抬举痛
 C.宫体略大,有压痛,活动受限
 D.子宫两侧或一侧可扪及片状增厚
 E.阴道内有血性分泌物,后穹隆触痛明显
- 12.关于获得性免疫缺陷综合征的传播途径,错误的是
- A.性接触
 B.血液
 C.胎盘
 D.飞沫
 E.乳汁
- 13.子宫颈癌好发部位的准确描述是
- A.子宫颈阴道部鳞状上皮
 B.子宫颈阴道部柱状上皮
 C.阴道穹隆部鳞状上皮
 D.子宫颈管柱状上皮
 E.子宫颈移行带区
- 14.关于孕妇常见心理变化的描述,不正确的是
- A.情绪不稳定
 B.以他人为中心
 C.因胎儿将要出生感到愉快
 D.害怕分娩的疼痛而焦虑
 E.出现“筑巢反应”
- 15.关于子宫下段的说法,错误的是
- A.子宫下段是由非孕期的子宫峡部形成
 B.子宫下段是被动扩张段
 C.临产时子宫下段可延长至 7~10 cm
 D.是子宫破裂的好发部位
 E.子宫下段腺体分泌增多,可形成黏稠的黏液栓
- 16.不属于产力的是
- A.子宫收缩力
 B.腹肌收缩力
 C.膈肌收缩力
 D.肛提肌收缩力
 E.球海绵体肌收缩力
- 17.能促胎肺成熟的药物是
- A.缩宫素
 B.利托君
 C.沙丁胺醇
 D.硫酸镁
 E.糖皮质激素
- 18.关于羊水过多的临床表现,正确的是
- A.慢性羊水过多常见于妊娠晚期
 B.急性羊水过多较多见
 C.急性羊水过多常见于妊娠早期
 D.多数孕妇能适应急性羊水过多
 E.慢性羊水过多孕妇通常表情痛苦
- 19.妊娠合并心脏病,诊断心功能 II 级的标准是
- A.一般体力活动稍受限制,休息时无自觉症状
 B.体力活动明显受限,或既往有心力衰竭病史
 C.休息状态下即出现心力衰竭症状
 D.心脏扩大
 E.出现劳力性呼吸困难
- 20.宫缩乏力导致的产后出血,首选的治疗措施是
- A.按摩子宫并注射宫缩剂
 B.宫腔填塞纱条
 C.结扎盆腔血管
 D.压迫腹主动脉
 E.子宫次全切除术
- 21.关于羊水栓塞的临床表现,错误的是
- A.大多数发病突然,有时可没有先兆

症状

- B.患者心率增快,肺部听诊可有湿啰音
C.患者可因出血性休克而死亡
D.羊水栓塞后期可出现少尿或无尿和尿毒症的表现
E.临床可分为急性休克期、出血期、急性肾衰竭三个阶段,三个阶段必须按顺序出现
- 22.常染色体隐性遗传病,父母双方均为携带者时,子代的患病风险为
- A.1/8
B.1/4
C.1/2
D.3/4
E.2/3
- 23.滴虫阴道炎阴道分泌物的典型特点是
- A.稠厚豆渣样
B.血性
C.脓性
D.稀薄泡沫状
E.白色均匀稀薄
- 24.目前治疗淋病的抗生素
- A.四环素类为主
B.喹诺酮类为主
C.青霉素类为主
D.大环内酯类为主
E.第三代头孢菌素为主
- 25.关于原发性痛经的治疗方案,不正确的是
- A.心理治疗
B.给予镇静药物
C.给予镇痛药物
D.口服避孕药
E.无需特殊治疗
- 26.黄体功能不足患者的典型临床表现是
- A.月经周期紊乱
B.月经周期规则,月经频发

C.月经过多

D.月经稀发

E.月经周期正常,经期延长

27.关于产力的描述,错误的是

A.产力包括子宫收缩力、腹肌及膈肌收缩力和肛提肌收缩力

B.子宫收缩力是临产后主要的产力,贯穿于整个分娩过程

C.正常子宫收缩具有节律性、对称性和极性

D.宫缩时,子宫肌纤维缩短变宽,宫缩后肌纤维又松弛,恢复到原来长度

E.腹压是第二产程时娩出胎儿的重要辅助力量

28.关于糖尿病饮食治疗的描述,不正确的是

A.饮食治疗是糖尿病治疗的基础,大多数糖尿病患者只需要通过饮食治疗即可满足控制血糖

B.糖尿病孕妇需要严格控制饮食,整个孕期体重增加不超过 10 kg

C.孕妇每日需要热量约 30~35 kcal/kg,其中碳水化合物 40%~50%,蛋白质 20%~30%,脂肪 30%~40%

D.孕晚期每周热量增加补充足量维生素、钙、铁

E.少量多餐,每日进食 5~6 次

29.如果测量骨盆出口横径<8 cm,应进一步测量

A.坐骨棘间径

B.坐骨切迹宽度

C.对角径

D.出口前矢状径

E.出口后矢状径

30.关于均小骨盆的说法,不正确的是

A.形态同正常女性型骨盆

B.骨盆各径线均较正常小 1 cm

C.估计胎儿不大,头盆相称者可给予试产

- D.胎儿较大者应尽早剖宫产
E.多见于身材矮小,体型匀称的妇女
- 31.关于产褥感染的处理原则,错误的是
- A.支持疗法
B.因胎盘残留出现急性感染并发高热患者须立即清宫
C.根据细菌培养和药敏试验选择合适的抗生素
D.感染严重者短期加用肾上腺皮质激素
E.会阴伤口感染及时行切开引流术
- 32.关于晚期产后出血处理的是
- A.按摩子宫
B.使用宫缩剂
C.无感染征象不使用抗生素
D.疑有胎盘残留,应行刮宫术
E.剖宫产者必要时开腹探查
- 33.外阴炎的临床表现不包括
- A.外阴部瘙痒
B.外阴部疼痛
C.外阴菜花样肿块
D.外阴部烧灼感
E.外阴局部充血
- 34.外阴阴道假丝酵母菌病患者进阴道灌洗,宜选择的溶液是
- A.1%~4%碳酸氢钠溶液
B.1:20 碘伏溶液
C.1:5 000 高锰酸钾液
D.1%乳酸液
E.1:10 碘伏溶液
- 35.关于侵蚀性葡萄胎的治疗原则,错误的是
- A.化疗为主要治疗手段
B.手术切除子宫并辅以化疗
C.化疗原则是治愈后再巩固治疗2~3个疗程
D.手术用于切除残存或耐药病灶
E.当转移灶发生大出血时应考虑手术治疗
- 36.关于化疗药物副作用的描述错误的是
- A.白细胞下降后,患者免疫功能下降易引起感染,严重时会出现败血症
B.血小板下降,患者可出现牙龈出血、鼻出血、阴道出血、尿血、便血
C.发生食欲减退、恶心、呕吐时停药
D.溃疡如正值白细胞下降,易引起全身感染而发生败血症
E.化疗药物对局部组织刺激性较大,不慎注入皮下可引起组织损伤、溃烂、甚至坏死
- 37.卵巢瘤样病变最常见的类型是
- A.子宫内膜异位囊肿
B.多囊卵巢
C.畸胎瘤
D.滤泡囊肿和黄体囊肿
E.转移性囊肿
- 38.关于外阴鳞状细胞浸润癌的治疗方法,不正确的是
- A.Ⅰ期:广泛外阴切除;病灶同侧或双侧腹股沟淋巴结切除术
B.Ⅱ期:外阴广泛切除及双侧腹股沟浅层和腹股沟深层淋巴结切除
C.Ⅲ期:外阴广泛切除及双侧腹股沟浅层和腹股沟深层淋巴结切除,如需要加作尿道前部切除与肛门皮肤切除
D.Ⅳ期:外阴广泛切除,直肠下段切除和,肛管切除,人工肛门成形术及双侧腹股沟、盆腔淋巴结清扫
E.外阴癌对放射治疗敏感,应积极选择放疗
- 39.人工授精的适应证不包括
- A.男方性功能障碍
B.宫颈管狭窄
C.宫颈黏液异常
D.轻度子宫内膜异位症
E.输卵管炎症
- 40.患者,女性,29岁。孕1产0,孕34周,四步触诊结果:子宫底部触到坚而硬的胎

头,在耻骨联合上方触到较软而宽、不规则的胎臀,胎臀位于母体腹部右前方。胎心音于脐上右侧听到。推断其胎方位为

- A. 骶左前位
- B. 骶右前位
- C. 骶左后位
- D. 骶右后位
- E. 骶左横位

41.患者,女性。妊娠合并糖尿病,产程观察中处理不正确的是

- A. 血糖控制在接近正常水平
- B. 及时纠正代谢紊乱,如酮症酸中毒、低钾血症等
- C. 密切监测血糖及尿酮体
- D. 可按每4g葡萄糖加1U胰岛素的比例补液,使血糖 <5.6 mmol/L
- E. 应在12小时内结束分娩

42.患者,女性,30岁。因外阴部瘙痒、烧灼痛就诊。妇科检查发现外阴部、小阴唇有许多散在的乳头状疣,质软,呈粉红色,触之易出血。应首先考虑

- A. 尖锐湿疣
- B. 外阴炎
- C. 淋病
- D. 带状疱疹
- E. 外阴阴道假丝酵母菌病

43.患者,女性,36岁。诊断为外阴鳞状细胞癌0期;病灶局限。首选的治疗方式为

- A. 外阴皮肤切除术
- B. 外阴广泛局部切除
- C. 单侧外阴切除
- D. 药物治疗
- E. 观察

44.某孕妇临产12小时,胎心170次/分,S+2,胎膜早破,肉眼可见羊水混浊。此时应采取的措施是

- A. 产钳助产
- B. 胎头吸引助产
- C. 待其自然分娩

- D. 人工破膜
- E. 立即剖宫产

45.产妇王女士,产后2周出现弛张热,下腹疼痛并且压痛明显,下肢肿胀疼痛、皮肤紧张发白。最可能的诊断是

- A. 子宫肌炎
- B. 血栓性静脉炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 产后关节炎

46.患者,25岁。急产,胎儿娩出后产妇突然发生呼吸困难,有濒死感,迅速出现循环衰竭、休克及昏迷。该孕妇最有可能是

- A. 休克
- B. 子痫
- C. 虚脱
- D. 心衰
- E. 羊水栓塞

47.患者,女性,40岁。阴道不规则出血1个月,咳嗽,痰中带血10天,头痛3天,今晨头痛剧烈,突然昏倒,胸片示左下肺有圆球状阴影,P-hCG阳性,最后一次妊娠时间为3年前。该患者最可能发生了

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒癌脑转移
- D. 肺癌脑转移
- E. 脑血管意外

48.患者,女性,身材矮小,匀称。骨盆测量值如下:髂棘间径21cm,髂嵴间径23cm,骶耻外径16cm,出口横径7cm,对角径10.5cm,该患者的骨盆特征为

- A. 骨盆入口平面狭窄
- B. 中骨盆平面狭窄
- C. 骨盆出口平面狭窄
- D. 漏斗骨盆
- E. 均小骨盆

49.患者,女性,26岁。孕39周,已临产20小时,下腹压痛,患者突然感觉到一阵撕

裂样剧烈腹痛后,宫缩停止,胎动消失,患者面色苍白,出冷汗,考虑该患者是

- A.先兆子宫破裂
- B.子宫破裂
- C.胎盘早剥
- D.前置胎盘
- E.妊娠合并急性胰腺炎

50.患者,女性,44岁。因1年以来反复出现同房后出血就诊。妇科检查:宫颈外突菜花样组织,直径约4cm大小,子宫活动欠佳,主韧带呈条索状、质硬。目前适合该患者的治疗方法是

- A.子宫颈癌根治术+盆腔淋巴清扫术
- B.动脉插管化疗
- C.放射治疗
- D.全子宫切除术,术后化疗
- E.化疗后行全子宫切除术

51.患者,女性,26岁。未婚。查体发现左卵巢实性肿物,血清AFP显著升高。该患者最可能的疾病是

- A.输卵管囊肿
- B.卵巢囊肿
- C.卵巢内胚窦瘤
- D.异位妊娠
- E.卵巢巧克力囊肿

52.患者,女性,65岁。体质较差,查体发现外阴鳞状细胞癌0期,最恰当的治疗方法为

- A.外阴鳞癌对放疗敏感,行放射治疗
- B.局部应用药物治疗
- C.病变较重,行外阴广泛局部切除术
- D.考虑患者全身情况,行单纯外阴切除术
- E.为防止转移,行外阴广泛局部切除术及病灶同侧腹股沟淋巴结清扫术

53.患者,女性,29岁。多次人工流产,3月前行末次人流手术,有周期性下腹疼痛,无月经来潮,最可能的诊断是

- A.再次妊娠

- B.月经不调
- C.异位妊娠
- D.宫颈粘连
- E.吸宫不全

54.患者,女性,72岁。独居,丈夫3年前过世,两子女均在海外。关于该患者的保健措施,错误的是

- A.保持开朗、乐观的情绪
- B.有规律的生活起居
- C.适当参加社会活动
- D.防治骨质疏松
- E.以高蛋白、高维生素、高脂肪饮食为宜

55.某产妇,正常阴道分娩。分娩后第2天起,体温波动在37.5~38℃,持续3天,子宫收缩好,无压痛,恶露常无异味,会阴伤口无红肿,双乳胀痛硬结,可能为

- A.会阴伤口感染
- B.产褥感染
- C.产后疲劳
- D.乳汁淤积
- E.乳腺炎

56.患者,女性,27岁。孕1产0。孕40+5周,胎心140次/分,宫缩持续40秒,间歇3~5分钟,胎膜自然破裂,羊水Ⅱ度感染,宫口开大3cm,胎先露S-0,最适宜做的辅助检查

- A.缩宫素激惹试验(OCT)
- B.胎儿生物物理评分
- C.宫缩压力试验(GST)
- D.腹部B超检查
- E.羊膜镜检查

57.患者,女性,30岁。孕1产1,孕39周,因第二产程延长行会阴左后侧切开术及产钳助产术,经阴道分娩一男活婴,胎盘、胎膜娩出完整。产后检查:宫底脐下1指,血压110/80mmHg;产后1小时,患者感心悸、恶心、口渴、出冷汗,检查阴道出血量不多,色暗红,有凝血块,宫底脐上1指,软,血压80/

50 mmHg。考虑该患者是子宫收缩乏力导致的宫腔内隐匿性出血,那么针对该情况,首先需要做的处理是

- A.注射缩宫素
- B.给予止血药
- C.给予抗生素
- D.按摩子宫排出宫腔内积血
- E.切除子宫

58.患者,女性,50岁。子宫如孕6个月大小。葡萄胎吸宫术后,吸出组织物为细小尖样水泡组织,术后7日行子宫全切术并行化疗,手术的理由是

- A.无生育要求
- B.无条件随访
- C.估计宫腔内有残留水泡状组织物
- D.40岁以上恶变率明显增高
- E.预防病变转移

59.患者,女性,50岁。确诊为葡萄胎,应给予的处理是

- A.清宫术
- B.清宫术+预防性化疗
- C.预防性化疗
- D.切除子宫
- E.切除子宫+预防性化疗

60.患者,女性,30岁。因左卵巢肿瘤行手术治疗。术中发现肿瘤直径约10 cm,边界清晰;术中快速病理结果:黏液性囊腺瘤。患者目前适宜的术式是

- A.囊肿剥除术
- B.左附件切除术
- C.双附件切除术
- D.子宫+左附件切除术
- E.分期手术

61.患者,女性,79岁。子宫脱垂Ⅲ度合并阴道前后壁膨出,伴糖尿病、高血压、冠心病。最佳的治疗方案为

- A.中药治疗
- B.盆底肌锻炼和物理治疗
- C.曼氏手术

- D.阴道封闭术
- E.子宫悬吊术

(62~63题共用题干)

患者,女性,28岁。孕1产0,孕36周。骨盆测量:髂棘间径23 cm,髂嵴间径25 cm,骶耻外径18 cm,坐骨结节间径7.5 cm,对角径13 cm。

62.该患者的径线不正常的是

- A.对角径
- B.骶耻外径
- C.髂嵴间径
- D.坐骨结节间径
- E.髂棘间径

63.该患者应进一步测量

- A.耻骨弓角度
- B.出口前矢状径
- C.出口后矢状径
- D.坐骨棘间径
- E.坐骨切迹宽度

(64~65题共用题干)

患者,女性,37岁。孕2产0,孕40周。因羊水Ⅱ度感染,行产钳助娩术,新生儿出生1分钟时心率90次/分,呼吸20次/分,不规则,四肢肌张力略小,吸痰时有轻度喉反射,躯干红而四肢青紫。

64.该新生儿出生1分钟Apgar评分是

- A.4分
- B.5分
- C.6分
- D.7分
- E.8分

65.对该新生儿的处理,不正确的是

- A.出生后立即擦干羊水及血迹,注意保暖
- B.胎头娩出后及时清除鼻咽部黏液、羊水
- C.出生后立即给予口对口人工呼吸
- D.在保持呼吸道通畅基础上,给予氧气吸入

E.应及时加用抗生素预防感染
(66~67 题共用题干)

患者,女性,27 岁。孕 1 产 0,孕 33+3 周。阴道流液 2 小时入院。检查:骨盆外测量径线正常,枕左前位,胎心率 150 次/分,不规则宫缩,肛查:宫口未开,胎先露头。

66.该患者的诊断不正确的是

- A.孕 1 产 0
- B.孕 33+3 周
- C.枕左前位
- D.胎膜早破
- E.早产临产

67.针对该患者的处理措施,正确的是

- A.嘱患者可下地活动
- B.破膜超过 48 小时后给予抗生素预防感染

C.给予地塞米松肌注促胎肺成熟

D.患者待产期间发生脐带脱垂后可继续观察

E.立即给予缩宫素静脉点滴终止妊娠
(68~69 题共用题干)

患者,女性,34 岁。1 年前人工流产后出现月经不调,诊断为子宫内膜不规则脱落。

68.支持该诊断的临床表现是

- A.月经周期不规则
- B.月经周期短,月经频发
- C.月经周期正常,经期长,出血量多,每次持续 9~10 日

D.停经 2 个月后突然大量阴道出血

E.经期伴有明显下腹部疼痛

69.该患者的主要治疗原则为

- A.止血
- B.调整月经周期
- C.促进排卵
- D.促进黄体及时萎缩
- E.防止子宫内膜病变

(70~71 题共用题干)

患者,女性,29 岁。平素月经规律。现

停经 2 个月,腹痛伴阴道流血多于月经量 1 天,子宫如孕 2 个月大小,见胚胎组织堵塞宫口。

70.该患者最恰当的诊断是

- A.先兆流产
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.完全流产
- E.稽留流产

71.对该患者最恰当的处理是

- A.肌注黄体酮保胎
- B.继续观察
- C.立即刮宫
- D.进一步查尿妊娠试验明确诊断

E.给予输液及止血剂
(72~73 题共用题干)

患者,女性,27 岁。孕 3 产 0,孕 36+2 周。阴道流液 4 小时入院。检查:骨盆外测量径线正常,枕右前位,估计胎儿体重 2 500 g,胎头浮,胎心率 135 次/分。肛查:宫口未开,先露头,S-3,触不到前羊膜囊。临床诊断为胎膜早破。

72.该患者不可能出现的并发症是

- A.早产
- B.流产
- C.脐带脱垂
- D.胎儿宫内窘迫
- E.宫腔感染

73.针对该患者的处理措施,正确的是

- A.嘱患者可下地活动
- B.破膜超过 48 小时后给予抗生素预防感染

C.给予地塞米松肌注促胎肺成熟

D.患者待产期间发生脐带脱垂后可继续观察

E.若患者已临产,可经阴道试产
(74~76 题共用题干)

患者,女性,55 岁。因阴道分泌物增多伴外阴奇痒 1 周就诊,既往糖尿病 2 年,近

1年前4次反复出现上述症状,妇科检查:外阴红肿,可见抓痕,阴道黏膜充血,阴道内大量豆腐渣样分泌物。

74.该患者可能的诊断为

- A.滴虫阴道炎
- B.细菌性阴道病
- C.淋病
- D.外阴阴道假丝酵母菌病
- E.外阴炎

75.为进一步确诊取该患者的阴道分泌物行悬滴检查,宜选用的悬液为

- A.4%碳酸氢钠
- B.10%氢氧化钾
- C.3%过氧化氢
- D.蒸馏水
- E.1%乳酸液

76.悬滴检查结果确诊后,对该患者进行治疗,不恰当的是

- A.积极控制血糖
 - B.以全身用药力主
 - C.应用广谱抗生素
 - D.于月经前复查阴道分泌物
 - E.性伴侣有症状需同时治疗
- (77~78题共用题干)

患者,女性,25岁。孕1产0。孕39周,因下腹坠痛、阴道流血性分泌物于凌晨2点急诊入院。患者自述腹痛难忍,大喊大叫,烦躁不安但宫缩高峰时强度不够,间歇时宫壁仍不能放松。观察3小时产程无进展。

77.患者可能的诊断是

- A.协调性宫缩乏力
- B.不协调性宫缩乏力
- C.协调性宫缩过强
- D.不协调性宫缩过强
- E.骨盆异常

78.有关以上诊断,描述正确的是

- A.子宫收缩起自两侧子宫角
- B.也称低张性子宫收缩乏力

C.此宫缩属于有效宫缩

D.多数产妇自觉宫缩弱

E.严重者出现肠胀气、尿潴留

(79~80题共用题干)

患者,女性,27岁。孕1产1。孕38周,经阴道分娩一女活婴;胎儿娩出后,即有阴道持续流血,流血量已超过加500 mL,血色鲜红能自凝。

79.该患者最可能的诊断

- A.子宫收缩乏力
- B.凝血功能障碍
- C.羊水栓塞
- D.软产道裂伤
- E.胎盘部分剥离

80.针对该患者,此时恰当的处理是

- A.应用缩宫素
- B.静脉输血
- C.按摩子宫
- D.应用抗生素预防感染
- E.娩出胎盘,检查软产道

(81~83题共用题干)

患者,女性,28岁。阴道分泌物增多伴外阴瘙痒1周就诊。妇科检查:阴道黏膜充血,阴道内大量乳酪样分泌物,取分泌物查到假丝酵母菌芽生孢子和假菌丝。

81.取分泌物行悬滴法检查假丝酵母菌,使用的溶液最好是

- A.0.9%氯化钠
- B.氢氧化钾
- C.3%过氧化
- D.蒸馏水
- E.4%碳酸氢钠

82.与发病无关的是

- A.长期应用抗生素
- B.糖尿病患者
- C.口腔、肠道、阴道假丝酵母菌互相传染
- D.大量雌激素治疗
- E.长期使用避孕套避孕

83.治疗措施不恰当的是

- A. 查找诱发因素
- B. 以局部用药为主
- C. 选用广谱抗生素

- D. 有症状的性伴侣应同时治疗
- E. 治疗后应随访至症状消失

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(84~86 题共用备选答案)

- A. 均小骨盆
- B. 扁平骨盆
- C. 横径狭小骨盆
- D. 漏斗骨盆
- E. 畸形骨盆

84. 骨盆形态正常,各径线均缩短 2 cm 以上的骨盆类型是

85. 骨盆入口前后径短、横径多正常,呈横扁圆形的骨盆类型是

86. 坐骨棘间径<10 cm,坐骨结节间径<8 cm,坐骨结节间径与出口后矢状径之和<15 cm,耻骨弓角<90°的骨盆类型是

(87~89 题共用备选答案)

- A. 产后 2~3 天
- B. 产后 3~4 天
- C. 产后 5~6 天
- D. 产后 2 周
- E. 产后 4~6 周

87. 产后沮丧通常出现在

88. 产后沮丧高峰期出现在

89. 产后抑郁一般出现在

(90~92 题共用备选答案)

- A. 产后 24 小时
- B. 产后 3 天
- C. 产后 10 天
- D. 产后 4~6 周
- E. 产后 6 周

90. 正常产褥期的时间是

91. 正常分娩后子宫降至骨盆腔的时间是

92. 正常恶露持续的时间是

(93~95 题共用备选答案)

- A. 手术摘除
- B. 青霉素
- C. 局部治疗
- D. 头孢曲松钠
- E. 局部治疗+全身治疗

93. 治疗淋病的药物是

94. 滴虫阴道炎的治疗是

95. 宫颈息肉的治疗是

(96~98 题共用备选答案)

A. 诊断性刮宫

B. 大量应用雌激素,刺激内膜再生修复

C. 大量应用孕激素,稳定溶酶体酶,制止组织崩解出血

D. 使用雄激素,对抗雌激素,减少盆腔充血和减少子宫血管张力

E. 大量应用止血药

96. 患者,女性,14 岁。停经 3 个月,此次月经来潮持续 2 周余,量较多,中度贫血,最佳止血方案是

97. 患者,女性,35 岁。已婚。停经 3 个月,尿 hCG(-),大量阴道出血伴重度贫血,立即有效的止血方案是

98. 患者,女性,50 岁。月经紊乱 1 年余,停经 3 个月后,大量阴道出血伴重度贫血,立即有效的止血方案是

(99~100 题共用备选答案)

A. 1~2 天

B. 2~3 天

C. 7~10 天

D. 10~14 天

E. 2~3 周

99. 产后新生儿恢复出生时体重的时间

100. 产后新生儿出现生理性黄疸的时间



金英杰医学
WWW.JINYINGJIE.COM

专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 正常分娩保护会阴的时间是
 - A. 初产妇宫口开全时
 - B. 初产妇胎头着冠时
 - C. 初产妇宫口开大 4~5 cm, 宫缩规律有力时
 - D. 经产妇宫口开全时
 - E. 初产妇胎头拨露使阴唇后联合紧张时
2. 对产妇进行母乳喂养指导, 内容错误的是
 - A. 每隔 3 小时哺喂一次, 一次 1 小时
 - B. 哺喂后将新生儿竖抱拍背
 - C. 出生后 6 个月纯母乳喂养
 - D. 两侧乳房交替哺乳
 - E. 婴儿含接不良可以造成产妇乳头皲裂
3. 新生儿沐浴的水温是
 - A. 26 °C
 - B. 30 °C
 - C. 35 °C
 - D. 40 °C
 - E. 46 °C
4. 关于过期妊娠的描述, 正确的是
 - A. 凡预产期超过 2 周, 尚未临产者均为过期妊娠
 - B. 妊娠过期越久, 胎儿体重越大
 - C. 过期妊娠易发生胎儿窘迫
 - D. 与孕迨孕激素相对过少有关
 - E. 过期妊娠孕妇血雌二醇水平正常
5. 羊水过多患者的护理措施中, 正确的是
 - A. 穿刺放羊水之前腹部放置沙袋以防血压骤降
 - B. 一次穿刺放羊水量不超过 2 000 mL
 - C. 绝对卧床休息, 左侧卧位
 - D. 指导孕妇低钠饮食, 防止便秘
 - E. 以上都不对
6. 对妊娠期重症肝炎患者的处理, 不恰当的是
 - A. 妊娠期限制蛋白质入量
 - B. 一经诊断立即终止妊娠
 - C. 分娩方式以剖宫产为宜
 - D. 分娩时准备新鲜血液
 - E. 产褥期应用广谱抗生素预防感染
7. 关于巨大儿的说法, 错误的是
 - A. 出生体重达到或超过 4 000 g 者
 - B. 多见于父母身材高大
 - C. 常引起头盆不称
 - D. 常导致肩难产
 - E. 记智力超常
8. 胎盘娩出前即有持续大量阴道流血, 有凝血块, 考虑原因是
 - A. 子宫收缩乏力
 - B. 胎盘剥离不全
 - C. 子宫胎盘卒中
 - D. 软产道裂伤
 - E. 凝血功能障碍
9. 关于产后抑郁的描述, 不正确的是
 - A. 可由多方面的因素造成
 - B. 是一种精神病
 - C. 有家族遗传
 - D. 与孕期不良生活事件有关
 - E. 可表现为伤害婴儿或自我伤害行为
10. 可引起胎儿智力低下的噪声需达到
 - A. 80 分贝
 - B. 85 分贝
 - C. 90 分贝
 - D. 95 分贝

- E.100 分贝
- 11.急性盆腔炎患者宜采取的体位是
- A.平卧位
B.侧卧位
C.半卧位
D.头低臀高位
E.胸膝卧位
- 12.宫颈重度糜烂患者,行宫颈刮片为巴氏Ⅲ级,下一步处理应是
- A.3 个月后复查宫颈刮片
B.激光治疗
C.宫颈锥形切除
D.行子宫颈活体组织检查
E.属正常改变,无需处理
- 13.宫颈与阴道黏膜可见散在的红色斑点,阴道分泌物呈泡沫状,应考虑的诊断是
- A.细菌性阴道炎
B.盆腔炎
C.外阴阴道假丝酵母菌病
D.血小板减少性紫癜
E.滴虫性阴道炎
- 14.关于孕期补充维生素 D 的健康指导内容的是
- A.每日 10 $\mu\text{g}/\text{d}$
B.晒太阳
C.能促进钙、磷的吸收
D.适当食用肝脏
E.少吃蛋黄
- 15.关于孕妇便秘的护理,错误的是
- A.养成定时排便的习惯
B.多吃新鲜蔬菜、水果
C.增加饮水量
D.适当运动
E.自行使用大便软化剂
- 16.有关破膜的处理,错误的是
- A.破膜后立即听胎心音
B.记录破膜时间
C.观察羊水量及性状
D.观察有无脐带脱垂征象
E.破膜超过 24 小时者,考虑给予抗生素
- 17.新生儿出生 1 分钟 Apgar 评分为 4 分,对该患儿的处置首选
- A.清除呼吸道黏液和羊水
B.口对口进行人工呼吸
C.肌注 25%尼可刹米 0.3 mL
D.脐静脉缓慢注射小三联针
E.乙醇擦胸
- 18.妊娠期高血压疾病患者发生抽搐时,首要的护理措施是
- A.保持呼吸道通畅
B.加床档,防止受伤
C.观察病情,详细记录
D.严密观察及时发现产兆
E.置患者于安静、暗光的单人病室
- 19.对孕妇及家属进行有关胎盘早剥预防的健康宣教中错误的是
- A.积极预防和治疗妊娠期高血压疾病
B.妊娠晚期避免腹部外伤
C.行外倒转术动作要轻柔
D.羊水过多者破膜后应尽快使羊水流
E.妊娠晚期避免长时间仰卧位
- 20.有关协调性子宫收缩乏力,描述正确的是
- A.子宫收缩节律性、对称性和极性均正常,仅收缩力弱
B.容易发生胎儿宫内窘迫
C.不宜静脉滴注缩宫素
D.潜伏期不宜静脉推注地西泮
E.多数产妇自觉持续性腹痛,且产程延长
- 21.确定胎膜早破的诊断性检查不包括
- A.腹部四步触诊
B.阴道排液 pH 试纸检查呈弱碱性
C.阴道液干燥片检查有羊齿状结晶
D.羊膜镜检查可直视胎先露部
E.肛查时上推胎儿先露部流液量可

增多

22.关于子宫破裂患者的护理措施,错误的是

A.迅速输液、输血,短时间内补足血容量

B.抢救休克的同时,迅速作剖宫产的术前准备

C.给予患者补充电解质及碱性药物,以纠正酸中毒

D.子宫破裂患者术后只需应用常规剂量抗生素预防感染即可

E.严密观察并记录患者的生命体征和出入液量

23.关于晚期产后出血的描述,错误的是

A.指分娩 24 小时以后,在产褥期内发生的出血

B.少量或中等量阴道出血时,给予足量、广谱抗生素控制感染

C.由胎盘、胎膜残留引起出血者多见

D.剖宫产术后出血多发生在术后 2~3 周

E.剖宫产术后出现大量阴道流血时,行刮宫术

24.羊水穿刺作为产前诊断的方法,其实

施时间为

A.妊娠 11~13 周

B.妊娠 13~14 周

C.妊娠 16~22 周

D.妊娠 20~24 周

E.妊娠 24~28 周

25.关于盆腔炎的描述,不正确的是

A.盆腔炎大多发生在性活跃期的女性

B.最常见的是输卵管炎及输卵管卵巢炎

C.分急性盆腔炎和慢性盆腔炎

D.可发生癌变

E.可导致不孕

26.关于前庭大腺炎的描述,正确的是

A.好发于围绝经期妇

B.月经期、产褥期细菌侵入腺管内引起

C.急性炎症消退后易形成前庭大腺脓肿

D.双侧同时感染

E.易发生癌变

27.子宫颈癌患者行广泛子宫切除术后留置尿管的时间一般为

A.1~2 天

B.3~4 天

C.4~7 天

D.7~14 天

E.14~21 天

28.关于子宫肌瘤的叙述,正确的是

A.多有腹痛

B.其发生与雄激素有关

C.宫体部肌瘤最常见

D.一经发现需立即手术

E.不孕为最常见表现

29.关于孕期维生素 D 的补充,说法错误的是

A.每日 30 μg/d

B.室外活动

C.能促进钙、磷的吸收

D.多喝牛奶

E.促进胎儿骨、齿形成

30.继发性闭经是指月经初潮后,因某种病理性原因停经在

A.6 个月以上

B.5 个月以上

C.4 个月以上

D.3 个月以上

E.2 个月以上

31.有关产褥期护理,错误的是

A.每日测量生命体征

B.室内要经常通风换气

C.外阴冲洗每日 2 次

D.产妇可多取蹲位,锻炼会阴部肌肉张力

E.产妇为预防便秘可多食蔬菜水果

32.关于对流产患者的给理,正确的是

A.不全流产患者的首要措施是卧床休息以免刺激

B.稽留流产患者一般不需特殊处理

C.所有患者均应常规应用抗生素预防感染

D.对于难免流产患者应及时做好终止妊娠的准备

E.对于完全流产患者应常规应用缩宫素促进子宫收缩

33.接受期待疗法的前置胎盘患者的护理措施中,最恰当的是

A.可肛查,禁止阴道检查

B.严密监测血压,每4小时测量一次

C.立即输血,积极补充血容量

D.绝对卧床休息,左侧卧位

E.高危门诊随访观察

34.对过期妊娠患者进行处理时,正确的是

A.卧床休息,仰卧位为宜

B.羊水污染者必须立即做好剖宫产准备

C.宫颈条件不成熟者均应做好剖宫产准备

D.宫颈条件成熟者可人工拨膜后经阴道试产

E.以上均不对

35.关于好娠合并急性病毒性肝炎的处理,不正确的是

A.孕早期不宜终止妊娠,因可增加肝损害

B.妊娠晚期在积极护肝治疗下继续妊娠

C.分娩期应缩短第二产程

D.分娩前肌内注射维生素

E.产褥期应用抗生素预防感染

36.不支持胎膜早破诊断的是

A.阴道流液

B.肛查触不到前羊膜腔

C.胎膜破裂发生在第一产程

D.羊水涂片镜检可见羊齿状结晶

E.阴道排液 pH 试纸检查呈弱碱性

37.关于晚期产后出血的描述,正确的是

A.指分娩24小时以后至产后1周内发生的出血

B.剖宫产术后出血常发生在产褥期早期

C.胎盘、胎膜残留引起出血者多见

D.妇科检查子宫大而软,宫口闭合

E.产后滋养细胞肿瘤不会引起晚期产后出血

38.关于产褥感染的描述,正确的是

A.产褥病率只由产褥感染引起

B.急性盆腔腹膜炎产妇可见“冰冻骨盆”

C.贫血、产程延长易诱发产褥感染

D.多为需氧菌感染

E.剖宫产可降低产褥感染的发生率

39.关于淋病的描述,错误的是

A.主要通过性接触直接传播

B.临床症状消失7天后,取宫颈管分泌物涂片培养,阴性者即为治愈

C.多数患者感染淋病后早期无症状

D.分娩时经软产道感染新生儿

E.子宫颈管感染最多见

40.滴虫阴道炎的治愈标准是

A.分泌物悬滴法一次检查滴虫转阴性

B.临床症状完全消失

C.连续三次月经期后检查滴虫阴性

D.连续三次月经期前检查滴虫阴性

E.以上都不是

41.妇科腹部手术前一般禁食

A.2小时

B.4小时

C.8小时

D.16小时

E.24小时

42.子宫内膜癌最常见的转移途径是

A.无转移

- B.直接蔓延
- C.腹腔种植
- D.淋巴转移
- E.血行转移

43.患者,女性,32岁。孕1产0,孕32周。主诉小腿及踝部有水肿,休息后可好转,腰背痛、便秘,偶有下肢肌肉痉挛。血常规检查示贫血。对该患者进行健康指导时,内容不正确的是

A.嘱孕妇左侧卧位,下肢垫高 15° ,限制水分

- B.养成定时排便的习惯
- C.适当增加瘦肉、蛋黄的摄入
- D.多吃含纤维素多的蔬菜、水果
- E.适当限制盐的摄入

44.患者,女性,32岁。孕1产0,孕41周。平素月经周期正常,无其他并发症,NST两次无反应,OCT 10分钟内3次宫缩,每次持续40~50秒,均出现晚期减速,1周前24小时尿15 mg,现仅8 mg,应采取的措施是

- A.立刻剖宫产
- B.立即人工破膜引产
- C.口服雌激素3天
- D.缩宫素引产
- E.1周后复查

45.患者,女性,33岁。孕1产0,孕35周。腹部受撞击后腹痛,伴少许阴道流血,胎心变快,B超拟诊断为胎盘早剥,正确的处理是

- A.肛查宫口开大情况
- B.阴道检查宫口开大情况
- C.镇静剂减轻症状
- D.立即剖宫产
- E.住院观察,期待疗法

46.患者,女性,孕1产0,孕40周。中骨盆狭窄,在严密监护下试产,现宫口已开全,胎头双顶径达坐骨棘水平,可采取

- A.等待自然分娩
- B.灌肠促进宫缩

- C.作好阴道助产术准备
- D.遵医嘱给予镇静、镇痛药
- E.作好剖宫产准备

47.患者,女性,24岁。孕2产0,孕39+6周。因第二产程延长,采用胎头吸引器助娩,新生儿体重4000g,胎儿娩出时伴有阴道大量持续出血,有凝血块。该患者的出血原因最可能是

- A.产后宫缩乏力
- B.软产道裂伤
- C.胎盘剥离不全
- D.凝血功能障碍
- E.子宫不全破裂

48.患者,女性,26岁。孕1产0,孕38周估计胎儿体重3600g,在人工破膜和缩宫素静脉滴注下,5小时宫口开大9cm,突然脐下2指处可见病理性缩复环,导尿呈浅粉色,那么针对该患者最适宜的处理是

- A.立即停用缩宫素,等待自然分娩
- B.给予镇静剂后等待自然分娩
- C.给予镇静剂后行阴道助产
- D.立即行胎头吸引助产术
- E.立即行剖宫产术

49.患者,女性,32岁。滴虫性阴道炎反复发作,现因怀孕2个月,到医院就诊。护士健康宣教内容错误的是

- A.保持外阴清洁
- B.夫妻双方同治
- C.复查阴道分泌物查找滴虫,3次均阴性为治愈

- D.滴虫阴性后继续一疗程以巩固疗效
- E.孕早期不宜阴道用药,可口服甲硝唑

50.患者,女性,17岁。高三学生。13岁初潮,月经5天/25~30天。近半年来月经来潮时周身乏力,下腹部、腰骶部明显疼痛,伴恶心、呕吐,持续1天,需请假卧床。为该患者提供的健康指导中正确的是

A.出现痛经说明生殖器官有器质性病变,应做全面检查

B.冷饮有助于镇静、转移注意力以达到缓解作用

C.经期可增加运动促进子宫局部血液循环,减轻疼痛

D.应加强自我心理调整,缓解紧张情绪

E.可遵医嘱服用吗啡等止痛药

51.患者,女性,25岁。结婚2年未孕,月经周期规律,现停经40天,近1周觉乳房胀痛,尿妊娠试验(+),基础体温曲线示高温相已达26天,最可能的诊断是

A.月经前期

B.卵巢早衰

C.早期妊娠

D.子宫性闭经

E.垂体性闭经

52.患者,女性,24岁。孕40周,临产12小时入院。检查:骨盆外测量径线正常,枕右前位,估计胎儿体重3.3kg,宫缩持续40~50秒,间歇3~4分钟,中等强度,胎心基线120次/分。肛查:宫口开5cm,先露头,胎膜未破。应做的处理是

A.剖宫产

B.人工破膜

C.肌注哌替啶

D.静脉滴注缩宫素

E.温肥皂水灌肠

53.新生儿出生后1分钟。护理评估发现哭声弱,呼吸浅而不规则,肌张力松弛,稍有喉反射,躯干红而四肢呈青紫色,心率89次/分。该新生儿的Apgar评分为

A.1分

B.2分

C.3分

D.4分

E.5分

54.患者,女性,26岁。孕34周,外伤后突发剧烈腹痛,伴少量阴道流血,检查:BP 75/60 mmHg, P 120次/分,面色苍白,宫底剑突下2横指,呈板状硬,护士需采取的首

要的护理措施是

A.严密观察病情,期待自然分娩

B.卧床休息,抬高臀部

C.将患者置于明亮房

D.心理调适,减轻患者焦虑

E.立即开放静脉通路,迅速补充血容量

55.患者,女性,25岁。孕24周,近1周来腹部迅速增大,腹胀痛,气促心悸,不能平卧,表情痛苦。查体:宫高37cm,腹围100cm,胎心音遥远,胎位不清。该患者最可能的诊断是

A.急性羊水过多

B.慢性羊水过多

C.胎盘早剥

D.先兆流产

E.前置胎盘

56.患者,女性,孕1产0。临产后4小时胎头仍不入盆,此时应测量的最有价值的径线是

A.对角径

B.出口横径

C.出口后矢状径

D.坐骨棘间径

E.坐骨切迹宽度

57.患者,女性,孕1产0,孕36周,胎膜早破,头未入盆。针对该患者的护理措施错误的是

A.绝对卧床休息

B.禁止灌肠

C.做好会阴护理

D.严密观察胎心及羊水性状

E.增加肛查次数了解胎头是否入盆

58.患者,女性,28岁。孕1产1,急产。胎儿娩出后患者突然发生呼吸困难,迅速出现循环衰竭、休克及昏迷,最大可能的诊断是

A.休克

B.子痫

C.脑卒中

D.羊水栓塞

- E.急性心力衰竭
- 59.患者,女性。于6小时前顺产一正常女婴,提供的护理措施中错误的是
- A.母婴同室,室温保持在20~24℃
 B.母亲哺乳时,观察新生儿吸吮状态、母亲乳房情况
 C.必须为新生儿采取保暖措施
 D.给新生儿换尿布和沐浴时动作迅速
 E.新生儿以仰卧位最好
- 60.患者,女性,29岁。孕34周,规律性腹痛3小时,无阴道流水及流血。阴道检查宫口未开,宫颈管未消失。此时,最恰当的处理是
- A.缩宫素引产
 B.尽快终止妊娠
 C.促胎肺成熟同时等待自然分娩
 D.促胎肺成熟同时剖宫产
 E.抑制宫缩同时促胎肺成熟
- 61.患者,女性,孕1产0。孕40周,轻度头盆不称,在严密监护下试产。给予的护理措施不包括
- A.专人守护,保证良好的产力
 B.灌肠促进宫缩
 C.试产过程一般不用镇静、镇痛药
 D.关心患者饮食、营养、水分、休息
 E.试产2~4小时,胎头仍未入盆,并伴胎儿窘迫者,则应停止试产
- 62.患者,女性,28岁。孕1产0。孕39周,阴道流液4小时入院,患者诊断为胎膜早破。针对该患者的护理措施,错误的是
- A.绝对卧床休息
 B.尽量多采取侧卧位
 C.胎先露部未衔接时应抬高臀部
 D.保持外阴清洁,给予灌肠
 E.放置消毒会阴垫于患者臀下
- 63.患者,女性,65岁。近半个月来阴道流黄水样分泌物,有时带血,经检查排除恶性肿瘤。最可能的诊断为
- A.滴虫阴道炎
 B.老年性阴道炎
 C.细菌性阴道病
 D.宫颈息肉
 E.子宫内膜炎
- 64.患者,女性,15岁。至今未来月经,近半年来出现周期性下腹疼痛,今晨在下腹正中扪及一鸡蛋大小肿块来就诊。查体:发育中等,第二性征发育良好。下一步为该患者采取的诊疗措施中不需要的是
- A.腹部B超检查
 B.血hCG测定
 C.妇科检查
 D.手术切开闭锁部位,引流经血
 E.向患者解释闭经的原因
- 65.患者,女性,38岁。葡萄胎病史10年,2个月前开始出现无诱因持续阴道流血,量时多时少诊断病理报告结果:见滋养细胞增生活跃,未见绒毛结构。最可能的诊断是
- A.绒毛膜癌
 B.子宫内膜癌
 C.侵蚀性葡萄胎
 D.功血
 E.子宫肌瘤
- 66.患者,女性,29岁。孕2产1。因葡萄胎清宫术后4个月,咳嗽、咯血10日入院。尿妊娠试验(+).胸部X线摄片发现左肺棉球状阴影。首先考虑的原因是
- A.脑转移
 B.呼吸道感染
 C.肺癌
 D.肺结核
 E.侵蚀性葡萄胎肺转移
- (67~68题共用题干)
- 患者,女性,26岁。孕1产0,孕31周。感觉头晕、乏力及食欲差10余天。查体:胎心149次/分,LOA,骨盆测量正常,血红蛋白80g/L,血细胞比容25%。
- 67.该患者初步诊断为
- A.巨幼细胞贫血

- B. 缺铁性贫血
- C. 地中海贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 以上都不对

68. 治疗方式应首选

- A. 口服叶酸
- B. 口服硫酸亚铁
- C. 少量多次输血
- D. 肌注维生素
- E. 肌注右旋糖酐铁

(69~70 题共用题干)

患者,女性,28 岁。自然分娩后第 7 天,体温 39℃,下腹部胀痛,脓血性恶露,有臭味,子宫复旧不良,压痛明显。

69. 此患者最可能的诊断是

- A. 膀胱炎
- B. 乳胀
- C. 乳腺炎
- D. 产褥感染
- E. 阑尾炎

70. 该患者下腹部疼痛,伴左下肢肿胀,可能发展为

- A. 盆腔脓肿
- B. 下肢血栓性静脉炎
- C. 阑尾脓肿
- D. 肾盂肾炎
- E. 败血症

(71~73 题共用题干)

患者,女性,19 岁。因体育课后出现下腹痛 6 小时就诊。患者腹痛时轻时重,伴恶心、呕吐、发热,诊断为“急性肠胃炎”。治疗 3 天症状缓解后又出现,症状如前,T 38.6℃,BP 110 mmHg,WBC $11.5 \times 10^9/L$ 。查体:下腹痛、反跳痛,肌紧张,以右侧为甚。

71. 为明确诊断,下一步应行

- A. 腹部 X 光摄片
- B. 腹腔镜检查
- C. 继续输液
- D. B 超检查

E. 大便潜血检查

72. 经会诊,诊断为右侧卵巢畸胎瘤扭转合并感染。处理手段不正确的是

- A. 密切观察病情
- B. 期待治疗多可自然减轻
- C. 抗感染治疗
- D. 手术治疗
- E. 补液纠正水、电解质失衡

73. 针对该患者的护理措施,不正确的是

- A. 嘱患者勤翻身
- B. 遵医嘱给予抗炎、补液治疗
- C. 观察生命体征变化
- D. 记录出入量
- E. 积极进行术前准备

(74~75 题共用题干)

患者,女性,28 岁。孕 1 产 1,孕 40+3 周。经阴道分娩一男活婴,胎盘在胎儿娩出后 10 分钟内自然娩出,方式是胎儿面娩出,检查胎盘、胎膜完整。分娩结束后患者继续在产房内观察了 2 小时,2 小时后无异常移至病房。

74. 关于胎盘剥离、助娩的描述,正确的是

- A. 胎儿娩出后到胎盘娩出前,宫缩持续进行,不暂停
- B. 胎盘剥离征象之一是用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段,子宫体上升而外露的脐带也随之回缩
- C. 胎盘娩出以胎儿面娩出式多见,特点是胎盘从边缘开始剥离再向中央剥离,所以先有较多出血后再排出胎盘
- D. 胎盘未完全剥离前,术者可用手按揉、下压宫底或牵拉脐带
- E. 胎盘娩至阴道口时,术者用双手捧住胎盘,向一个方向旋转变换并缓慢向外牵拉,使胎盘、胎膜完整排出

75. 关于患者产后 2 小时在产房内的护理内容,不正确的是

- A. 为患者提供保暖措施

B.观察患者的子宫收缩情况、宫底高度等

C.每15~30分钟为患者测量一次血压、脉搏

D.若患者自觉肛门坠胀感,不用处理,产后2小时即可送回病房

E.若患者宫底上升,应挤压宫底排出积血,同时按摩子宫,给予宫缩剂

(76~77题共用题干)

某产妇,产后第1天,自诉阵发性腹部疼痛,无恶心、呕吐,宫底在脐下2横指,白细胞 $12.5 \times 10^9/L$,外阴轻度水肿。

76.可能的诊断是

- A.产褥感染
- B.产后宫缩痛
- C.盆腔炎
- D.子宫内膜炎
- E.外阴伤口感染

77.对此患者进行护理中,错误的是

- A.向产妇解释疼痛原因
- B.会阴擦洗每日2次
- C.会阴部用红外线照射
- D.观察患者子宫底高度及恶露情况
- E.1:5000高锰酸钾坐浴

(78~79题共用题干)

患者,女性,35岁。因侵蚀性葡萄胎收入院治疗。检查:BP 100/60 mmHg, R 13次/分, P 92次/分,双合诊检查提示子宫饱满、质软,血hCG明显高于正常值。

78.应用化疗药物的第5日患者出现口腔溃疡、腹痛、腹泻,此时该患者出现的问题属于

- A.消化道反应
- B.皮肤黏膜损伤
- C.肝肾功能损伤
- D.周围神经毒性
- E.造血功能障碍

79.对患者进行护理的同时,应对其进行健康教育,内容正确的是

A.少进食,以免诱发口腔溃疡恶化

B.在饭后立即输注化疗药物,避免饭前输注引起食欲缺乏

C.进食低蛋白、高维生素、易消化饮食

D.尽量避免刺激口腔溃疡,故减少漱口次数

E.腹痛、腹泻急性期可禁食

(80~82题共用题干)

患者,女性,孕1产0。孕39+11周,临产12小时入院。检查:骨盆外测量径线正常,估计胎儿体重3400g,宫缩持续40~45秒,间歇3~4分钟,中等强度,胎心率基线130次/分。肛查:宫口开大5cm,羊膜囊突,先露头。

80.患者入院后恰当的处理是

- A.温肥皂水灌肠
- B.肌内注射哌替啶
- C.静脉滴注缩宫素
- D.人工破膜
- E.剖宫产

81.复查肛门检查,结果是大囟门位于8点,小囟门位于2点,那么胎方位是

- A.枕左前位
- B.枕左后位
- C.枕左横位
- D.枕右前位
- E.枕右后位

82.新生儿出生时,心率110次/分,律齐,呼吸浅,不规则,四肢活动好,吸痰时喉部恶心,身体红润,四肢发绀,那么Apgar评分是

- A.6分
- B.7分
- C.8分
- D.9分
- E.10分

(83~84题共用题干)

患者,女性,31岁。孕2产0,孕42+2周,诊断为过期妊娠,入院后予缩宫素引产,

2 小时后宫缩过强,胎心 168 次/分,羊水 II 度污染。

83.目前应采取的首要护理措施是

- A.左侧卧位
- B.吸氧
- C.立即停滴缩宫素
- D.做好剖宫产术前准备
- E.纠正酸中毒

84.关于该患者出现胎儿窘迫的处理,错误的是

- A.严密监测胎心变化情况
- B.给患者吸氧
- C.发生在第一产程者,经处理无效,行剖宫产
- D.发生在第二产程者,行助产以协助胎儿尽快娩出
- E.宫口开全后,无论先露高低,均应阴道助产分娩

(85~86 题共用题干)

患者,女性,36 岁。已婚。主诉外阴瘙痒。阴道检查见分泌物多而稀薄,呈灰黄色泡沫状,擦去分泌物见阴道黏膜有散在的红点。

85.根据该患者的临床表现,需做的检查是

- A.血常规
- B.尿常规
- C.B 超
- D.阴道脱落细胞检查
- E.阴道分泌物悬滴检查

86.化验报告提示找到活的滴虫,护士向该患者讲解滴虫性阴道炎的主要传播途径是

- A.公共浴池
- B.性交传播
- C.公用坐便器
- D.游泳池
- E.共用毛巾

87.患者了解传播途径后,护士进一步做健康教育的内容不包括

- A.用药后月经干净后需复查阴道分泌物
- B.治疗期间需避孕
- C.每天更换内裤,煮沸消毒
- D.督促性伴侣来医院检查
- E.以局部治疗为主

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(88~90 题共用备选答案)

- A.5 g
- B.28 mg
- C.15 g
- D.80~100 mg
- E.10 mg

88.妊娠早期每日增加蛋白质的量是

89.妊娠晚期每日增加蛋白质的量是

90.孕妇每日维生素 D 的摄入量是

(91~92 题共用备选答案)

- A.早发性胎心减速
- B.晚期减速
- C.变异减速

D.NST 有反应

E.NST 无反应

91.足月临产,胎膜破裂排出棕黄色羊水,胎儿监护时可能出现

92.临产后,由于子宫收缩时脐带受压兴奋迷走神经,胎儿监护时可能出现

(93~94 题共用备选答案)

- A.吸氧
- B.引产
- C.硫酸镁静脉滴注
- D.人工破膜
- E.立即剖宫产

93.患者,女性,25 岁。孕 1 产 0,孕 39 周。

B 超检查显示羊水指数为 6 cm, 胎儿发育正常, 骨盆测量正常, 首选的处理方法是

94. 羊水过少产妇, 在产程观察中发现有胎儿窘迫表现, 宫口开大 2 cm, 先露头, 除外胎儿畸形后, 首选的治疗方案是

(95~96 题共用备选答案)

A. 经前宫颈黏液结晶涂片见到羊齿植物叶状结晶

B. 月经第 5 天诊刮子宫内膜呈混合型变化

C. 基础体温双相型, 但上升缓慢

D. 月经第 5 天诊刮子宫内膜呈分泌期变化

E. 基础体温双相型, 高温相持续 8 天

95. 患者, 女性, 32 岁。12 岁初潮, 既往月经正常。现停经 50 天后, 阴道流血持续 20 天, 量时多时少, 无腹痛。妇科检查: 宫颈光滑, 宫颈内有透明分泌物, 子宫正常大小, 双附件未触及。推测此患者还可能存在的异常是

96. 患者, 女性, 25 岁。14 岁初潮, 月经周期 28~30 天。近半年月经期延长, 每次持续 8~14 天, 经期无腹痛, 妇科检查未见异常。推测此患者还可能存在的异常是

(97~98 题共用备选答案)

A. 嘱患者用软毛刷刷牙, 不要使用牙签剔牙, 防止牙龈出血

B. 详细记录 24 小时出入液量, 了解尿量的情况及出入是否平衡

C. 鼓励患者多咀嚼、多说话, 以利唾液的分泌

D. 遵医嘱给予镇静、止吐药物, 必要时给予静脉营养输注

E. 立即停止用药, 局部采取封闭治疗

97. 化疗第 5 天, 患者出现口腔溃疡, 针对这一症状应采取的护理措施是

98. 化疗过程中药物外渗, 应采取的护理措施是

(99~100 题共用备选答案)

A. 温肥皂水灌肠

B. 四步触诊

C. 指导产妇张口哈气, 减少屏气

D. 肌注哌替啶或吗啡

E. 24 小时 1 次肛查

99. 纠正不协调性宫缩乏力

100. 子宫收缩过强者, 宫口开全, 防止急产发生



考前点睛班