

## 护理学（中级）各亚专业资格考试试卷 基础知识

1. 胃壁细胞可分泌

- A. 胃液
- B. 碱性黏液
- C. 促胃液素
- D. 胃蛋白酶原
- E. 盐酸和内因子

答案：E

2. 断肢再植属于

- A. 自体移植
- B. 同种移植
- C. 异质移植
- D. 结构移植
- E. 异体移植

答案：A

3. 关于小儿特异性免疫的特征，正确的是

- A. 补体系统功能差
- B. 粘膜屏障作用不成熟
- C. 皮肤的屏障作用不成熟
- D. T淋巴细胞免疫功能不健全
- E. 中性粒细胞吞噬作用弱

答案：D

4. 肠内营养的供给途径不包括

- A. 经鼻胃管
- B. 经鼻肠管
- C. 经口摄入
- D. 经空肠造瘘
- E. 经中心静脉

答案：E

5. 关于重症胰腺炎的病因，正确的是

- A. 以细菌感染为主，和胆道疾患无关
- B. 某些感染性疾病也可诱发
- C. 一般不会由药物诱发
- D. 可能与低脂血症有关
- E. 可能与低钙血症有关

答案 B

6. 肾移植术后患者超急性排斥反应一般发生于术后

- A. 24 小时内



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

- B. 36 小时内
- C. 48 小时内
- D. 72 小时内
- E. 96 小时内

答案：A

7. 关于护士的行为规范，叙述错误的是

- A. 尊重关心爱护患者
- B. 为患者提供优质服务
- C. 密切观察病情变化
- D. 没有对医嘱的审查责任
- E. 工作严谨、慎独，对执业行为负责

答案：D

8. 肠结核最常见的好发部位是

- A. 回盲部
- B. 升结肠
- C. 横结肠
- D. 降结肠
- E. 乙状结肠

答案：A

9. 目前认为子宫肌瘤发生最可能的相关因素是

- A. 晚婚、晚育
- B. 早婚、早育
- C. 多个性伴侣
- D. 高血压、肥胖
- E. 雌激素的长期刺激

答案：E

10. 急性乳腺炎的正确预防措施是

- A. 预防性应用抗生素
- B. 尽量不喂乳
- C. 乳头破损时，边治疗边喂乳
- D. 纠正乳头内陷
- E. 乳管不通畅无须处理

答案：D

11. 大面积烧伤早期发生的休克多为

- A. 神经源性休克
- B. 心源性休克
- C. 低血容量性休克
- D. 感染性休克
- E. 过敏性休克



余英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

---

答案：C

12. 容易引起颅内感染的骨折是

- A. 颅盖骨折
- B. 颅底骨折
- C. 线形骨折
- D. 闭合性骨折
- E. 颅顶骨折

答案：B

13. 女性性功能成熟的标志是

- A. 月经初潮
- B. 规律月经
- C. 子宫增大
- D. 乳房丰满
- E. 阴毛出现

答案：A

14. 下肢深静脉血栓脱落容易出现栓塞的部位是

- A. 肾
- B. 脑
- C. 肝
- D. 肺
- E. 心

答案：D

15. 肝胆疾病首选的检查是

- A. B超
- B. 腹部平片
- C. 经皮肝穿刺胆管造影
- D. 胆道镜
- E. 内镜逆行胰胆管造影

答案：A

16. 患者女，38岁，身体消瘦，近两周咳嗽、咳痰、低热、盗汗，应用抗生素静滴7天，效果不明显，偶尔咳嗽痰中带血，X线胸片显示右上肺有一不典型片状阴影。首先考虑的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 病毒性肺炎
- D. 胸腔积液
- E. 肺脓肿

答案：B



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

17. 患者女，32岁。4年前经阴道分娩一子。则宫颈口形状最可能为

- A. 圆形
- B. 横椭圆形
- C. 横裂形
- D. 纵椭圆形
- E. 竖裂形

答案：C

18. 患者男，58岁。高血压病多年。平素有心前区不适，持续3~5分钟，含服硝酸甘油可缓解。今晨患者出现心前区疼痛，持续2小时不缓解。为明确诊断，首选的检查是

- A. 心电图+心肌酶学
- B. X线胸片
- C. 运动试验
- D. Holter
- E. 超声心动图

答案：D

19. 患者女，58岁。独居，室内用煤炉取暖，邻居发现其神志不清，面色潮红，口唇呈櫻桃红色，大汗。对诊断有价值的检查是

- A. 胆碱酯酶活性测定
- B. 碳氧血红蛋白测定
- C. 心肌酶学测定
- D. CO<sub>2</sub>结合力测定
- E. 碱性磷酸酶测定

答案：A



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

20. 患者男，48岁。吞咽哽咽感半年，目前仅能进半流质食物。查体：稍消瘦，锁骨上未及肿大淋巴结。食管吞钡X线检查示食管中下段4cm长之局限性管壁僵硬，粘膜部分中断，钡剂尚能通过。为明确诊断，应进行的检查是

- A. 血管造影
- B. 食管镜
- C. 核素扫描
- D. 食管拉网细胞学
- E. B超

答案：B

21. 患者男，40岁。行尿道膀胱肿瘤电切术后三天。护理措施不正确的是

- A. 心里护理
- B. 导尿管的护理
- C. 饮食指导
- D. 减少饮水量，避免刺激
- E. 加强基础护理

答案：D

22. 患者女，28岁。妊娠期糖尿病，宫内妊娠40周分娩。婴儿出生后容易发生

- A. 低血糖

- B. 低血压
- C. 体温低于正常
- D. 高血糖
- E. 体温高于正常

答案：A

57.不会诱发甲状腺危象的是（E）

- A.感染
- B.严重精神创伤
- C.准备不够充分的甲状腺次全切手术
- D.非甲状腺的大手术
- E.应用 $\beta$ -受体阻滞剂

58.迷走神经兴奋可引起（A）

- A.心率减慢
- B.兴奋传导加快
- C.心肌收缩力增强
- D.血压升高
- E.周围血管收缩

59.诊断有机磷农药中毒最重要的指标是（E）

- A.农药接触史
- B.阿托品试验阳性
- C.呕吐物有大蒜味
- D.毒蕈碱样和烟碱样症状
- E.全血胆碱酯酶活力降低

52.关于上尿路结石引起的疼痛，错误的是（A）

- A.疼痛一般与活动无关
- B.易活动的结石表现为肾绞痛
- C.较大的结石表现为钝痛
- D.当结石嵌顿时可引起剧烈的肾绞痛
- E.疼痛位于腰或上腹部，沿输尿管放射至同侧下腹及会阴

53.多器官功能障碍综合征最常累及的器官是（C）

- A.心
- B.脑
- C.肺
- D.肝
- E.肾

54.导致二尖瓣狭窄患者死亡的最常见原因是（C）

- A.呼吸道感染
- B.心律失常
- C.充血性心力衰竭
- D.感染性心内膜炎
- E.心脏骤停

55.慢性支气管炎自主神经功能紊乱的特点是（D）

- A.交感神经功能低下
- B.交感神经功能亢进



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

- 
- C.副交感神经功能低下
  - D.副交感神经功能亢进
  - E.迷走神经功能低下

10.钝性暴力造成的损伤一般为（D）

- A.穿透伤
- B.裂伤
- C.火器伤
- D.挫伤
- E.擦伤

13.腹外疝最重要的发病因素是（D）

- A.慢性咳嗽
- B.长期便秘
- C.排尿困难
- D.腹壁有薄弱点或缺损
- E.重体力劳动

14.婴幼儿时期最常见的肺炎类型是（A）

- A.支气管肺炎
- B.大叶性肺炎
- C.间质性肺炎
- D.小叶性肺炎
- E.节段性肺炎

15.确诊细菌性痢疾的最重要依据是（D）

- A.典型菌痢临床症状
- B.粪检有巨噬细胞
- C.粪便免疫学检查抗原阳性
- D.粪便镜检有大量脓细胞
- E.大便细菌培养阳性



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM