

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 护士在体温单上绘制肛温的符号为

A. ⊙(蓝色)

B. ·(蓝色)

C. ·(红色)

D. ×(蓝色)

E. ○(蓝色)

2. 房间隔缺损患儿易反复发生呼吸道感染的主要原因是

A. 体循环血量减少

B. 继发孔未闭

C. 肺循环血量增多

D. 原发孔未闭

E. 哭闹、活动过度

3. 肾衰竭少尿期发生的最严重的电解质紊乱是

A. 低钠血症

B. 高磷血症

C. 低钙血症

D. 高氯血症

E. 高钾血症

4. 将 15 cm 长的无菌镊子浸泡在器械消毒液中，液面应至少浸没镊子的长度约为

A. 3.5 cm

B. 4.5 cm

C. 5.5 cm



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

D.6.5 cm

E.7.5 cm

5.通过利尿作用达到降压效果的药物是

A.氢氯噻嗪

B.氯沙坦

C.硝苯地平

D.普萘洛尔

E.卡托普利

6.治疗外阴炎时，使用 1：5 000 高锰酸钾溶液坐浴的最主要作用是

A.杀菌

B.止痒

C.止痛

D.消肿

E.除臭



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

7.心电图如下图所示，应考虑为

A.窦性心律

B.窦性心动过缓

C.房性早搏

D.窦性心律不齐

E.室性早搏

8.关于硝普钠的主要药理作用，正确的叙述是

A.扩张动、静脉,以减轻心脏负荷

B.减慢心率

C.增加心输出量

D.增强心肌收缩力

E.利尿

9.使用静脉留置针输液完毕并使用肝素液封管,但第2日仍然发生血液反流堵塞导管,不是导致堵管的可能原因是

A.封管的肝素液量不够

B.封管的肝素液浓度过大

C.患者穿刺侧肢体活动过度

D.患者静脉压过高

E.推注封管液速度过快

10.脑死亡的诊断标准除外

A.不可逆的深度昏迷

B.自发呼吸停止

C.脑干反射消失

D.瞳孔散大而固定

E.脑电波消失

11.急性心肌梗死患者早期死亡的主要原因是

A.心源性休克

B.室性心律失常

C.急性心力衰竭

D.室间隔穿孔

E.心脏破裂

12.三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

C.胸骨上窝、剑突下和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨上窝、剑突下和肋间隙在呼气时明显下陷

E.胸骨上窝、腹部和肋间隙在呼气时明显下陷

13.给婴儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时，正确的做法是

A.用温热水送服

B.用热开水送服

C.冷开水送服或含服

D.热开水溶解后服用

E.服后半小时可饮用热牛奶

14.流感病程呈自限性,无并发症的患者一般治愈的时间是

A.1~2天

B.2~3天

C.3~6天

D.4~10天

E.5~10天

15.预防室性心律失常的最佳方法是

A.适宜的锻炼

B.保持情绪稳定

C.良好的饮食习惯

D.控制器质性心脏病病情

E.经常进行健康体检

16.对类风湿关节炎不正确的是

A.基本病变是滑膜炎

B.发病与自身免疫有关



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

C.有皮下结节示病情活动

D.类风湿因子为阳性

E.不引起脏器损害

17.地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是

A.扩张冠状动脉

B.增强心肌收缩力

C.减轻心脏前负荷

D.减少心律失常发生

E.降低心脏的传导性

18.临终患者心理反应的5个阶段，依次顺序为

A.否认期、忧郁期、协议期、愤怒期、接受期

B.否认期、协议期、愤怒期、接受期、忧郁期

C.否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期

D.忧郁期、愤怒期、否认期、协议期、接受期

E.协议期、否认期、愤怒期、忧郁期、接受期

19.女婴，4个月。足月儿，体检指标正常，此月龄最适合添加的辅食是

A.米粉

B.饼干

C.粥

D.烂面

E.土豆泥

20.酮症酸中毒最突出的临床表现是

A.呼吸减慢

B.面部潮红



C.口唇樱红

D.心率增快

E.呼吸中有烂苹果气味

21.给予某肝性脑病早期的患者口服乳果糖，其药理作用是

A.补充食物纤维

B.减少氨的形成和吸收

C.作为肝性脑病治疗的主要能量来源

D.纠正氨基酸代谢比例失调

E.抑制肠道细菌生长

22.下列药物过敏试验的皮试液浓度，正确的是

A.青霉素 500 U/0.1 mL

B.链霉素 2 500 U/0.1 mL

C.普鲁卡因 0.25 mg/0.1 mL

D.细胞色素 C 0.75 mg/0.1 mL

E.破伤风抗毒素 150 IU/0.1 mL

23.患者患高血压病 3 年，入院后给予降压药等治疗，在用药护理中指导患者改变体位时动作宜缓慢，其目的是

A.避免发生高血压脑病

B.避免发生高血压危象

C.避免发生急进型高血压

D.避免发生体位性低血压

E.避免血压增高

24.肾病综合征最根本的病理改变是

A.水肿



B.高血压

C.低蛋白血症

D.大量蛋白尿

E.高胆固醇血症

25.查阿米巴原虫，留取粪便标本的正确方法是

A.留新鲜粪便，立即送验，注意保温

B.取不同部位的粪便

C.取新鲜粪便最上部少许

D.清晨留便少许

E.留少许异常粪便

26.下列关于内痔的特点不正确的是

A.无痛性便血

B.可见痔块脱出

C.位于齿状线以上，表面覆盖肛管皮肤

D.位于齿状线以上，表面覆盖直肠黏膜

E.好发于直肠下端

27.与吸烟关系最密切的支气管肺癌是

A.未分化大细胞癌

B.未分化小细胞肺癌

C.鳞癌

D.腺癌

E.绒毛膜癌

28.癫痫发作是由于

A.脑代谢异常



B. 颅压增高

C. 脑水肿

D. 脑神经元异常放电

E. 脑萎缩

29. 小儿乳牙萌出的时间最常见为

A. 1~2 个月

B. 4~10 个月

C. 11~15 个月

D. 2~3 岁

E. 1~1.5 岁

30. 门静脉系与腔静脉系之间的交通支最主要的是

A. 胃底、食管下段交通支

B. 前腹壁交通支

C. 腹膜后交通支

D. 直肠下段肛管交通支

E. 肠系膜交通支

31. 护士在为新入院患者进行护理评估之后，其收集的资料中属于客观资料的是

A. 头痛

B. 恶心

C. 咽部充血

D. 感到头晕

E. 睡眠不佳、多梦

32. 低渗性与高渗性缺水最主要的区别是

A. 乏力





B.尿量

C.皮肤弹性差

D.发热

E.不口渴

33.急性白血病患者出血的主要原因是

A.反复感染

B.血小板质和量的异常

C.弥散性血管内凝血

D.白血病细胞浸润

E.感染毒素对血管的损伤

34.医疗文件的书写要求除外

A.描写生动形象

B.记录及时准确

C.内容简明扼要

D.医学术语确切

E.记录者签全名

35.颅底骨折常见于

A.直接暴力

B.间接暴力

C.积累性劳损

D.骨骼疾病

E.肿瘤转移

36.慢性肾功能衰竭患者饮食护理不妥的是

A.高热量



B.优质低蛋白

C.高钙

D.高磷

E.高维生素

37.股外侧肌注射适用于

A.多次注射

B.多种药物混合注射

C.刺激性强的药物注射

D.小剂量注射

E.大剂量注射

38.青春期女孩的第二性征表现不包括

A.出现阴毛

B.月经初潮

C.骨盆变宽

D.智齿萌出

E.脂肪丰满

39.糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的主要机制是

A.抑制过敏反应

B.抗休克，改善循环

C.控制炎症，抑制免疫反应

D.降低内毒素反应

E.抑菌避免继发感染

40.中药的“四性”是指

A.寒热温凉



- B.升降沉浮
- C.归经毒性
- D.辛甘苦咸
- E.温里散寒

41.患者,男性,76岁。进行性排尿困难5年,尿闭2小时,门诊以急性尿潴留、前列腺增生收入院。护士为其留置导尿,如下图所示,导尿管终点应保留的部位是

- A.①
- B.②
- C.③
- D.④
- E.⑤

42.患者,女性,48岁。因急性胃肠炎入院,护理观察发现患者每日排便次数至少5次,粪便呈水样,听诊肠鸣音亢进。对此情况的护理正确的陈述应是

- A.禁食24h
- B.给予口服止泻剂每日3次
- C.卧床休息3天
- D.2日后排便次数减少为1~2次/天
- E.了解急性胃肠炎发生的机制

43.患者,女性,52岁。因高热急诊入院,体温39.9℃。应采取的物理降温措施是

- A.嘱患者多饮冰水
- B.前额、头顶部置冰袋
- C.全身冷水擦浴
- D.心前区乙醇擦浴
- E.冰敷60分钟后测体温

44.患者,女性,69岁。急性心力衰竭,需要限制输液量和输液的速度,遵医嘱给予10%葡萄糖400 mL静脉滴注,20滴/分(滴系数为15),可维持多长时间

- A.3 h
- B.4 h
- C.5 h
- D.6 h
- E.8 h

45.患者,男性,33岁。转移性右下腹痛8 h。查体:体温38℃,血压正常,右下腹固定压痛,无腹肌紧张,临床诊断为急性阑尾炎。该患者的阑尾病变属于


- A.急性单纯性阑尾炎
- B.急性化脓性阑尾炎
- C.坏疽性阑尾炎
- D.阑尾周围脓肿
- E.慢性阑尾炎

46.患者,男性,29岁。与朋友聚餐,摄入大量海鲜。夜间突发剧烈刀割样腹痛,向腰背部放射。导致本患者腹痛最可能的诱因是

- A.胆道疾病
- B.饱餐
- C.应用糖皮质激素
- D.胰管阻塞
- E.气候变化

47.患者,女性,30岁。近日单位组织体检,肝功检查发现HBsAg(+),其余指标均为阴性。说明此患者

- A.无传染性
- B.具有免疫力
- C.体内有乙型肝炎病毒侵入



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

D.乙型肝炎恢复期

E.有保护性抗体

48.患者，女性，32岁。已婚，阴道分泌物增多伴外阴瘙痒1周，妇科检查分泌物呈豆渣样，阴道黏膜有白色膜状物，轻轻擦去后可见糜烂及浅表溃疡。该患者首选的辅助检查是

A.所有患者都应做分泌物细菌培养

B.取分泌物前可以先做双合诊检查

C.取分泌物前应先用0.2%的碘伏消毒会阴部

D.取分泌物进行革兰染色

E.进行氨臭味试验

49.责任护士给一患者讲解功能失调性子宫出血的概念，第二天评价患者对疾病的认识程度，患者陈述不正确的是

A.调节生殖的内分泌机制失调

B.任何年龄都会发病

C.主要是内生殖器官有器质性病变

D.全身无器质性病变

E.分无排卵性和有排卵性两类

50.患儿，8岁。高热寒战5h，右下肢活动受限。右胫骨近端剧痛，且有深压痛。血白细胞计数 $21 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%。X线片未见异常。4日前有右膝部碰伤史。可能是

A.右膝化脓性关节炎

B.急性蜂窝织炎

C.急性血源性骨髓炎

D.膝关节结核

E.创伤性关节炎

51.患者，女性，35岁。近1年来右侧乳房经常出现胀痛，于月经前疼痛加重，月经来潮后减轻。体检：右侧乳房可扪及多个大小不一的结节状和片状肿块，质韧而不硬，与周围乳腺组织分界不明显，并随月经周期而变化。首先考虑的疾病是



- A.乳腺癌
- B.乳房纤维腺瘤
- C.急性乳房炎
- D.乳管内乳头状瘤
- E.乳腺囊性增生病

52.患者，男性，45岁。有溃疡史10年，近1个月来腹痛节律性消失，消瘦，大便隐血试验持续阳性，可考虑为


- A.溃疡活动
- B.幽门梗阻
- C.慢性穿孔
- D.溃疡癌变
- E.上消化道出血

53.患者，男性，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑

- A.氢氧化铝凝胶
- B.口服补液盐
- C.奥美拉唑
- D.枸橼酸铋钾
- E.克拉霉素

54.滴虫阴道炎的治疗措施，错误的是

- A.无症状带虫者应予治疗
- B.哺乳期者用药6小时内可哺乳
- C.用酸性溶液阴道冲洗效果好
- D.未婚者可口服甲硝唑
- E.性伴侣同时治疗



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

55.最易并发阻塞性肺气肿的疾病是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.慢性肺脓肿
- D.支气管扩张
- E.肺结核

56.在中医五行归类中，人体五官是

- A.筋、脉、肉、皮毛、骨
- B.筋、脉、肉、气血、髓
- C.目、舌、鼻、唇、耳
- D.口、舌、鼻、唇、喉
- E.目、舌、鼻、口、耳

57.人体正常情况下，胰液进入十二指肠，在肠激酶的作用下首先激活的是

- A.糜蛋白酶原
- B.胰蛋白酶原
- C.前磷脂酶
- D.前弹力蛋白酶
- E.激肽释放酶原

58.再生障碍性贫血产生的主要原因是

- A.造血原料缺乏
- B.红细胞破损过多
- C.红细胞丢失过多
- D.骨髓造血功能低下
- E.幼红细胞代偿性增生



59.患者，女性,43岁。因子宫肌瘤行子宫全切术,术后第2天可将患者安置为

- A.截石位
- B.头高足低位
- C.去枕仰卧位
- D.头低足高位
- E.半坐卧位

60.患者，男性，47岁。上消化道出血，重度营养不良，拟为其进行中心静脉穿刺补充营养，穿刺过程中不符合原则的是

- A.中心静脉穿刺包须有标记和有效期(或失效期)
- B.穿刺过程中手臂位于腰部水平以上
- C.无菌物品与非无菌物品分别放置
- D.导管穿刺前用无菌生理盐水冲洗
- E.穿刺包中多余的无菌物品可以为其他患者使用

61.患者，男性,48岁。车祸后下身瘫痪，白天依靠轮椅生活。对于该患者压疮的好发部位是

- A.肘部
- B.髌部
- C.足趾
- D.足跟
- E.坐骨结节

62.患者，女性，26岁。患血友病。护士发现该患者排出尿液呈现浓茶色，以下原因最可能的是

- A.青霉素过敏反应
- B.溶血反应
- C.肺水肿
- D.空气栓塞



E.尿路感染

63.患者，男性，55岁。患慢性支气管炎，近3天咳嗽、咳痰，痰液黏稠不易咳出，为帮助祛痰，给予超声雾化，当超声雾化吸入器的水温超过多少时护士需要调换

A.30℃

B.40℃

C.50℃

D.60℃

E.70℃

64.患者，男性，65岁。心电图显示P波消失，代之以大小及间距不等的小锯齿状波，QRS波形态基本正常但节律不规则，考虑为

A.室性期前收缩

B.心房扑动

C.室性心动过速

D.心室扑动

E.心房纤颤

65.患者，男性，23岁。患支气管扩张症，间断咯血。近日来因受凉咳大量黄色脓痰，收入院治疗。根据病情患者目前最主要的护理诊断是

A.气体交换受损

B.低效性呼吸型态

C.清理呼吸道无效

D.营养失调：低于机体需要量

E.潜在并发症：窒息

66.患者，男性，60岁。股骨骨折患者，护士协助其从平车向床上移动时的顺序为

A.下肢、臀部、上身

B.上身、下肢、臀部



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

C.上身、臀部、下肢

D.臀部、下肢、上身

E.臀部、上身、下肢

67.患者，男性，38岁。因甲型肝炎入院，护士为其进行入院指导。应告诉患者以下属于半污染区的是

A.病室

B.厕所

C.浴室

D.走廊

E.库房

68.患者，男性，31岁。背部及大腿后侧烧伤，为促进伤口愈合采取俯卧位，该患者压疮的好发部位是

A.肘部

B.髌部

C.足趾

D.足跟

E.坐骨结节

69.患者，女性，36岁。产后高热，欲行乙醇擦浴降温，护士长提醒操作护士禁擦足底是为了防止

A.发生寒战

B.呼吸不畅

C.引起一过性冠状动脉收缩

D.体温骤降

E.血压下降

70.患者，男性，56岁。尿潴留膀胱高度膨胀，护士长要求护士对其导尿时第一次放尿不应超过1000 mL，下列原因不正确的是



- A.防血尿
- B.防虚脱
- C.防腹压急剧下降
- D.防导尿管脱出
- E.防膀胱黏膜急剧充血

71.患者,女性,44岁。静脉输液治疗中。护士在巡视过程中发现溶液不滴,局部无肿胀不适,挤压近针头端输液管感觉有阻力且无回血,正确的处理方法是

- A.抬高输液瓶位置
- B.更换针头重新穿刺
- C.调整针头位置
- D.用力挤压输液管直至液体通畅
- E.热敷注射部位上端血管

72.患者,男性,76岁。脑卒中后卧床不起,患者无力咳痰且痰液黏稠,下列护理措施错误的是

- A.叩拍胸背部
- B.使用超声雾化吸入
- C.滴入生理盐水
- D.滴入化痰药物
- E.增加吸引器负压

73.患者,男性,68岁。因胸闷不适,去医院急诊。EKG示:ST段压低,若给患者鼻导管用氧,氧流量为4 L/min,其吸入的氧气浓度是

- A.21%
- B.25%
- C.29%
- D.33%
- E.37%

74. 患儿，6岁。易患支气管炎，平时不愿活动，查体发现心脏杂音，以下哪项 X 线检查结果有助于房间隔缺损的诊断

- A. 右心房、右心室增大
- B. 左心房、左心室、右心室增大
- C. 左心房、左心室增大
- D. 右心室增大，肺动脉段凹陷
- E. “靴形”心

75. 患者，男性，25岁。诊断为化脓性阑尾炎。患者出现腹肌紧张，说明炎症刺激了

- A. 阑尾肌层
- B. 阑尾腔黏膜
- C. 脏层腹膜
- D. 壁层腹膜
- E. 盲肠

76. 产妇，25岁。产后第2天，责任护士每天均需观察宫缩情况，产后子宫复旧最主要的观察项目是每天了解

- A. 褥汗和口渴的程度
- B. 宫底下降及恶露气味
- C. 双侧乳房泌乳的状态
- D. 母子的亲情关系
- E. 婴儿吸吮的能力

77. 患者，男性，48岁。脑外伤，在全麻下行颅内探查术，术后的床单位应是

- A. 麻醉床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
- B. 暂空床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
- C. 暂空床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单
- D. 麻醉床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM


E.备用床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

78.患儿，女性，8岁。护士接该患儿至手术室，其平车放置的适宜位置是

- A.平车与床平行
- B.平车头端与床尾呈钝角
- C.平车头端与床头呈钝角
- D.平车尾端与床尾呈钝角
- E.平车头端与床尾呈锐角

79.患儿，女,2个月。患鹅口疮。护士为其清洗时，可选用哪种漱口水

- A.生理盐水
- B.0.02%呋喃西林溶液
- C.3%过氧化氢溶液
- D.2%碳酸氢钠溶液
- E.朵贝尔溶液



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

80.患者，女性,40岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄10年。近1个月常于夜间憋醒，呼吸深快，伴有哮鸣音，端坐后可稍缓解，对夜间易发生喘憋的机制，正确的叙述是

- A.交感神经张力增加
- B.膈肌抬高或下降
- C.平卧回心血量增加
- D.小支气管舒张
- E.全身小动脉痉挛

81.某病毒性心肌炎患者出院时，护士对其限制重体力活动，预防病毒的重复感染，其目的是限制哪种疾病的发生

- A.扩张型心肌病
- B.二尖瓣脱垂
- C.肥厚型心肌病

D.风湿性心脏瓣膜病

E.限制型心肌病

82.患儿，女，6岁。诊断为法洛四联症，患儿缺氧发作时，使用心得安进行治疗的目的是

A.减慢心率

B.抑制呼吸中枢

C.纠正代谢性酸中毒

D.控制惊厥

E.减轻水钠潴留

83.患者，男性,28岁。8年来站立或腹压增高时反复出现右腹股沟肿物，平卧安静时肿块明显缩小或消失。10小时前因提重物而肿块又出现，伴腹痛、呕吐，肛门停止排气和排便。体检示右阴囊红肿，可见一梨状肿块，平卧后肿块不消失。最有可能的诊断是

A.嵌顿性腹股沟斜疝

B.嵌顿性腹股沟直疝

C.绞窄性股疝

D.睾丸鞘膜积液

E.睾丸扭转

84.患者,女性，36岁。工作紧张，近2年来未避孕，欲生育，但一直未孕。月经不规则，经期延长，因月经淋漓不净，经量过多就诊，该患者的最主要诊断是

A.原发性不孕症

B.继发性不孕症


C.功能失调性子宫出血

D.陈旧性宫外孕

E.宫外孕

85.根据小儿身长公式推算，5岁小儿身长约为

A.100 cm



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

B.105 cm

C.110 cm

D.115 cm

E.120 cm

86.患者,男性,45岁。近3个月来排便次数增多,每天3~4次,黏液脓血便,有里急后重感,首选的有助于确诊的检查方法是

A.B超

B.X线钡剂灌肠

C.直肠指检

D.纤维结肠镜

E.血清癌胚抗原

87.患者,男性,65岁。其腹部伤口换药时发现脓液稠厚,坏死组织较多,应选择外敷的是

A.0.9%生理盐水

B.凡士林纱布

C.3%~5%氯化钠

D.30%硫酸镁

E.硼酸溶液

88.患者,男性,32岁。因肾盂结石行体外冲击波碎石,为预防结石复发,医生根据尿液中排出碎石进行结石成分分析。需要碱化尿液的结石类型是

A.磷酸盐结石

B.草酸钙结石

C.黄嘌呤结石

D.尿酸结石

E.碳酸钙结石

89.患者，男性，60岁。原发性高血压10年，长期服用排钾利尿剂控制血压，现因低血钾收入院。护士在患者右手背进行静脉穿刺滴入含钾溶液，4小时后遵医嘱抽血复查血钾。不宜选择的采血部位是

- A.左股静脉
- B.右股静脉
- C.左手背静脉
- D.左肘正中静脉
- E.右肘正中静脉

90.患者，女性，76岁。老年痴呆症，长期卧床，护士发现其尾骶部出现一处压疮，呈炎性浸润期表现，其特点是


- A.局部皮肤出现红肿热触痛
- B.皮下产生硬结
- C.皮肤表面无变化
- D.浅层组织感染
- E.局部组织坏死

91.患者，男性，46岁。因胃部手术，插有胃管一根，护士在为其进行鼻饲的操作过程中，下列哪项不妥

- A.每次鼻饲量不超过200 mL
- B.应检查胃管是否通畅
- C.检查胃管是否在胃内，可注入少量温开水
- D.如灌入药物，先将药片研碎溶解
- E.拔管时将管末端夹紧拔到咽喉处宜快速

92.患者，男性，56岁。胰腺癌致胆道完全阻塞。临床可见患者的粪便呈

- A.陶土色
- B.柏油样
- C.黄褐色



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM



D.暗红色

E.果酱样

93.患者，男性，56岁。诊断为肾病综合征，遵医嘱测定尿蛋白定量，留取24h尿标本，应加入下列哪种防腐剂

A.甲醛

B.甲苯

C.浓盐酸

D.稀盐酸

E.硫酸

94.患者，男性，34岁。上腹部不适，厌食，消瘦3年，诊断为慢性胃炎。现患者有严重的贫血。其主要原因是

A.严重消化道症状

B.长期消化道出血

C.营养素摄入过少

D.血中存在抗内因子抗体

E.胃酸分泌减少

95.足月新生儿，出生后24小时出现黄疸，且进行性加重，测血清胆红素为 $273\mu\text{mol/L}$ ，拟诊为新生儿溶血病。该患儿和母亲的血型可能为下列哪项

A.母A型，儿B型

B.母O型，儿O型


C.母O型，儿B型

D.母AB型，儿AB型

E.母B型，儿O型

96.患者，女性，28岁。因发热伴尿频、尿急、尿痛5日就诊，为明确诊断应首先检查

A.血常规



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

- B.膀胱镜
- C.肾脏 B 超
- D.阴道涂片检查
- E.尿细菌培养

97.患者,女性,26岁。因车祸致腹部闭合性损伤入院,左中下腹持续性剧烈疼痛伴腰背部酸痛。患者出现烦躁不安,诉口渴,血压下降,具体诊断尚未确定,医嘱 X 线腹平片。适宜的护理措施是

- A.强痛定止痛
- B.哌替啶止痛
- C.给水止渴
- D.搀扶患者去放射科做检查
- E.确诊前禁食

98.患儿,9岁。发热、右小腿下段疼痛3天余,临床疑为右腓骨下端骨髓炎,其常见的致病菌是

- A.溶血性链球菌
- B.大肠埃希菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.变形杆菌
- E.厌氧菌

99.产妇,因中度妊娠高血压收入产科,经解痉、降压、镇静处理后分娩一活女婴。产后24小时阴道流血600 mL,其阴道大出血的原因是

- A.应用解痉药后血管扩张
- B.中度妊高征消耗凝血因子
- C.第四产程未严密观察
- D.应用镇静剂后的宫缩乏力
- E.产前用药使凝血功能下降

100.患者，男性，36岁。因外伤被诊断为小脑幕切迹疝，该患者瞳孔一侧先缩小，再进行性散大，是损伤了

- A.听神经
- B.动眼神经
- C.视神经
- D.舌神经
- E.迷走神经

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题，请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101~102题共用题干)

患者，女性，51岁。不规则阴道流血、流液半年。检查发现宫颈有菜渣样组织，宫体正常大小，活动差，拟诊为宫颈癌。

101.为确诊需做的检查是

- A.宫颈刮片检查
- B.阴道镜检查
- C.分段诊断性刮宫
- D.宫颈活体组织检查
- E.碘试验

102.其阴道排液的特征为

- A.呈白色米泔水样
- B.多发生在阴道出血前
- C.黏液性的分泌物
- D.分泌物呈黄绿色
- E.晚期排液量减少

(103~104题共用题干)



患者，男性，69岁。因头痛、头晕、右半身麻木无力2个月，呕吐2日入院。体检：神清，血压正常，眼底视盘模糊不清，视乳头水肿。右面部感觉减退，右侧肢体不全瘫，右侧病理反射阳性。头部CT检查发现有颅内占位性病变。

103.应首先考虑的诊断为

- A.慢性硬脑膜下血肿
- B.脑出血
- C.颅内肿瘤
- D.脑脓肿
- E.急性硬脑膜下血肿

104.此时最有效的处理措施是

- A.持续腰穿引流
- B.使用脱水药
- C.开颅病灶切除
- D.过度换气
- E.去骨片减压术

(105~106题共用题干)


患者，男性，52岁。在食管癌普查中，发现他有食管癌可疑。

105.食管癌的早期症状是

- A.进行性吞咽困难
- B.声音嘶哑
- C.呕吐泡沫样黏液
- D.持续性胸背痛
- E.食管内异物感或胸骨后刺痛

106.在普查中可疑的患者，首选的检查方法是

- A.钡餐X线造影



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

B.纤维光束食管镜

C.B超

D.胸部平片

E.带网气道食管脱落细胞检查

(107~108 题共用题干)

患者，男性，30岁。在生产有机磷农药工作中出现恶心、呕吐、多汗、流涎、瞳孔缩小、呼吸困难、肺水肿、惊厥等症状。全血胆碱酯酶活力降至30%以下，在治疗时使用阿托品静脉给药。

107.以下哪项不是阿托品中毒的表现

A.瞳孔扩大

B.瞳孔缩小

C.烦躁不安

D.意识模糊

E.谵妄

108.当出现阿托品中毒时可选用的拮抗药物是

A.氯解磷定

B.碘解磷定

C.双复磷

D.碳酸氢钠

E.毛果芸香碱

(109~110 题共用题干)

患者，男性，32岁。10小时前与人发生口角，大腿根部被水果刀刺伤，随即入院。询问病史言语错乱，烦躁不安，脉搏120次/分，血压90/60 mmHg。

109.配合医生，采取恰当的治疗，不正确的是

A.肥皂水清洗伤口周围

B.3%过氧化氢与生理盐水反复冲洗伤口



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- C.清除坏死组织
- D.超过最佳缝合时机，暴露伤口等待二期缝合
- E.整个过程严格无菌操作

110.术后换药时，发现创面脓液量多而稀薄，应在创面湿敷

- A.0.1%依沙吖啶溶液纱布
- B.硼酸溶液纱布
- C.3%氧化钠溶液纱布
- D.等渗盐水纱布
- E.70%乙醇溶液纱布

(111~112 题共用题干)

36岁经产妇，妊娠39周。因阴道分娩后子宫收缩乏力导致阴道流血不止。给予子宫按摩及使用宫缩剂，止血效果差，阴道流血量达1000 mL。产妇贫血貌，四肢湿冷，心率130次/分，呼吸35次/分，血压80/50 mmHg。遵医嘱行宫腔填塞无菌纱布条。

111.无菌纱布条留置宫腔的时间是

- A.8小时
- B.12小时
- C.16小时
- D.24小时
- E.72小时

112.宫腔填塞无菌纱布条后应警惕的是

- A.宫底高度下降
- B.宫腔内继续出血，但阴道未见出血的止血假象
- C.子宫缩小
- D.纱布条脱出
- E.感染

(113~114 题共用题干)

患者，男性，65岁。因右下肢股骨颈骨折入院，给予患者持续牵引复位，患者情绪紧张，主诉疼痛难忍。

113. 评估患者后，护士应先解决的护理问题是

- A. 焦虑
- B. 生活自理缺陷
- C. 疼痛
- D. 躯体移动障碍
- E. 有皮肤完整性受损的可能

114. 骨科卧床患者一般护理诊断的问题应除外

- A. 营养失调: 高于机体需要量
- B. 躯体移动障碍
- C. 排便异常: 便秘
- D. 有感染的危险
- E. 有失用综合征的危险



(115~116 题共用题干)

患者，男性。咳嗽、咳痰 20 年，近 1 年来出现气促，活动后心悸、呼吸困难、乏力，有不同程度发绀，听诊可闻及干、湿性啰音，肺动脉瓣第二心音亢进，诊断为肺源性心脏病代偿期。

115. 导致该患者发病的主要原因可能是

- A. 慢性肺血栓栓塞症
- B. 支气管扩张
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 慢性阻塞性肺疾病

116. 该患者发病过程中的关键病变是

- A.肺动脉炎症
- B.肺泡壁破坏
- C.肺气肿
- D.肺动脉高压
- E.肺血管痉挛

(117~118 题共用题干)

患者，女性，66岁。卵巢癌术后，拔出尿管后7小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。

117.为患者实施导尿时，第2次消毒的顺序是

- A.自上而下，由内向外再向内
- B.自下而上，由外向内
- C.自下而上，由内向外
- D.自上而下，由内向外
- E.自上而下，由外向内

118.首次导出尿液不应超过


- A.500 mL
- B.800 mL
- C.1 000 mL
- D.1 500 mL
- E.2 000 mL

(119~120 题共用题干)

患者，女性，45岁。1周来体温持续39~40℃，护理查体：面色潮红，呼吸急促，口唇轻度发绀，意识清楚。

119.为明确诊断，需查心肌酶、血沉及血培养。应选用的血沉标本容器是

- A.血培养瓶



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM



- B. 无菌试管
- C. 干燥试管
- D. 抗凝试管
- E. 石蜡油试管

120. 采集上述血标本后，注入容器的先后顺序是

- A. 血培养瓶、抗凝试管、干燥试管
- B. 干燥试管、血培养瓶、抗凝试管
- C. 干燥拭管、抗凝试管、血培养瓶
- D. 血培养瓶、干燥试管、抗凝试管
- E. 抗凝试管、干燥试管、血培养瓶



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM