

相关专业知识

题型：A1 型选择题

题目：

1.横断面研究可以

选项：

- A.了解疾病的患病情况
- B.证实病因
- C.分析病因
- D.排除危险因子
- E.动态观察疾病的演变情况

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

有关妊娠期妇女口腔保健的描述中，正确的是

选项：

- A.孕妇营养缺乏可导致婴儿牙发育不可逆的改变
- B.妊娠期龈炎主要由孕妇偏好甜食引起
- C.妊娠期前3个月是治疗口腔疾病的适宜时期
- D.婴儿口腔护理及喂养知识的健康教育应在妇女分娩后进行
- E.孕妇可在医生指导下服用苯二氮卓类镇静安眠药

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

窝沟封闭成功的关键是

选项：

- A.酸蚀时间长
- B.酸蚀面积大
- C.光固化时间适宜
- D.涂布封闭剂气泡
- E.酸蚀后不被唾液污染

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

无致龋性的甜味剂是

选项：

- A.蔗糖
- B.果糖

- C.半乳糖
- D.双糖
- E.甜菊糖

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

5.戊二醛—酚溶液使用的稀释度是

选项：

- A.1 : 32
- B.1 : 16
- C.1 : 8
- D.1 : 4
- E.1 : 2

答案： A

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

洗必泰是一种

选项：

- A.一价的阳离子表面活性剂
- B.二价的阳离子表面活性剂
- C.一价的阴离子表面活性剂
- D.二价的阴离子表面活性剂
- E.中性离子表面活性剂

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

牙周病一级预防的确切内容是

选项：

- A.义齿修复，防止功能丧失
- B.早发现、早治疗，减少牙周病的严重程度
- C.以药物与牙周手术治愈牙周病损
- D.控制牙菌斑，减轻牙龈出血
- E.健康教育、定期保健、保持牙周健康

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

急性根尖周炎疼痛缓解时的病理特点是脓肿

选项:

- A.位于牙槽窝内
- B.达黏膜下
- C.达骨膜下
- D.位于牙槽窝和牙槽骨
- E.位于牙周膜内

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

急性根尖周脓肿时, 医生建立最佳的引流通道是

选项:

- A.根尖孔—根管—龋洞
- B.根尖部—牙周袋
- C.根尖部—牙槽骨—黏膜下
- D.根尖部—牙槽骨—皮肤下
- E.根尖部—牙周间隙—龈袋

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

临床上乳牙根管治疗术常用药物是

选项:

- A.氧化锌丁香油糊剂
- B.聚羧酸水门汀
- C.磷酸水门汀
- D.樟脑酚
- E.甲醛甲酚

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

青少年根尖周炎最好选用哪种治疗方法

选项:

- A.干髓术
- B.根管治疗
- C.塑化治疗
- D.空管治疗
- E.安抚治疗

答案: D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

临床上年轻恒牙异常松动的原因多为

选项：

- A.牙根未发育完全
- B.根尖周病
- C.牙髓炎
- D.牙龈炎
- E.外伤

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

恒牙根尖发育完成的时间是

选项：

- A.萌出时
- B.萌出后半年
- C.萌出后 1~2 年
- D.萌出后 3~5 年
- E.萌出后 6~8 个月

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

前磨牙楔状缺损应选用的最佳充填材料是

选项：

- A.树脂改良的玻璃离子粘固粉
- B.化学固化复合树脂
- C.磷酸锌粘固粉
- D.银汞合金
- E.聚羧酸锌粘固粉

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

嵌入性牙脱位多见于

选项：

- A.错位牙
- B.松动牙

- C.牙周病患牙
- D.乳牙和年轻恒牙
- E.牙冠较短的恒牙

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

牙隐裂好发于

选项：

- A.下颌第一磨牙
- B.上颌第一磨牙
- C.下颌第二磨牙
- D.上颌第二磨牙
- E.上颌前磨牙

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

在临床上，发生楔状缺损的常见频率顺序是

选项：

- A.中切牙、侧切牙、尖牙、双尖牙、磨牙
- B.双尖牙、尖牙、磨牙、侧切牙、中切牙
- C.尖牙、中切牙、侧切牙、双尖牙、磨牙
- D.尖牙、双尖牙、磨牙、中切牙、侧切牙
- E.侧切牙、中切牙、尖牙、双尖牙、磨牙

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

急性牙髓炎患牙疼痛部位的特点是

选项：

- A.患者能指出患牙部位
- B.下颌疼痛患牙为下牙
- C.上颌疼痛患牙为上牙
- D.患牙疼痛多无放散性
- E.上颌疼痛患牙可为下牙

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

逆行性牙髓炎不同于其他牙髓炎的临床表现特点是

选项:

- A.冷测缓解疼痛
- B.有阵发性自发病
- C.热测引起迟缓痛
- D.深及根尖的牙周袋
- E.Ⅲ度松动,叩痛(++)

答案: D

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

各型牙内陷中最严重的是

选项:

- A.畸形根面沟
- B.畸形舌侧窝
- C.畸形舌侧尖
- D.牙中牙
- E.釉珠

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

根尖 1/3 处折断的患牙处理为

选项:

- A.固定并定期观察
- B.牙髓状况良好,可调,观察
- C.不治疗
- D.牙髓治疗
- E.定期观察

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

22.头影测量 Y 轴角小说明

选项:

- A.上颌后缩
- B.上颌前突
- C.下颌前突
- D.下颌后缩
- E.双颌前突

答案: C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

面中部发育不良易导致哪种错畸形

选项：

- A.安氏Ⅱ类1分类错
- B.安氏Ⅱ类2分类错
- C.安氏Ⅲ类错
- D.安氏Ⅰ类错
- E.以上都不对

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

先天缺牙的最常见病因是

选项：

- A.遗传因素
- B.内分泌功能障碍
- C.间隙不足
- D.钙磷代谢异常
- E.以上都不对

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

可以使不锈钢正畸弓丝变硬的方法是

选项：

- A.退火
- B.冷加工硬化
- C.老化变硬
- D.沉积变硬
- E.以上均不可以

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下列各项测量属于人体测量法的是

选项：

- A.利用分规、尺等工具度量面部宽度
- B.在组织切片上观察胚胎颅面部的生长发育特点

- C.在 X 线头影侧位片上测量上颌骨的大小和位置
- D.利用放射性核素作为体内标记物,再用放射线自显影方式显微照相分析骨的生长发育情况
- E.将金属钉植入颌骨内,然后结合系列 X 线头颅定位片来研究颌骨生长量和方向

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

有关颅部的生长发育, 以下描述错误的是

选项:

- A.颅骨的生长发育始于结缔组织性质的膜性颅
- B.头部开始形成的时间大约是胚胎第 3 周
- C.颅部由含脑的颅脑和含面的颅面所组成
- D.胚胎第 8 周时, 颅底软骨开始骨化
- E.颅基底软骨生长发育, 以满足脑量扩大的需要

答案: D

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

涎腺造影检查的禁忌证为

选项:

- A.急性化脓性腮腺炎
- B.外伤性涎瘘
- C.阴性涎石症
- D.腮腺恶性肿瘤
- E.腮腺慢性反复肿胀

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

腮腺区肿块如要做穿刺检查, 可能会损伤其他的结构, 其中最不可能损伤的是

选项:

- A.颞浅动静脉
- B.下颌后静脉
- C.面神经颊支
- D.舌下神经
- E.耳颞神经

答案: D

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

干槽症出现在拔牙术后几天

选项:

- A.3~5天
- B.3~6天
- C.3~4天
- D.3~7天
- E.1~4天

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

上颌骨骨折首选

选项:

- A.华特位片
- B.CT
- C.核磁
- D.平片
- E.造影

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

普鲁卡因不适合

选项:

- A.表面麻醉
- B.阻滞麻醉
- C.局部麻醉
- D.静脉麻醉
- E.椎管麻醉

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

哪个乳牙过早缺失影响最大

选项:

- A.第二乳磨牙
- B.乳尖牙
- C.第一乳磨牙
- D.第三乳磨牙
- E.乳切牙

答案: A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

不能使用旋转力拔除的牙是

选项：

- A.下切牙
- B.上中切牙
- C.下前磨牙
- D.下尖牙
- E.上尖牙

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

治疗三叉神经痛首选

选项：

- A.卡马西平
- B.苯妥英钠
- C.布洛芬
- D.氯丙嗪
- E.阿托品

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

口腔颌面颈部大手术后引流常用

选项：

- A.片状引流
- B.纱条引流
- C.管状引流
- D.正压引流
- E.负压引流

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

皮样囊肿好发于

选项：

- A.眼睑
- B.额

- C.鼻
- D.耳下
- E.口底颈部

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

中央有一小色素点是

选项：

- A.腺样囊肿
- B.黑痣
- C.表皮样囊肿
- D.皮样囊肿
- E.皮脂腺囊肿

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

毒性最强的局麻药是

选项：

- A.普鲁卡因
- B.卡波卡因
- C.利多卡因
- D.丁卡因
- E.布比卡因

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

布比卡因麻醉时间可达

选项：

- A.1 h
- B.2 h
- C.4 h
- D.5 h
- E.6 h

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

肾上腺素可引起的不适中，不包括

选项：

- A.心悸
- B.恐惧
- C.颤抖
- D.头痛
- E.麻木

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

上颌尖牙腭侧有下列神经吻合

选项：

- A.上牙槽前神经与上牙槽中神经
- B.鼻腭神经与腭中神经
- C.腭前神经与腭中神经
- D.腭中神经与腭后神经
- E.腭前神经与鼻腭神经

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

髁状突骨折患者应重视张口训练，其原因是

选项：

- A.防止关节内纤维增生，避免以后发生颞下颌关节强直
- B.使髁状突保持在功能位，促进髁状突复位
- C.使髁状突处于功能状态，促进骨折早期愈合
- D.张口时髁状突与下骨折段之间的距离增加，避免下颌支向上方移位引起颌骨畸形
- E.张口时髁状突所受应力较小，使骨折免受不良应力干扰

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

单侧下颌颏孔部垂直骨折，后段骨折片常向前上方移位并稍偏健侧是由于

选项：

- A.前段骨折片所附升颌肌群牵引
- B.后段骨折片所附升颌肌群牵引
- C.前段骨折片所附降颌肌群牵引
- D.后段骨折片所附降颌肌群牵引
- E.后段骨折片所附翼外肌牵引

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

髁状突颈部骨折后髁状突常被拉向前内方是由于患侧

选项：

- A. 颞肌的作用
- B. 咬肌的作用
- C. 翼内肌的作用
- D. 翼外肌的作用
- E. 关节韧带的作用

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下颌骨体部骨折固定的时间为

选项：

- A. 3 周
- B. 4 周
- C. 2 个月
- D. 3 个月
- E. 半年

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

描述上颌骨血供特点及临床意义哪项是错误的

选项：

- A. 血运较下颌骨丰富
- B. 抗感染能力强
- C. 骨折愈合较下颌骨迅速
- D. 具有单源性血供特点
- E. 外伤后出血较多

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

最易并发颅脑损伤的颌骨骨折是

选项：

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折

- C. LeFort III 型骨折
- D. 髁状突骨折
- E. 下颌骨正中骨折

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

49.A.应用抗生素

选项：

- B.局部保持清洁
- C.进行鼻腔冲洗，协助引流
- D.观察脑脊液量及色泽
- E.脑脊液停止一定时间后处理颅骨骨折

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤，离体组织尚完好，应尽量将离体组织缝回原处，但一般不宜超过

选项：

- A.1 h
- B.2 h
- C.4 h
- D.6 h
- E.8 h

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

①髁突；②颞孔；③正中联合部；④下颌角；⑤下颌升支。下颌骨骨折多发的位置是

选项：

- A.①③④
- B.①②③
- C.③④
- D.①②③④
- E.①②③④⑤

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

牙槽突骨折牙弓夹板和正畸托槽应跨过骨折线的牙位数至少为

选项:

- A.1 个
- B.2 个
- C.3 个
- D.4 个
- E.5 个

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

关于接触式桥体的描述错误的是

选项:

- A.自洁作用好
- B.美观
- C.有利于发音
- D.对牙槽嵴黏膜有生理性按摩作用
- E.可加速牙槽骨的吸收

答案: E

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

影响冠修复体粘着力大小的因素不包括

选项:

- A.粘着力与粘固剂的厚度成正比
- B.粘着力与粘着面积成正比
- C.粘固剂过稀影响粘着力
- D.粘固剂过稠影响粘着力
- E.粘着面上有水分影响粘着力

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

设计修复体龈缘的位置时不必考虑

选项:

- A.患牙的形态
- B.修复体的固位
- C.患牙的牙周状况
- D.患者的口腔卫生状况
- E.咬合力的大小

答案: E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

牙体修复预备过程中适当的预防性扩展的主要目的是

选项：

- A.自洁和防止继发龋
- B.提供良好的固位形和抗力形
- C.去除龋坏牙体组织
- D.增进修复体的美学效果
- E.促进牙周组织的健康

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

以下哪项不是固定义齿的优点

选项：

- A.固位作用好
- B.咀嚼效能高
- C.磨切牙体组织少
- D.近似真牙
- E.异物感小

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为

选项：

- A.0.3~0.4 mm
- B.0.5~0.8 mm
- C.0.9~1.0 mm
- D.1.1~1.2 mm
- E.1.3~1.5 mm

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

金属烤瓷冠的制作，错误的说法是

选项：

- A.全冠舌侧颈缘全用金属
- B.金瓷结合处应避免咬合功能区

- C.金瓷结合处呈斜面搭接
- D.瓷覆盖区底层冠厚度至少 0.5 mm
- E.瓷覆盖区瓷层空间不超过 2 mm

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

对烤瓷合金的性能要求， 不正确的是

选项：

- A.弹性模量低
- B.机械强度高
- C.铸造性能好
- D.收缩变形小
- E.湿润性好

答案： A

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

不能消除可摘局部义齿翘动的是

选项：

- A.增加间接固位体
- B.增大平衡距
- C.增大游离距
- D.增加基托面积
- E.骨突处基托组织面缓冲

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

下列关于整体铸造支架式义齿的评价中错误的是

选项：

- A.坚固耐用， 不易折裂
- B.体积明显减小， 戴用舒适
- C.温度传导差
- D.修理与增补人工牙困难
- E.适应证较严格

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

饮水加氟的适宜浓度是

选项:

- A.0.3 ~ 0.5 mg/L
- B.0.5 ~ 0.7 mg/L
- C.0.7 ~ 1.0 mg/L
- D.1.0 ~ 1.2 mg/L
- E.1.2 ~ 1.5 mg/L

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

不属于连接体的是

选项:

- A.卡环与基托相连部分
- B.卡环与舌杆相连部分
- C.卡臂与支托相连部分
- D.牙弓两侧鞍基相连部分
- E.卡环与金属网状结构相连部分

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

决定可摘局部义齿基托伸展范围的是

选项:

- A.基托的种类
- B.人工牙的种类
- C.黏膜的厚度
- D.力的大小
- E.缺失牙的时间

答案: D

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

患者女,25 岁。妊娠 3 个月。因牙龈红肿出血就诊。口腔检查发现 DI-S 为 2,CI-S 为 0,GI 为 1,余未见异常。对该患者正确的处理措施是

选项:

- A.口腔含漱剂含漱
- B.口服消炎药物
- C.口腔卫生指导
- D.龈上洁治术
- E.龈下刮治术

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者男，25岁。口腔内上下前牙龈乳头消失，并凹陷，呈反波浪形，牙间乳头颊舌侧分离，可从牙面翻开，下方有牙石，血象正常，无坏死。可能的原因是

选项：

- A. 疱疹性龈炎
- B. 中性粒细胞缺乏引起龈坏死
- C. 慢性龈缘炎
- D. 坏死性龈炎
- E. 龈乳头炎

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

男，60岁。行上颌结节注射麻醉后，突然感到心悸、头晕、头痛、脉搏快而有力。血压升至150 / 100 mmHg，口唇苍白，应考虑

选项：

- A. 中毒
- B. 晕厥
- C. 癡症
- D. 过敏
- E. 肾上腺素反应

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

男性，60岁。右下后牙残冠行局麻下拔除术。在局麻药注射中突然出现头晕、胸闷、面色苍白、全身冷汗、恶心、呼吸困难，诊断为晕厥。应采取的措施是

选项：

- A. 立即停止注射
- B. 放平椅位，置患者于头低位
- C. 松解衣领，保持呼吸道通畅
- D. 氧气吸入，静脉注射高渗葡萄糖
- E. 以上均是

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

一男性患者欲拔除左上颌第一磨牙，病史叙述中知其患有甲状腺功能亢进 4 年余。查体：其静息脉搏为 90 次 / 分，基础代谢率为 +16%，未见其他并发症发生。下列描述正确的是选项：

- A. 为拔牙禁忌证
- B. 为拔牙适应证，但应注意减少对患者的精神刺激，术后预防感染
- C. 麻药中可以加少量的肾上腺素
- D. 麻药可选择阿替卡因或甲哌卡因
- E. 以上选项均不正确

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

25 岁，初孕，妊娠第 8 周牙痛。检查：右下 6 牙体破坏大，需拔除，消炎后拔除的时间应为

选项：

- A. 1 周内
- B. 1 周后
- C. 2 周后
- D. 3 周后
- E. 4 周后

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

男性，70 岁。余留牙影响义齿修复求拔除。患者曾患过脑栓塞，长期服用阿司匹林。为防止拔牙术后出血应查

选项：

- A. X 线片检查
- B. 血常规检查
- C. 血小板计数
- D. 凝血酶原时间
- E. 心电图检查

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

男性，40 岁。诉左下颌后牙有洞 1 年求补。无明显自觉症状，患者 1 周前刚完成肿瘤放疗疗程。口腔检查：左下 6 残冠，已穿髓底，无法牙体修复，建议拔除。拔牙时机应选择

选项：

- A. 半年后
- B. 1 年后

- C.2年后
- D.3个月后
- E.3年后

答案：E

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

患者女性，56岁，右上第二磨牙疼痛半个月，糖尿病6年，服药控制血糖在5.96 mmol/L，要求拔牙此时应进行治疗的方案是

选项：

- A.局部冲洗上药
- B.口服抗生素
- C.拔牙+抗生素
- D.暂缓拔牙
- E.抗生素+上药

答案：C

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

患者，女性，65岁，有右上第一恒磨牙残根，高血压病8年余，未规律用药，测血压160/110 mmHg。正确的处理方法是

选项：

- A.内科治疗高血压后再考虑拔除右上第一恒磨牙
- B.2%普鲁卡因加肾上腺素局麻下拔除右上第一恒磨牙
- C.2%利多卡因局麻下拔除右上第一恒磨牙
- D.口服安定半小时后拔除右上第一恒磨牙
- E.口服复方降压片半小时后拔除右上第一恒磨牙

答案：A

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

男性，70岁。诉全口余留牙松动求治。患者无明显的全身系统性疾病。口腔检查：全口余留牙左下1右下12345，松动Ⅰ°~Ⅱ°，拟一次拔除。正确的拔牙顺序是

选项：

- A.先拔除左下1
- B.先拔除右下1
- C.先拔除右下3
- D.先拔除右下4
- E.从右下5开始由右向左顺序拔除

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者女，16 岁。发现右下颌骨逐渐膨大 8 年，近年来增大速度减慢。检查发现下颌骨体部弥漫性膨大，以颊侧更明显，质硬。X 线片示右下颌骨体部成磨砂玻璃样，与骨皮质相移行。术后病理检查发现纤维组织代替正常骨组织，其中有较多的纤细小梁。诊断为

选项：

- A. 牙骨质化纤维瘤
- B. 骨化性纤维瘤
- C. 骨纤维异常增殖症
- D. 巨颌症
- E. 牙源性纤维瘤

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者男，外伤昏迷后一度意识清醒好转，随后又转入嗜睡，昏迷，伤侧瞳孔散大，对光反射消失，呼吸脉搏变慢，血压升高，应考虑为

选项：

- A. 失血过多
- B. 电解质紊乱
- C. 硬脑膜外血肿
- D. 休克
- E. 以上都不是

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者女，43 岁。因开口严重受限 3 个月就诊，临床检查开口度 10mm，无明显疼痛，无弹响和杂音，右侧升颌肌群发硬有压痛，听诊器可听到肌杂音。最可能的诊断是

选项：

- A. 右侧翼外肌亢进
- B. 右侧翼外肌痉挛
- C. 右侧咀嚼肌群痉挛
- D. 右侧肌筋膜痛
- E. 右颞下颌关节炎性疾病类

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者女，18 岁。因下颌前牙拥挤到医院就诊。曲面体层片示上、下颌牙列完整，全口牙未见

明显的龋病，根尖周骨质良好，但在右侧下颌体部见一边缘清楚的圆形致密影，直径约 0.3 cm×0.3 cm，与牙根无关，患者亦无疼痛不适的症状。则该致密影最可能的诊断是

选项：

- A.牙瘤
- B.致密骨岛
- C.埋伏多生牙
- D.良性成牙骨质细胞瘤
- E.牙胚

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者男性,42 岁，残根需拔除，X 线片显示其腭侧根与上颌窦底影像重叠，判断牙根是否位于上颌窦内的征象为

选项：

- A.根尖周是否密度减低
- B.牙周膜与骨硬板是否连续
- C.上颌窦底是否突入牙根之间
- D.上颌窦是否过大
- E.垂直角度是否过大

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

男性患者，58 岁，晨起喝水时左侧口角漏水，照镜子发现左口角下垂，左眼不能完全闭合，遂来我院就诊。门诊除以上症状外，还发现左侧舌、颊及口底黏膜较对侧显无光泽、干燥，同侧舌前 2 / 3 味觉迟钝，听力检查明显较右侧差。对于该患者目前最恰当的治疗应选择

选项：

- A.立即行面神经管减压术
- B.大剂量激素+抗病毒药+神经营养药
- C.尽快给予强电流刺激以促进肌肉运动
- D.大剂量激素+肌肉兴奋剂
- E.阿司匹林+神经营养药

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

女，34 岁。右侧眉因外伤缺失。拟采用皮肤移植方法行眉再造手术。应选用的是

选项：

- A.表层皮片
- B.薄中厚皮片

- C.厚中厚皮片
- D.全厚皮片
- E.轴型皮瓣

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者，男，24岁，上唇部肿胀疼痛3天，伴发热。体温38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。

此病可诊断为

选项：

- A.上唇脓肿
- B.下唇疔
- C.上唇疔
- D.上唇皮脂腺继肿继发感染
- E.以上都不是

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

此部位感染最常见的致病菌为

选项：

- A.铜绿假单胞菌
- B.大肠杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.变形杆菌
- E.白色念珠菌

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

此部位感染易引起海绵窦化脓性血栓性静脉炎可能的原因不包括

选项：

- A.血运丰富
- B.面静脉无静脉瓣
- C.上唇运动较多
- D.细菌毒力强
- E.局部皮脂腺丰富

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

此患者的治疗方案中，哪项是错误的

选项：

- A.局部高渗盐水持续湿敷
- B.全身运用抗生素
- C.加强营养，增强抵抗力
- D.唇部减少活动
- E.早期挑破或切开引流

答案：E

解析：无

题型：A3/A4 型选择题

题目：

患者，男，26岁，因交通事故造成面部外伤而来诊。检查见耳、鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血，右侧上颌骨下垂，后牙早接触。

子题：

应选用以下哪项X线检查

选项：

- A.华特位片
- B.颧弓位片
- C.上颌前部横断片
- D.许勒位片
- E.上颌正位体层片

答案：A

解析：无

子题：

如X线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线横过鼻根、眶部，经颧额缝达翼突。正确的诊断是

选项：

- A.LeFort I 型骨折
- B.LeFort II 型骨折
- C.LeFort III型骨折
- D.鼻骨骨折
- E.颧弓骨折

答案：C

解析：无

子题：

如X线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底，经颧上颌缝达翼突。正确的诊断是

选项：

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 颧弓骨折

答案： B

解析： 无

子题：

以下各项处理措施中，哪项是错误的

选项：

- A. 抗生素点鼻
- B. 鼻腔填塞止血
- C. 耳鼻应经常消毒，保持干净
- D. 防止咳嗽和打喷嚏
- E. 用抗生素预防感染

答案： B

解析： 无

子题：

对于该患者应采取的初步救治措施是

选项：

- A. 气管切开，输液
- B. 立即行切开复位内固定术
- C. 立即行颌间结扎，颅颌绷带固定
- D. 消毒棉填塞鼻腔及外耳道，上颌骨暂时悬挂固定
- E. 暂时作颅上颌固定，补液，对症处理并密切观察

答案： E

解析： 无

题型： B1 型选择题

题目：

- A. 口腔问卷调查
- B. 口腔健康调查
- C. 口腔健康咨询
- D. 口腔保健规划
- E. 口腔预防保健措施

子题：

在新社区开展口腔卫生保健工作，首先要制定

选项：

答案： D

解析： 无

子题:

了解社区人群口腔健康知识、态度和行为状况要进行

选项:

答案: A

解析: 无

子题:

开展爱牙日活动最常采用的形式是

选项:

答案: C

解析: 无

题型: B1 型选择题

题目:

A.氧化锌

B.复合树脂

C.氢氧化钙

D.牙胶

E.磷酸锌粘固粉

子题:

常用的后牙充填材料是

选项:

答案: B

解析: 无

子题:

常见的垫底材料是

选项:

答案: E

解析: 无

题型: B1 型选择题

题目:

A.冷刺激一过性痛

B.温度刺激迟缓性痛

C.自发性阵发痛

D.自发性持续胀痛

E.疼痛有“扳机点”

子题:

可复性牙髓炎

选项:

答案：A
解析：无

子题：
龈乳头炎
选项：
答案：D
解析：无

子题：
急性牙髓炎
选项：
答案：C
解析：无

金英杰医学教育口腔主治医师