

第一站

1: 男, 65 岁, 干咳, 消瘦半年, 咯血 1 个月就诊。

2: 男, 69 岁, 尿色重黄, 皮肤瘙痒 1 个月就诊

发热、咳嗽, 脓性痰

下肢水肿, 有甲亢病史

第二站

①测血压, 右肺下界叩诊(问几条线, 肺下界在第几肋), 肱三头肌反射

②腋窝淋巴结 5 个组群, 胸壁视诊, 移动性浊音叩诊

③测血压、心脏叩诊、心脏听诊、腹部听诊

水坑征检查:如果腹腔积液量少, 用移动性浊音方法不能查出时, 若病情许可可让病人取肘膝位, 使脐部处于最低部位。由侧腹部向脐部叩诊, 如由鼓音转为浊音, 则提示有 120ml 以上腹腔积液的可能(即水坑征 **puddle sign**)(如图)。也可让病人站立, 如下腹部积有液体而呈浊音, 液体的上界呈一水平线, 在此水平线上为浮动的肠曲, 叩诊呈鼓音。

第三站

①心肺复苏 5 个循环(怎么判断生命体征), 青霉素皮试(阳性特征)

②穿脱消化道防护服

③曲池捻针法操作

①静脉注射

②心肺复苏 5 个循环、男性导尿、吸氧术

③三阴交穴位的定位及直线刮痧法

④戊二醛的配比及浸泡方法



更多资料欢迎加微信号, 进群获取