

2021 中医执业医师考试

模拟密押卷

2021 年

中医执业医师资格

考试专用

(答案)

第一单元

A1

1. 小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下，说明了湿邪

- A. 湿性趋下
- B. 湿性黏滞
- C. 湿性重浊
- D. 湿为阴邪
- E. 易阻气机

1. A

解析：湿性趋下，易袭阴位；湿邪类水属阴而有趋下之势，故湿邪为病，多易伤及人体下部。如水肿、湿疹、脚气等病以下肢较为多见，故《素问·太阴阳明论》说：“伤于湿者，下先受之。”小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下等，多由湿邪下注所致。

2. 津液的丢失往往伴有气的损耗，说明二者的关系是

- A. 气能行津
- B. 气能摄津
- C. 气能生津
- D. 津能生气
- E. 津能载气

答案：E

解析：津液是气运行的载体之一。在血脉之外，气的运行必须依附于津液，否则也会使气漂浮失散而无所归，故说津能载气。因此，津液的丢失，必定导致气的损耗。

3. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

3. D

解析：昼夜阴阳属性的一般说法是：上午属阳中之阳，下午属阳中之阴，前半夜属阴中之阴，后半夜属阴中之阳。

4. 阴液不足，日久不愈，影响阳气化生，引起阳也不足的病理变化是

- A. 阴偏衰
- B. 阳偏衰
- C. 阳损及阴
- D. 阴损及阳
- E. 阴阳互损

答案：D

解析：阴损及阳即阴虚至一定程度，就可累及阳，使阳气化生不足，而形成以阴虚为主的阴阳两虚病理变化。

5. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

5. B

解析：阴阳的互根互用是指相互对立的阴阳两个方面，具有相互依存，相互为用的联系。如上为阳，下为阴，没有上也就无所谓下，没有下也就无所谓上。又如组成人体和维持人体生命活动的最基本物质气和血两者的关系，气属阳，血属阴，气为血之帅，血为气之母，二者是互根互用的。人体的阴津损伤，会累及阳气也伤；阳气损伤，会累及阴津也伤，也是基于阴阳互根互用的原理。如果由于某些原因导致阴阳之间互根互用的关系破坏，就会引起“阴损及阳”或“阳损及阴”的阴阳俱损的病变。最终导致“阴阳离决，精气乃绝”。“守”是守于内，“使”是行于外。这是对阴阳双方依存关系的很好说明。结合人体的生理功能而言，阴指物质，阳指功能，物质居于体内，功能表现于外。在外的阳是内在物质的表现，所以说阳为“阴之使”，在内的阴是产生机能活动的物质基础，所以说阴为“阳之守”。

6. 下列情志相胜关系中，哪一项是错误的

- A. 怒胜思
- B. 思胜恐
- C. 恐胜喜
- D. 喜胜悲
- E. 惊胜怒

6. E

解析：《素问·阴阳应象大论》“怒伤肝，悲胜怒……喜伤心，恐胜喜……思伤脾，怒胜思……忧伤肺，喜胜忧……恐伤肾，思胜恐。”悲为肺志，属金；怒为肝志，属木，金能克木，故悲胜怒。

7. 具有“主治节”功能的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

7. D

解析：肺主治节：治节，即治理调节。肺主治节是指肺气具有治理调节肺之呼吸及全身气、血、水的作用。是对肺的主要生理机能的高度概括。

8. 具有“水之上源”之称的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

8. D

解析：肺居高位，又能行水，故称之为“水之上源”。

9. 六腑中具有“太仓”之称的是

- A. 小肠
- B. 三焦
- C. 脾
- D. 大肠
- E. 胃

9. E

解析：胃主受纳水谷，是指胃气具有接受和容纳饮食水谷的作用。饮食入口，经过食管（咽）进入胃中，在胃气的通降作用下，由胃接受和容纳，暂存于其中，故胃有“太仓”、“水谷之海”之称。

10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是

- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴
- D. 肾阳

E. 肾血

10. C

解析：肾阴是肾气中具有凉润、宁静、抑制等作用的部分。肾阴与肾阳协调共济，则合化为冲和之肾气，推动和调控肾的各种功能活动。

11. 有君相安位关系的两脏是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

11. B

解析：心为君火，肾为相火（命火）。命火秘藏，则心阳充足；心阳充盛，则相火亦旺。君相安位，则心肾上下交济，心阳、肾阳旺盛而正常。

12. “中精之腑”指

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

12. A

解析：《灵枢·本输》称胆为“中精之腑”。

13. 具有“喜润恶燥”生理特性的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

13. B

解析：胃为六腑之一，故为阳土，胃又为水谷之海，多气多血。胃的受纳腐熟，不仅依赖胃气的推动和蒸化，亦需胃中津液的濡润。胃中津液充足，则能维持饮食水谷的受纳腐熟和胃气的通降下行。故胃性喜润恶燥。

14. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺

E. 肾

14. C

解析：脾胃之间，纳运相合，升降相因，有序不乱，相反相成，饮食物得以正常的消化吸收。在病理上，脾气不升，水谷夹杂而下，出现泄泻甚则完谷不化；胃气不降反而上逆，可见恶心呕吐，呃逆嗳气。故《素问·阴阳应象大论》说：“清气在下，则生飧泄，浊气在上，则生膜胀。”

15. 脑主司感觉运动，有赖于

- A. 脑髓充养
- B. 营血充养
- C. 肾精充养
- D. 肝血充养
- E. 脾精充养

15. A

解析：人的感官位于头部，与脑相通，依赖脑髓的充养才能发挥感觉运动功能。

16. 脉象分阴阳，属于阴的脉象是

- A. 浮
- B. 大
- C. 迟
- D. 滑
- E. 洪

答案：C

解析：脉象分阴阳：辨脉之部位、动态、至数、形状也可以分辨病证的阴阳属性。如以部位分，寸为阳，尺为阴；以动态分，则至者为阳，去者为阴；以至数分，则数者为阳，迟者为阴；以形状分，则浮大洪滑为阳，沉涩细小为阴。

17. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

17. E

解析：质地较浓稠，流动性较小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等，起濡养作用的，称为液。

18. 与生长发育有关的气是

- A. 元气
- B. 宗气

C. 营气

D. 卫气

E. 脏腑之气

18. A

解析：元气的生理功能主要有两个方面：一是推动和调节人体的生长发育和生殖功能；二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。

19. 体质的构成正确的是

- A. 形态结构、生理机能、心理状态
- B. 社会因素、心理因素、机体状态
- C. 先天因素、后天因素、个人因素
- D. 形态结构、心理机能、后天因素
- E. 社会因素、自然因素、个人因素

19. A

解析：体质由形态结构、生理机能和心理状态三个方面的差异性构成。

20. 经筋的生理功能是

- A. 主蓄积渗灌气血
- B. 主联络机体内外
- C. 主运行气血津液
- D. 主束骨而利机关
- E. 主经气的感应传导

20. C

内生“五邪”，指在疾病过程中，机体自身由于脏腑功能异常而导致化风、化火、化寒、化燥、化湿的病理变化。因病起于内，又与风、寒、湿、燥、火外邪所致病证的临床征象类似，故分别称为“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”，统称为内生“五邪”。

21. 关于体质的特点，说法错误的是

- A. 先天遗传性
- B. 差异多样性
- C. 不稳定性
- D. 群类趋同性
- E. 后天可调性

21. C

解析：体质的特点包括：先天遗传性、差异多样性、形神一体性、群类趋同性、相对稳定性、动态可变性、连续可测性和后天可调性。

22. 内生“五邪”包括

- A. 内风、内暑、内湿、内燥、内火

- B. 内风、内寒、内暑、内燥、内火
C. 内风、内寒、内湿、内燥、内火
D. 内风、内寒、内湿、内暑、内热
E. 内风、内寒、内湿、内燥、内暑

22. A

解析：内生“五邪”包括内风、内暑、内湿、内燥、内火

23. 疾病发生的发病基础是

- A. 邪气亢盛
B. 正气受损
C. 正气虚
D. 邪气损正
E. 正气抗邪

23. C

解析：邪正交争是疾病发生的基本原理。正气虚是发病的基础，邪气是疾病形成的外在条件。疾病发生与否，主要取决于正气的盛衰。而体质正是正气盛衰偏倾的反映。

24. 《素问·宣明五气》中说法错误的是

- A. 久立伤骨
B. 久行伤筋
C. 久卧伤气
D. 久坐伤精
E. 久视伤血

24. D

解析：《素问·宣明五气》说：“久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，久视伤血”。

25. 风性善动不居，游走不定，体现风性

- A. 为百病之长
B. 轻扬开泄
C. 善行而数变
D. 主动
E. 以上皆非

25. C

解析：风性善行而数变：“善行”，指风性善动不居，游走不定。

26. 《素问·阴阳应象大论》所述“浊阴走五藏”中的“浊阴”是指

- A. 饮食物的糟粕和尿液
B. 水谷之精气
C. 藏于五脏的精血津液
D. 阴液
E. 痰饮等病理产物

26. C

解析：“浊阴走五藏”中的“浊阴”为藏于五脏的精血津液。

27. 《素问·评热病论》中“劳风”的治法宜

- A. 表里刺之
B. 以救俯仰
C. 饮之服汤
D. 调其虚实
E. 和其顺逆

27. B

解析：劳风法在肺下，其为病也，使人强上冥视，唾出若涕，恶风而振寒，此为劳风之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。

28. 下列病证除哪项外，均可用麻黄汤治疗

- A. 太阳与阳明合病，喘而胸满者
B. 太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者
C. 太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者
D. 伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗
E. 伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者

28. D

解析：麻黄汤主治外感风寒表实证。恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

29. 当归四逆汤证之“手足寒”，其病机是

- A. 血虚寒厥，气血不畅
B. 气虚生寒，血脉不畅
C. 血液不足，血脉不畅
D. 气滞血瘀，血脉不畅
E. 阳虚有寒，四肢不温

29. A

解析：当归四逆汤是治疗血虚寒厥主方。

30. 患者喘息咳唾，胸背痛，短气，右脉沉迟，左脉弦急，治宜

- A. 栝蒌薤白白酒汤
B. 栝蒌薤白半夏汤
C. 枳实薤白桂枝汤
D. 橘枳姜汤
E. 薏苡附子散

30. A

解析：胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。

31. 关于越婢汤的主症，以下哪项不确切

- A. 恶风
- B. 身肿
- C. 脉浮
- D. 大热
- E. 汗出

31. D

解析：越婢汤具有发汗散水清解郁热之效。在临床上应用当有头面部及上半身浮肿，并常伴有恶寒、发热、身痛、咳喘胸闷、咽痛口渴、尿少色黄，苔薄白或黄白相间而润，脉浮数等兼症。

32. 关于桂枝芍药知母汤证的主症，以下哪项不是

- A. 肢节疼痛
- B. 头眩短气
- C. 温温欲吐
- D. 脚肿
- E. 口不能言

32. E

解析：诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

33. 若斑出热不解者，以下治疗方法不恰当的为

- A. 主以甘寒
- B. 益胃养津
- C. 玉女煎
- D. 当用开泄
- E. 梨皮、蔗浆

33. D

解析：若斑出热不解者，胃津亡也，主以甘寒，重则如玉女煎，轻则如梨皮、蔗浆之类。

34. 以下哪项最适用于湿热证湿在表分的治疗

- A. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、大力子
- B. 藿香、香薷、黄芩、苍术皮、薄荷、射干
- C. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、射干、大力子

D. 藿香、香薷、羌活、白术、薄荷、大力子

E. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、大豆黄卷

34. A

解析：湿热证，恶寒无汗，身重头痛，湿在表分。宜藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味。头不痛者，去羌活。

35. 指出“湿热病属阳明太阴经者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”的医家是

- A. 吴又可
- B. 叶天士
- C. 薛生白
- D. 吴鞠通
- E. 王孟英

35. C

解析：“湿热病属阳明太阴经者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”出自《温热病篇》，作者为薛生白。

36. 以下哪项不是寒痰阻肺证的特征

- A. 痰多
- B. 色白
- C. 咳喘
- D. 质稀
- E. 难咯

36. E

解析：寒痰阻肺证临床表现：咳嗽，痰多、色白、质稠或清稀、易咯，胸闷，气喘，或喉间有哮鸣声，恶寒，肢冷，舌质淡，苔白腻或白滑，脉弦或滑。根据题干要求，只有E项不是寒痰阻肺证的表现，对于寒痰阻肺证而言，其痰是易咯的。

37. 热极的患者其唇的色泽可表现为

- A. 唇色深红
- B. 唇色青紫
- C. 口唇青黑
- D. 口唇赤肿而干
- E. 口唇呈樱桃红色者

37. D

解析：口唇赤肿而干：多为热极。唇色深红：多为热盛。口唇呈樱桃红色者：常见于煤气中毒。唇色青紫：多为血瘀，常见于心气虚、

心阳虚或呼吸困难严重的病人。口唇青黑：多为冷极、痛极。

38. 斑与疹的主要区别是

- A. 是否色红成片
- B. 是否时现时隐
- C. 是否抚之碍手
- D. 是否压之褪色
- E. 是否伴有身热

38. C

解析：斑指皮肤出现深红色或青紫色、片状斑块，平摊于皮肤，摸之不应手，压之不褪色者。疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色者。二者最主要的区别是在于是否抚之碍手。

39. 症见胁肋胀痛，口苦，阴部瘙痒，带下色黄臭秽，脉弦数，此为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝火炽盛证
- C. 胆郁痰扰证
- D. 肝胆湿热证
- E. 湿热蕴脾证

39. D

解析：肝胆湿热证病位主要在肝胆（疏泄功能失职），故以胁肋胀痛、肋下痞块、黄疸、口苦等肝胆疏泄失常症状为主，尚可出现寒热往来及阴部瘙痒，妇女带下黄臭等症。

40. 鼻流浊涕者，多属
- A. 外感风热
 - B. 胆经湿热
 - C. 阳气虚弱
 - D. 外感风寒
 - E. 阴虚肺燥

40. A

解析：新病鼻塞流清涕，是外感风寒；鼻流浊涕，是外感风热。

41. 眼窝凹陷多属

- A. 肺胀
- B. 吐泻伤津
- C. 肝胆火炽
- D. 脾胃虚衰
- E. 肾阴不足

41. B

解析：眼窝凹陷多为伤津耗液或气血不足，可见于吐泻伤津或气血虚衰的病人。

42. 舌苔薄白而干者多见于

- A. 湿浊中阻
- B. 食积内停
- C. 脾肾阳虚
- D. 外感风热
- E. 燥热伤津

42. D

解析：苔薄白而干多见于外感风热。苔白厚腻多为湿浊内停，或为痰饮、食积。苔白厚而干主痰浊湿热内蕴。

43. 症见口苦，咽干，寒热往来，胸胁苦满，脉弦，此为

- A. 太阳经证
- B. 太阳腑证
- C. 少阳病证
- D. 阳明经证
- E. 阳明腑证

43. C

解析：少阳病证临床表现：口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦欲呕，脉弦。辨证要点：本证是以寒热往来、胸胁苦满等为辨证要点。

44. 在 28 脉中，具有沉、实、大、弦、长特点的脉象是

- A. 紧脉
- B. 革脉
- C. 牢脉
- D. 芤脉
- E. 伏脉

案：C

解析：沉取实大弦长，坚牢不移。其脉象特征是脉位沉长，脉势实大而弦。牢脉轻取、中取均不应，沉取始得，但搏动有力，势大形长，为沉、弦、大、实、长五种脉象的复合脉。

45. 舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称

- A. 花剥苔
- B. 地图舌
- C. 镜面舌
- D. 光滑舌
- E. 类剥苔

45. E

解析：类剥苔：剥脱处并不光滑，似有新生颗粒。花剥苔：舌苔多处剥脱，剥脱处光滑无苔，余处斑斑驳驳地残存舌苔，界限明显。地图舌：舌苔不规则地大片脱落，边缘厚，舌苔界限清楚，形似地图。光剥苔：舌苔全部脱落，舌面光洁如镜（又称为镜面舌或光滑舌）。

46. 下列不属肾精耗损证表现的是

- A. 手足心热
- B. 消瘦无力
- C. 口燥咽干
- D. 舌绛不鲜
- E. 手指蠕动

46. E

解析：肾精耗损证：低热持续不退，手足心热甚于手足背，神惫萎顿，消瘦无力，口燥咽干，耳聋，舌绛不鲜干枯而萎，脉虚等。辨证要点：本证以手足心热甚于手足背，口干咽燥，舌绛不鲜干枯而萎，脉虚为辨证要点。选项 E 是虚风内动证的表现。故此题的最佳选项是 E。

47. 下列哪项为下焦病证的临床表现A.

身热

- B. 颧红
- C. 手足心热甚于手足背
- D. 心中憺憺大动
- E. 以上均是

答案：E

解析：下焦病证的临床表现有，身热，手足心热甚于手足背，颧红，口舌干燥，神倦，耳聋，舌红少苔，脉虚大；或见手足蠕动，或瘈瘲，心中憺憺大动，神倦，脉虚，舌绛苔少，甚或时时欲脱。

48. 下列各项中，属于病理性舌象表现的是

- A. 肥胖之人舌多胖大而质淡
- B. 老年人舌色较暗红或带紫暗色
- C. 消瘦之人舌体偏瘦而舌色偏红
- D. 儿童的舌质多淡嫩，舌苔偏少易剥
- E. 以上都不是

48. E

解析：舌象的生理变异：正常舌象受体内外部环境的影响，可以产生各种生理性变异。（1）年龄因素的影响：儿童的舌质多淡嫩，舌苔偏少易剥，老年人的舌色多暗红。（2）性

别因素的影响：受女性生理特点的影响，在月经期可蕈状乳头充血而舌质偏红，或舌尖边部有明显的红刺。月经过后可以恢复正常。

（3）禀赋体质因素的影响：舌象可以出现一些差异。可见先天性裂纹舌、齿痕舌、地图舌等。（4）气候、环境因素的影响：夏季舌苔多厚；秋季舌苔偏干燥；冬季舌常湿润等。

49. 常见饭后嗜睡，其原因多为

- A. 脾气虚弱
- B. 湿邪困脾
- C. 心肾阳虚
- D. 邪闭心神
- E. 以上都不是

49. A

解析：饭后神疲困倦易睡，兼食少纳呆，少气乏力为脾气虚弱。

50. 大便溏结不调多见于

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝郁脾虚
- E. 食滞胃肠

50. D

解析：便质异常：（1）完谷不化：病久体弱者见之，多属脾虚、肾虚；新起者多为食滞胃肠。（2）溏结不调：多因肝郁脾虚，肝脾不调所致。若大便先干后稀，多属脾虚。

51. 下列关于头痛不同性质的内容叙述错误的是

- A. 头痛连项，遇风加重者属风寒头痛
- B. 头痛怕热，面红目赤者属风热头痛
- C. 头痛如裹，肢体困重者属风湿头痛
- D. 头痛绵绵，过劳则盛者属肾虚头痛
- E. 头痛眩晕，面色苍白者属血虚头痛

51. D

解析：根据头痛的不同性质，可辨识病性的寒热虚实：（1）头痛连项，遇风加重者：属风寒头痛。（2）头痛怕热，面红目赤者：属风热头痛。（3）头痛如裹，肢体困重者：属风湿头痛。（4）头痛绵绵，过劳则盛者：属气虚头痛。（5）头痛眩晕，面色苍白者：属血虚头痛。（6）头脑空痛，腰膝酸软者：属肾虚头痛。

52. 胁痛与下列哪项无关

- A. 饮停胸胁
- B. 肝郁气滞
- C. 肝胆火盛
- D. 寒滞肝脉
- E. 肝胆湿热

52. D

解析：除了 D 选项外，其余都是引起胁痛的病因。寒滞肝脉是引起少腹冷痛牵及外阴的原因。

53. 气滞血瘀的痛证可见哪种脉象

- A. 革脉
- B. 紧脉
- C. 滑脉
- D. 实脉
- E. 涩脉

53. E

解析：涩脉多见于气滞、血瘀和精伤、血少。

54. 伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者称为

- A. 传经
- B. 顺传
- C. 直中
- D. 合病
- E. 并病

54. E

解析：伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为“并病”。如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

55. 下列症状哪项不是实证的临床表现

- A. 五心烦热
- B. 大便秘结
- C. 小便不通
- D. 痰涎壅盛
- E. 腹痛拒按

55. A

解析：对于实证而言其发热是蒸蒸壮热，而 A 选项中是虚证的发热表现。

56. 具有清热燥湿作用的药物应具有的药味是

- A. 酸味
- B. 苦味
- C. 甘味
- D. 辛味

E. 咸味

56. B

解析：苦：有泄下、燥湿、坚阴的作用。即具有清泄火热、泄降气逆、通泻大便、燥湿、坚阴（泻火存阴）等作用。

57. 半夏与陈皮合用可以增强燥湿化痰的作用，属于哪种配伍关系

- A. 相畏
- B. 相杀
- C. 相须
- D. 相使
- E. 相恶

57. C

解析：相须：就是两种功效相似的药物配合应用，可以增强原有药物的疗效。半夏与陈皮的配伍是属于相须。

58. 下列配伍中属于“十九畏”配伍的药物是

- A. 大戟与甘草
- B. 贝母与乌头
- C. 乌头与瓜蒌
- D. 官桂与赤石脂
- E. 芍药与藜芦

58. D

解析：十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。

59. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物是

- A. 麻黄、荆芥
- B. 香薷、紫苏
- C. 麻黄、香薷
- D. 紫苏、生姜
- E. 荆芥、防风

59. C

解析：香薷功效：发汗解表，化湿和中，利水消肿。麻黄功效：发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

60. 下列药物中可用于治疗巅顶头痛的是

- A. 藁本
- B. 防风
- C. 细辛
- D. 辛夷
- E. 荆芥

60. A

解析：藁本主治病证：风寒感冒，巅顶头痛；风寒湿痹。此处要重点掌握藁本能用于治疗巅顶头痛的作用。

61. 治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是

- A. 菊花、木贼
- B. 薄荷、柴胡
- C. 桑叶、菊花
- D. 桑叶、牛蒡子
- E. 蝉蜕、乌贼

61. C

解析：桑叶与菊花，二药均能疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，常相须为用治疗外感风热、肝火上炎的目赤肿痛及肝阳眩晕等证。

62. 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等证，宜选用的药物是

- A. 天花粉、沙参
- B. 生石膏、黄柏
- C. 黄柏、知母
- D. 黄芩、地骨皮
- E. 牡丹皮、桑白皮

62. C

解析：知母入肺肾经而能滋肾阴、泻肾火、退骨蒸，用治阴虚火旺所致骨蒸潮热、盗汗、心烦者，常配黄柏、生地黄等药用，如知柏地黄丸。

63. 治疗怀胎蕴热、胎动不安者，当选用的药物是

- A. 桑寄生
- B. 黄芩
- C. 紫苏
- D. 续断
- E. 砂仁

63. B

解析：黄芩功效：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。主治：胎动不安。具有清热安胎之功。

64. 以下哪项是芦根和淡竹叶共有的功效

- A. 止呕
- B. 利尿
- C. 止血
- D. 凉血
- E. 以上都不是

64. B

解析：芦根功效：清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。淡竹叶功效：清热泻火，除烦，利尿。

65. 具有润肺止咳，散结消痈功效的药物是

- A. 川贝母
- B. 旋覆花
- C. 百部
- D. 杏仁
- E. 紫菀

65. A

解析：川贝母功效：润肺止咳，清热化痰，散结消痈

66. 既能清热解毒，又能疏散风热的药对是

- A. 桑叶、菊花
- B. 薄荷、牛蒡子
- C. 牛黄、水牛角
- D. 金银花、连翘
- E. 蒲公英、紫花地丁

66. D

解析：金银花功效：清热解毒，疏散风热。连翘功效：清热解毒，消肿散结，疏散风热。

67. 治疗风湿日久，累及肝肾的最佳药物组合是

- A. 羌活、独活
- B. 五加皮、桑寄生
- C. 秦艽、薏苡仁
- D. 白术、苍术
- E. 苍术、黄柏

67. B

解析：五加皮、桑寄生均属于祛风湿强筋骨药，主入肝肾经，除祛风湿外，又有补肝肾、强筋骨的作用，主要用于风湿日久，肝肾虚损，腰膝酸软，脚弱无力等。

68. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是

- A. 0.1~0.3g、0.5~1g
- B. 1~2g、0.1~1g
- C. 1~5g、1~2g
- D. 5~15g、3~6g
- E. 以上都不是

68. C

解析：肉桂用法用量：煎服，1~5g，宜后下或焗服；研末冲服，每次1~2g。

69. 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物

- A. 桑枝
- B. 防己
- C. 威灵仙
- D. 薏苡仁
- E. 络石藤

69. C

解析：威灵仙性能：温，味辛、咸。功效：祛风除湿，通络止痛。威灵仙性味都偏温，不适合治疗风湿热痹。

70. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是

- A. 大蓟
- B. 小蓟
- C. 白茅根
- D. 地榆
- E. 槐花

70. C

解析：白茅根功效：凉血止血，清热利尿，清肺胃热。

71. 可用于养血安胎的药物是

- A. 狗脊
- B. 砂仁
- C. 乌梢蛇
- D. 五加皮
- E. 桑寄生

71. E

解析：桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于治疗崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安。能补肝肾，养血而固冲任，安胎。

72. 既能化湿行气，又能止泻及安胎的药物是

- A. 藿香
- B. 佩兰
- C. 砂仁
- D. 白豆蔻
- E. 草果

72. C

解析：砂仁功效：化湿行气，温中止泻，安胎。藿香功效：化湿，止呕，解暑。佩兰功效：化湿，解暑。白豆蔻功效：化湿行气，温中止呕。草果功效：燥湿温中，除痰截疟。73. 既能化湿，又能解暑的药物是

- A. 藿香、佩兰
- B. 苍术、厚朴

- C. 砂仁、豆蔻
- D. 陈皮、青皮
- E. 茯苓、玉竹

73. A

解析：藿香功效：化湿，止呕，解暑。佩兰功效：化湿，解暑。

74. 功效活血调经，利尿消肿，清热解毒的药物是

- A. 艾叶
- B. 五灵脂
- C. 郁金
- D. 益母草
- E. 没药

74. D

解析：益母草功效：活血调经，利尿消肿，清热解毒。

75. 发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。治疗宜首选

- A. 黄连、木香
- B. 黄柏、木香
- C. 苦参、木香
- D. 马齿苋、木香
- E. 黄芩、木香

75. A

解析：黄连大苦大寒，具有清热燥湿、泻火解毒之功，常用于湿热泻痢腹痛，里急后重，与木香同用，如香连丸。此为湿热泻痢，故选 A

76. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A. 砂仁
- B. 苍术
- C. 豆蔻
- D. 草果
- E. 以上都不是

76. B

解析：苍术主治：（1）湿阻中焦证。本品苦温燥湿以祛湿浊，辛香健脾以和脾胃。对湿阻中焦证，最为适宜，如平胃散。（2）风湿痹证。本品长于祛湿，对痹证湿胜者尤宜。（3）风寒夹湿表证。此外，本品尚能明目，用于夜盲症及眼目昏涩。

77. 既能温中止痛，又能杀虫，可用于蛔虫腹痛、呕吐或吐蛔的药物是

- A. 干姜

- B. 吴茱萸
- C. 砂仁
- D. 小茴香
- E. 花椒

77. E

解析：花椒功效：温中止痛，杀虫止痒。主治病证：中寒腹痛，寒湿吐泻；虫积腹痛，湿疹，阴痒。

78. 沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于

- A. 温肺化饮
- B. 燥湿化痰
- C. 温肾纳气
- D. 益气健脾
- E. 补益肺肾

78. C

解析：沉香功效：行气止痛，温中止呕，纳气平喘。

79. 功效燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿的药物是

- A. 天南星
- B. 蝉蜕
- C. 川乌
- D. 防风
- E. 蕲蛇

79. A

解析：天南星功效：燥湿化痰，祛风解痉；外用散结消肿。

80. 川楝子、槟榔皆具有的功效是

- A. 杀虫行气
- B. 杀虫利水
- C. 行气利水
- D. 行气疏肝
- E. 行气健脾

80. A

解析：槟榔功效：杀虫消积，行气，利水，截疟。川楝子功效：行气止痛，杀虫。

81. 附子的归经为

- A. 心、肝、脾
- B. 心、脾、肾
- C. 心、肝、肾
- D. 心、脾、肺
- E. 心、肾、肺

81. B

解析：附子性能：辛、甘，大热。有毒。归心、肾、脾经。

82. 既能收敛止血，止痢，又能截疟，补虚的药物是

- A. 苦楝皮
- B. 沙苑子
- C. 侧柏叶
- D. 仙鹤草
- E. 三七

82. D

解析：仙鹤草功效：收敛止血，止痢，截疟，补虚。苦楝皮功效：杀虫，疗癣。沙苑子功效：补肾固精，养肝明目。侧柏叶功效：凉血止血，化痰止咳，生发乌发。三七功效：化瘀止血，活血定痛。

83. 桑白皮与葶苈子既能泻肺平喘，又能

- A. 利水渗湿
- B. 利水通淋
- C. 利水消肿
- D. 利水止泻
- E. 利水退黄

83. C

解析：桑白皮与葶苈子二药均有泻肺平喘和利水消肿作用，治疗肺热咳喘及水肿、小便不利等常相须为用。桑白皮甘寒，药性较缓，长于清肺热，降肺火，多用于肺热咳喘，痰黄及皮肤水肿；葶苈子力峻，重在泻肺中水气、痰涎，邪盛喘满不得卧者尤宜，其利水作用较强，可兼治鼓胀、胸腹积水等证。84. 具有补气养阴，清热生津作用的药物是A. 玄参

- B. 苦参
- C. 丹参
- D. 太子参
- E. 西洋参

84. E

解析：西洋参功效：补气养阴，清热生津。

85. 下列除哪项外，均具有明目功效

- A. 菟丝子
- B. 金樱子
- C. 沙苑子
- D. 枸杞子
- E. 女贞子

85. B

解析：金樱子功效：固精缩尿止带，涩肠止泻。
菟丝子功效：补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。
沙苑子功效：补肾固精，养肝明目。
枸杞子功效：滋补肝肾，益精明目。
女贞子功效：滋补肝肾，乌须明目。

A2

86. 患者，男，59岁，久病，因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，称为

A. 子暗
B. 金破不鸣
C. 金实不鸣
D. 少气
E. 短气

86. B

解析：本题考查音哑与失音的临床表现及其意义。久病音哑和失音多属虚症，多因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，即所谓“金破不鸣”。

87. 患者男性，60岁。平素眩晕病史，因恼怒而突发头痛而胀，继而昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。此证候属

A. 气结
B. 气逆
C. 气郁
D. 气脱
E. 气陷

87. B

解析：题例中，患者因恼怒而突发头痛而胀，继而昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。此属于肝气上逆的表现。88. 患儿，男，4岁。因发热，腹泻来诊。脉浮，大小不齐，应考虑为

A. 痰食
B. 风痰
C. 寒湿
D. 积滞
E. 风热

88. D

解析：本题考查小儿脉象主病。大小不齐为积滞。

89. 患者，男，45岁，面色浮红如妆，但非满面通红，口渴但不欲饮，小便清长，舌淡，苔白，脉浮大，按之无力。其病证多为

A. 阴虚火旺
B. 肝胆湿热
C. 实热内炽
D. 真热假寒
E. 真寒假热

89. E

解析：题目中面色苍白或泛红如妆以面色来考察寒热真假的鉴别。面色泛红如妆，但非满面通红，与热证的满面通红不同。患者一般情况下面色苍白，实际上因阳虚衰微，阴寒内盛，逼迫虚阳浮越于外，虚阳浮越的“戴阳”或“格阳”证，即为真寒假热证。90. 患者男性，38岁，近日发热微恶寒，口苦，胁痛，尿短黄，大便粘臭，舌红苔薄白，脉数。其证候是

A. 真寒假热
B. 真热假寒
C. 表热里寒
D. 表寒里热
E. 表里俱热

90. D

解析：本题考查表里同病之表寒里热。表寒里热：先有表寒未罢，又入里化热。或先有里热之人，复感风寒之邪，出现恶寒发热、无汗、头身疼痛、口渴喜饮、烦躁、便秘尿黄，舌红苔黄等。

B1

(91~92题共用备选答案)

A. 母病及子
B. 相乘传变
C. 子病犯母
D. 相侮传变
E. 制化传变

91. 水气凌心属于

92. 木火刑金属于

91. B

解析：水气凌心指水气上逆，引起心脏的病变。凌，侵犯的意思。由于脾肾阳虚，气化障碍，水液停留体内，不能正常排泄，产生

痰饮，水肿等水气病。水气上逆，停聚胸膈影响心阳时，可致心阳不振，心气不宁，出现心悸、气促等症状。治宜温阳益气、宁心涤饮。肾属水，心属火，依据五行关系，水克火，而此为病理状态，故它们之间是相乘关系，即水过度克制火。故选 B。

92. D

解析：相侮是指五行中的任何一行本身太过，使原来克它的一行，不仅不能去制约它，反而被它所克制，即反克。木火刑金，木火，指“肝火”，肺属金。肝火过旺，可以耗伤肺金，引起肺病的加重，出现干咳，胸胁疼痛，心烦，口苦，目赤，甚或咯血等。金原是克木的，但由于木过度亢盛，使得金不仅不能去克木，反而被木所克制，令金受损，这叫木反侮金。

(93~94 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

93. “在液为涎”的脏是

94. “在液为泪”的脏是

93. C

解析：脾在液为涎，涎为口津，即唾液中较清稀的部分，由脾精、脾气化生并转输布散，故说“脾在液为涎”。

94. A

解析：肝在液为泪，泪由肝精、肝血所化。肝开窍于目，泪从目出，有濡润、保护眼睛的功能。

(95~96 题共用备选答案)

- A. 脾胃
- B. 肝胆
- C. 心肾
- D. 肝肾
- E. 肝肺

95. 与气机调节关系密切的是

96. 气机升降之枢指的是

95. E

解析：肺与肝的生理联系，主要表现在人体气机的升降调节方面。肝气以升发为宜，肺气以肃降为顺。此为肝肺气机升降的特点所

在。肝升肺降，升降协调，对全身气机的调畅、气血的调和具有重要的调节作用。96. A

解析：脾胃为人体气机升降之枢纽。枢纽所司，则当升者升，当降者降，以维持精微的运化与敷布及其全身的气机升降运动，因此脾胃为枢是生命活动的重要环节。

(97~98 题共用备选答案)

- A. 目
- B. 舌
- C. 口
- D. 鼻
- E. 耳

97. 脾在窍为

98. 肺在窍为

97. C

解析：脾开窍于口，人的食欲、口味与脾气的运化功能密切相关。脾的经脉“连舌本，散舌下”，舌又主司味觉，所以，食欲和口味都可反映脾的运化功能是否正常。

98. D

解析：肺开窍于鼻，鼻为呼吸道之最上端，通过肺系（喉咙、气管等）与肺相连，具有主通气和主嗅觉的功能。鼻的通气和嗅觉功能，都必须依赖肺气的宣发运动。

(99~100 题共用备选答案)

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 阴阳维脉

99. 具有约束纵行诸经功能的是

100. 称为“十二经脉之海”的是

99. D

解析：十二正经与奇经中的七脉均为上下纵行，唯有带脉环腰一周，有约束诸脉的作用。100. A

解析：冲脉能调节十二经脉气血，故又称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。

(101~102 题共用备选答案)

- A. 伏而后发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 感邪即发

E. 复发

101. 感邪后缓慢发病是

102. 疔气致病多为

101. B

解析：徐发，又称为缓发，即指感邪后缓慢发病。

102. D

解析：感邪即发，又称为卒发、顿发。即感邪后立即发病。多见于：①新感外邪较盛。如感受风寒、风热、温热、暑热、温毒邪气，邪气较盛时，多感邪即发。②情志剧变。剧烈的情绪变化，如暴怒、过度悲伤均可致气机逆乱，气血失调，脏腑功能障碍而顷刻发病。③毒物所伤。误服有毒食品，药物中毒、吸入有毒的秽浊之气，可使人中毒而迅速发病。④外伤。无论何种外伤，伤人后立即发病。⑤感受疔气。由于其性毒烈，致病力强，来势凶猛，感邪后多呈暴发。

(103~104 题共用备选答案)

A. 眩晕欲仆

B. 目睛上吊

C. 手足蠕动

D. 手足拘挛不伸

E. 咳嗽咽痒

103. 肝阳化风可见

104. 阴虚风动可见

103. A

解析：肝阳化风，指肝阳偏亢，或肝肾阴亏，阴不制阳，致肝阳亢逆无制而动风的病理状态。多由于情志所伤，肝郁化火；或年老肝肾阴亏；或操劳过度等，耗伤肝肾之阴，导致阴虚阳亢，风气内动。常见临床表现：轻者可见筋惕肉瞤、肢麻震颤、眩晕欲仆，或见口眼歪斜、半身不遂。严重者则因血随气升而发卒然仆倒，或为闭证，或为厥证。104. C

解析：阴虚风动，指阴气衰竭，宁静、抑制功能减退而动风的病理状态。多见于热病后期，或由于久病耗伤，阴气和津液大量亏损，阴虚则阳亢，抑制能力减弱，加之筋脉失之滋润，变生内风。临床可见筋挛肉瞤、手足蠕动等动风症状，并见低热起伏、舌光红少苔、脉细如丝等阴气衰少表现。

(105~106 题共用备选答案)

A. 塞因塞用

B. 寒者热之

C. 热因热用

D. 寒因寒用

E. 通因通用

105. 适用于脾虚腹胀的治则治法是

106. 适用于真热假寒证的治则治法是

105. A

解析：塞因塞用，系反治法之一。谓因塞证而用塞法。前塞为塞法，指补养固涩；后塞为塞证，指本虚标实之满胀不通的病证。脾虚需健脾补脾，腹胀为本虚标实，不可破气攻逐，否则更伤脾气，应用塞因塞用之法。

106. D

解析：寒因寒用指治疗内真热而外假寒的方法。病的实质是真热，而表现出假寒的现象，亦即内真热而外假寒，须用寒凉药治疗。

(117~118 题共用备选答案)

A. 胖大舌

B. 瘦薄舌

C. 点刺舌

D. 老舌

E. 强硬舌

117. 气血两虚的舌象是

118. 水湿内停的舌象是

117. B

解析：瘦薄舌：多主气血两虚，阴虚火旺。舌体瘦薄而色淡：多是气血两虚。舌体瘦薄而色红绛干燥：多见于阴虚火旺，津液耗伤。

118. A

解析：胖大舌多主水湿痰饮内停，肿胀舌主心脾热盛、外感湿热。

(119~120 题共用备选答案)

A. 汗出肤冷，倦卧不语，脉虚和缓

B. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉弦而数

C. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉象急数

D. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉虚而缓

E. 汗出肤冷，倦卧不语，脉象细数

119. 战汗后邪退气虚正安的主要表现为

120. 战汗后气脱的主要表现为

119. A

解析：战汗后邪退气虚正安则汗出肤冷，倦卧不语，脉虚和缓。

120. C

解析：战汗后气脱肤冷汗出，躁扰不卧，脉象急数。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 热扰心神
- B. 痰热扰心
- C. 心气不足
- D. 脏气衰微
- E. 宗气大虚

121. 导致自言自语，见人便止，首尾不续的病因是

122. 导致语言时有错乱，语后自知言错的病因是

121. C

解析：独语是指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。属阴证，多因心气不足，神失所养，或气郁生痰，蒙蔽心窍所致，常见于癫病、郁病。

122. C

解析：错语是指神识清楚，语言错乱，语后自知的症状。证有虚实之分，虚证多因心气不足，神失所养所致，多见于久病体虚或老年脏气衰微之人。

(123~124 题共用备选答案)

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰
- C. 心脾两虚
- D. 心阳亏虚
- E. 心脉痹阻

123. 睡眠时时惊醒，不易安卧多见于

124. 不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于

123. B

解析：失眠是阳不入阴，神不守舍的病理表现。虚证多由阴血亏虚，心神失养；或心虚胆怯，神魂不安；或阴虚火旺，内扰心神所致。实证多由火邪、痰热内扰心神，使心神不宁，或食滞内停而致。临床常见有四种类型：（1）不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于心肾不交。（2）睡后易醒，不易再睡多见于心脾两虚。（3）睡眠时时惊醒，不易安卧多见于胆郁痰扰。（4）夜卧不安，腹胀暖气多为食滞内停。

124. A

解析：失眠是阳不入阴，神不守舍的病理表现。虚证多由阴血亏虚，心神失养；或心虚胆怯，神魂不安；或阴虚火旺，内扰心神所致。实证多由火邪、痰热内扰心神，使心神不宁，或食滞内停而致。临床常见有四种类型：（1）不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于心肾不交。（2）睡后易醒，不易再睡多见于心脾两虚。（3）睡眠时时惊醒，不易安卧多见于胆郁痰扰。（4）夜卧不安，腹胀暖气多为食滞内停。

(125~126 题共用备选答案)

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假
- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

125. 麻疹麻毒外透属于

126. 寒包火证属于

125. E

解析：证候转化指疾病在其发展变化过程中，其病位、病性，或邪正盛衰的状态发生变化，由一种证候转化为对立的另一种证候。证候的转化包括表里出入、寒热转化、虚实转化。

126. D

解析：证候错杂是指疾病某一阶段的证候，不仅表现为表里同时受病，而且呈现寒、热、虚、实的性质相反，因而证候显得相互矛盾、错杂。八纲中表里寒热虚实的错杂关系，表现为表里同病、寒热错杂、虚实夹杂，临床辨证应对其进行综合考察。证候间的错杂组合关系有四种情况：第一类是表里同病而寒热虚实性质并无矛盾，如表里实寒证、表里实热证等；第二类是表里同病，且寒热性质相同，但虚实性质相反的证候，如表实寒里虚寒证、表实热里虚热证；第三类是表里同病，且虚实性质相同，但寒热性质相反的证候，有表实寒里实热证，即“寒包火”证；第四类是表里同病，且寒与热、虚与实的性质均相反的证候，除可有表实寒里虚热证外，其余组合临床极少见到。

(127~128 题共用备选答案)

- A. 气不摄血证
- B. 气虚血瘀证

- C. 气血两虚证
- D. 气随血脱证
- E. 气滞血瘀证

127. 症见衄血、面色淡白无华、少气懒言、舌淡白，脉弱属于

128. 症见突然面色苍白、大汗淋漓、脉微欲绝属于

127. A

解析：气不摄血证临床表现：吐血、便血、崩漏、皮下瘀斑、鼻衄，神疲乏力，气短懒言，面色淡白，舌淡，脉弱。

128. D

解析：气随血脱证临床表现为大出血时，突然面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，甚至晕厥，舌淡，脉微欲绝或见芤脉。

(129~130 题共用备选答案)

- A. 肾虚水泛证
- B. 肾阳虚证
- C. 肾阴虚证
- D. 肾精不足证
- E. 肾气不固证

129. 以腰膝酸软，身肿尿少为特征的是

130. 以腰膝酸软，胎动易滑为特征的是

129. A

解析：肾虚水泛证临床表现：腰膝酸软，耳鸣，身体浮肿，腰以下尤甚，按之没指，小便短少，畏冷肢凉，腹部胀满，或见心悸，气短，咳喘痰鸣，舌质淡胖，苔白滑，脉沉迟无力。

130. E

解析：肾气不固证临床表现：腰膝酸软，神疲乏力，耳鸣失聪；小便频数而清，或尿后余沥不尽，或遗尿，或夜尿频多，或小便失禁；男子滑精、早泄；女子月经淋漓不尽，或带下清稀量多，或胎动易滑。舌淡，苔白，脉弱。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 妊娠恶阻，胎动不安证
- B. 妊娠胎漏下血，胎动欲坠
- C. 妊娠胎热，胎动不安证
- D. 妊娠肝肾亏虚，胎动不安证
- E. 妊娠脾虚气弱，胎动不安证

131. 白术的主治病证是

132. 桑寄生的主治病证是

131. E

解析：白术可主治脾虚胎动不安。常与砂仁同用。

132. D

解析：桑寄生可治肝肾虚损所致的胎动不安，多与艾叶、阿胶、杜仲等配伍，如寿胎丸。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛
- B. 开窍醒神，清热止痛
- C. 开窍醒神，清心化痰
- D. 开窍醒神，化湿和胃，宁神益智
- E. 开窍醒神，辟秽止痛

133. 苏合香的功效是

134. 冰片的功效是

133. E

解析：苏合香功效：开窍醒神，辟秽，止痛。

134. B

解析：冰片功效：开窍醒神，清热止痛。

(135~136 题共用备选答案)

- A. 金樱子
- B. 覆盆子
- C. 桑螵蛸
- D. 鸡内金
- E. 海螵蛸

135. 既能固精止带，又能收敛止血的药物是

136. 既能固精缩尿，又能涩肠止泻的药物是

135. E

解析：海螵蛸功效：固精止带，收敛止血，制酸止痛，收湿敛疮。

136. A

解析：金樱子功效：固精缩尿止带，涩肠止泻。

(137~138 题共用备选答案)

- A. 芡实
- B. 赤石脂
- C. 莲子
- D. 浮小麦
- E. 肉豆蔻

137. 可以治疗自汗盗汗，骨蒸劳热的药物是

138. 可以治疗虚寒气滞，久泻不止的药物是
137. D

解析：浮小麦功效：固表止汗，益气，除热。

138. E

解析：肉豆蔻功效：涩肠止泻，温中行气。主治病证：虚泻，冷痢；胃寒胀痛，食少呕吐。

（139~140 题共用备选答案）

- A. 既能收敛固涩，又能补肾宁心
- B. 既能敛肺止咳，又能生津安蛔
- C. 既能敛肺止咳，又能固精缩尿
- D. 既能敛肺止咳，又能收敛止血
- E. 既能敛肺止咳，又能利咽开音

139. 五味子的功效是

140. 诃子的功效是

139. A

解析：五味子功效：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

140. E

解析：诃子功效：涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。

（141~142 题共用备选答案）

- A. 太子参
- B. 白术
- C. 山药
- D. 人参
- E. 甘草

141. 治疗脾虚水肿宜选用的药物是

142. 治疗心气虚、脉结代，宜选用的药物是

141. B

解析：白术功效：健脾益气，燥湿利尿，止汗，安胎。为补气健脾要药，被前人誉为“脾脏补气健脾第一要药”。

142. E

解析：甘草主治心气不足，脉结代，心动悸。有补益心气、益气复脉之功，常配伍人参、阿胶、桂枝等，如炙甘草汤。

（143~144 题共用备选答案）

- A. 滋补肝肾，养胃生津
- B. 补脾益气，养胃生津
- C. 滋阴除烦，养胃生津
- D. 养阴润燥，清肺生津

E. 清肺养阴，益胃生津

143. 北沙参的功效是

144. 天冬的功效是

143. E

解析：北沙参功效：养阴清肺，益胃生津。

144. D

解析：天冬功效：养阴润燥，清肺生津。

（145~146 题共用备选答案）

- A. 龟板
- B. 龙骨
- C. 鳖甲
- D. 牡蛎
- E. 代赭石

145. 功效为平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩的药物是

146. 功效为滋阴潜阳，软坚散结，善于治疗阴虚风动的药物是

145. D

解析：牡蛎功效：重镇安神，平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩。

146. C

解析：鳖甲功效：滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。应用：（1）肝肾阴虚证。本品滋养之力不及龟甲，长于退虚热、除骨蒸。用于治热病后期，阴伤虚风内动，脉细数、舌干齿黑、手指蠕动，可配伍牡蛎、生地、阿胶；用于阴虚发热，治热病伤阴而致夜热早凉、形瘦、脉数、舌红少苔，可配伍青蒿、生地、丹皮、知母；治骨蒸劳热，可配伍银柴胡、地骨皮、青蒿、知母等。（2）癥瘕积聚。本品味咸，还长于软坚散结。治久疟、疟母致肝脾肿大、肋肋疼痛，可配伍柴胡、土鳖虫、丹皮等。

（147~148 题共用备选答案）

- A. 胃热呕吐
- B. 气逆呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 胃寒呕吐
- E. 食滞内停呕吐

147. 竹茹可以治疗的病证是

148. 旋覆花可以治疗的病证是

147. A

解析：竹茹主治：肺热咳嗽，痰热心烦不寐；胃热呕吐，妊娠恶阻；吐血、衄血、崩漏。

148. B

解析：旋覆花功效：降气化痰，降逆止呕。
主治病证：咳嗽痰多，痰饮蓄结，胸膈痞满；噎气，呕吐。

（149~150 题共用备选答案）

- A. 风湿痹痛
- B. 湿热黄疸
- C. 血虚失眠
- D. 肾虚腰痛
- E. 肠燥便秘

149. 川芎可用于治疗的病证是

150. 郁金可用于治疗的病证是

149. A

解析：川芎主治：头痛，风湿痹痛。本品能“上行头目”，为治头痛要药，前人有“头痛不离川芎”之说。治头痛，无论风寒、风热、风湿、血虚、血瘀均可随证配伍用之。本品辛散温通，能祛风通络止痛，可用治风湿痹痛。

150. B

解析：郁金主治：（1）气滞血瘀痛证。（2）热病神昏，癫病痰闭。（3）吐血，衄血，倒经，尿血，血淋。（4）肝胆湿热黄疸、胆石症。

第二单元

A1

1. 桂枝汤中外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的配伍是

- A. 桂枝与生姜
- B. 桂枝与芍药
- C. 大枣与甘草
- D. 生姜与甘草
- E. 芍药与大枣

1. B

解析：桂枝汤中桂枝与芍药用量相等（1:1），寓意有三：一为针对营卫失调病机，体现营卫同治，祛邪扶正，邪正兼顾之意；二为相辅相成，桂枝得芍药相助则汗出有源，芍药

得桂枝相助则滋而能化；三为相制相成，散中有收，汗中寓补。桂枝与芍药配伍是本方外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的基本结构。

2. 败毒散中配伍人参的主要用意是

- A. 大补肺脾，以复正气
- B. 补脾益肺，培土生金
- C. 扶助正气，鼓邪外出
- D. 益气生津，以资汗源
- E. 益气和胃，温阳止痹

2. C

解析：败毒散以人参为佐药，益气扶正。一来助正气以鼓邪外出；二来令全方散中有补，不致耗伤真元。

3. 银翘散中体现去其性而取其用之法的配伍是

- A. 银花、连翘
- B. 芦根、芥穗
- C. 竹叶、薄荷
- D. 牛蒡子、苦桔梗
- E. 荆芥穗、淡豆豉

3. E

解析：银翘散中用荆芥穗与淡豆豉，解表散邪。二药虽属辛温，但辛而不烈，温而不燥，配入辛凉解表方中，增强了辛散透表之力，是去其性而取其用之法。

4. 功用为透邪解郁，疏肝理脾的方剂是

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 达原饮
- D. 痛泻要方
- E. 大柴胡汤

4. A

解析：四逆散的功用为透邪解郁、疏肝理脾。

5. 麻子仁丸的组成药物中不含

- A. 大黄
- B. 枳实
- C. 当归
- D. 杏仁
- E. 芍药

5. C

解析：麻子仁丸的组成为麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁。方歌：麻子仁丸治

脾约，枳朴大黄麻杏芍；胃燥津枯便难解，润肠泻热功确凿。

6. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- D. 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
- E. 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣

6. E

解析：半夏泻心汤组成为半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。方歌：半夏泻心黄连芩，干姜草枣人参行；辛开苦降消痞满，治在调阳与和阴。小柴胡汤组成是柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏、生姜、大枣。方歌：小柴胡汤和解功，半夏人参甘草从；更加黄芩生姜枣，少阳为病此方宗。二方共有的药物包括半夏、黄芩、人参、大枣和炙甘草。

7. 大建中汤和小建中汤二方组成中均含有的药物是

- A. 附子
- B. 饴糖
- C. 干姜
- D. 人参
- E. 蜀椒

7. B

解析：大建中汤的组成是蜀椒、干姜、人参、胶饴。方歌：大建中汤建中阳，蜀椒干姜参饴糖；阴盛阳虚腹冷痛，温补中焦止痛强。小建中汤组成是桂枝、炙甘草、大枣、芍药、生姜、胶饴。方歌：小建中汤芍药多，桂枝甘草姜枣和；更加饴糖补中脏，虚劳腹痛服之瘥。

8. 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是

- A. 熟地 鹿角霜 炮姜 桂枝 甘草
- B. 生地 真阿胶 姜炭 桂枝 细辛
- C. 熟地 鹿角胶 姜炭 肉桂 甘草
- D. 熟地 龟板胶 干姜 肉桂 川芎
- E. 熟地 鹿角胶 炮姜 细辛 甘草

8. C

解析：阳和汤的组成是熟地、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜炭。方歌：阳

和汤法治阴疽，贴骨流注鹤膝风；熟地鹿胶桂姜炭，麻黄白芥甘草从。

9. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是

- A. 当归
- B. 附子
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 甘草

9. E

解析：四逆汤组成为炙甘草、干姜、生附子。方歌：四逆汤中附草姜，四肢厥逆急煎尝；脉微吐利阴寒盛，救逆回阳赖此方。当归四逆汤组成为当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、通草、大枣。方歌：当归四逆芍桂枝，细辛甘草木通施；血虚寒厥四末冷，温经通脉最相宜。

10. 防风通圣散的功用是

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 疏风解表，清热通便
- C. 和解少阳，内泻结热
- D. 辛凉宣肺，清热平喘
- E. 解表散寒，温肺化饮

10. B

解析：防风通圣散主治风热壅盛、表里俱实证，以疏风解表，泻热通便为功。

11. 酸枣仁汤的组成药物中含有

- A. 远志
- B. 知母
- C. 茯苓
- D. 柏子仁
- E. 龙眼肉

11. B

解析：酸枣仁汤的组成是炒酸枣仁、甘草、知母、茯苓、川芎。方歌：酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎；养血除烦清内热，安然入睡梦乡甜。

12. 以镇心安神，清热养血为主要功用的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 酸枣仁汤
- C. 天王补心丹
- D. 当归六黄汤
- E. 朱砂安神丸

12. E

解析：朱砂安神丸镇心安神、清热养血，主治心火亢盛、阴血不足证。

B 左归丸组成中含有而右归丸组成中不含有的药物是

- A. 枸杞子
- B. 龟板胶
- C. 鹿角胶
- D. 山茱萸
- E. 菟丝子

13. B

解析：左归丸组成是怀熟地、炒山药、枸杞、山茱萸、川牛膝、鹿角胶、龟板胶、菟丝子。方歌：左归丸内山药地，萸肉枸杞与牛膝；菟丝龟鹿二胶合，壮水之主第一方。右归丸组成是熟地黄、山药、山茱萸、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、杜仲、肉桂、当归、制附子。方歌：右归丸中地附桂，山药萸萸菟丝归；杜仲鹿胶枸杞子，益火之源此方魁。

M 暖肝煎中配伍当归的用意是

- A. 养血润燥
- B. 化瘀生新
- C. 补血和营
- D. 养血补肝
- E. 下气止逆

14. D

解析：当归甘、辛、温，归肝、心、脾经，长于补血，是补血之圣药，暖肝煎中配伍当归有养血补肝之效。

B 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是

- A. 温阳散寒
- B. 温肾纳气
- C. 温通经脉
- D. 鼓舞气血
- E. 散寒止痛

15. B

解析：苏子降气汤中，肉桂辛甘大热，温肾，纳气平喘，以治下虚，同时配合当归增强温养下元之效。

16 下列各项中，不属于独活寄生汤组成药物的是

- A. 杜仲、牛膝、肉桂
- B. 白术、羌活、苍术
- C. 细辛、防风、秦艽

D. 川芎、当归、生地

E. 人参、芍药、甘草

16. B

解析：独活寄生汤的组成是独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。方歌：独活寄生艽防辛，芎归地芍桂苓均；杜仲牛膝人参草，风湿顽痹屈能伸。

17. 主治下焦虚寒之膏淋、白浊的方剂为

- A. 茵陈蒿汤
- B. 萆薢分清饮
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 甘露消毒丹
- E. 三仁汤

答案：B

解析：萆薢分清饮主治：下焦虚寒之膏淋、白浊。小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。

18. 川芎茶调散的组成药物中含有

- A. 牛蒡
- B. 羌活
- C. 苍术
- D. 当归
- E. 蝉蜕

18. B

解析：川芎茶调散的组成是川芎、荆芥、白芷、羌活、炙甘草、细辛、防风、薄荷叶、清茶。方歌：川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌；目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉能康。

19. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是

- A. 杏苏散
- B. 增液汤
- C. 桑杏汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 清燥救肺汤

19. C

解析：桑杏汤功擅清宣温燥、润肺止咳，主治外感温燥证。

20 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A. 白术、茯苓
- B. 泽泻、猪苓
- C. 滑石、甘草

- D. 茯苓、桂枝
- E. 滑石、阿胶

20. B

解析：猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。方歌：猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添；利水育阴兼泻热，溺秘心烦呕渴痊。五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。方歌：五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓；桂枝温通助气化，利便解表烦渴清。

21. 对肺炎链球菌肺炎诊断价值大的是

- A. 起病急，有寒战、高热、胸痛、咳嗽
- B. 血白细胞总数升高
- C. 痰涂片或培养有肺炎球菌
- D. 局部出现明显的湿啰音
- E. X 线检查呈肺叶分布的密度均匀影

21. C

解析：肺炎链球菌肺炎确诊有赖于病原菌检查。痰直接涂片发现典型的革兰染色阳性、带荚膜的球菌，即可初步作出病原学诊断。痰培养 24~48 小时可以确定病原体。22. COPD 急性加重期的重要治疗措施是

- A. 止咳、祛痰
- B. 解痉、平喘
- C. 控制感染
- D. 避免及减少各种诱因
- E. 抗过敏

22. C

解析：细菌感染是导致 COPD 急性加重最重要的原因，所以控制感染是 COPD 急性加重期的重要治疗措施。

23. 二尖瓣关闭不全的体征，说法不正确的是

- A. 心尖搏动增强呈抬举性
- B. 偶可触及收缩期震颤
- C. 心浊音界向左下扩大
- D. 心尖区可闻及吹风样杂音
- E. 心浊音界向左扩大，心腰消失而呈梨形心

23. E

解析：二尖瓣关闭不全的体征：①视诊：心尖搏动增强呈抬举性，向左下移位，范围增大；②触诊：偶可触及收缩期震颤；③叩诊：心浊音界向左下扩大；④听诊：心尖区可闻

及响亮、粗糙、音调较高的 3/6 级或以上的全收缩期吹风样杂音，常向左腋下、左肩胛下部传导，吸气时减弱、呼气时增强，杂音常掩盖第一心音，肺动脉瓣区第二心音正常或亢进、分裂。因舒张期大量血液流入左心室，心尖区常有第三心音出现。E 属于二尖瓣狭窄的体征。

24. 心绞痛发作的典型部位是

- A. 胸骨下段后
- B. 剑突下
- C. 胸骨上中段之后
- D. 心尖部
- E. 心前区向颈咽部放射

24. C

解析：心绞痛发作的典型部位：在胸骨体上段或中段之后，可放射至肩、左臂内侧甚至达无名指和小指，边界模糊，范围约一个手掌大小。

25. 查体闻及“大炮音”，患者最可能发生的心律失常是

- A. 二度房室传导阻滞
- B. 三度房室传导阻滞
- C. 窦房传导阻滞
- D. 窦性停搏
- E. 一度房室传导阻滞

25. B

解析：三度房室传导阻滞时，间或听到心房音或响亮的第二心音，为心房、心室几乎同时收缩所致，称为“大炮音”音。

26. 心绞痛发作时心电图 ST 段抬高可能是

- A. 变异型心绞痛
- B. 卧位型心绞痛
- C. 劳累性心绞痛
- D. 稳定型心绞痛
- E. 恶化型心绞痛

26. A

解析：超过 95% 的患者心绞痛发作时，出现相应导联 ST 段水平型下移和（或）T 波倒置。如果出现相关导联 ST 段呈弓背向上抬高，则说明是变异型心绞痛。

27. 支气管哮喘的典型表现主要是

- A. 先兆症状后出现吸气困难
- B. 发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- C. 伴哮鸣音的混合性呼吸困难

- D. 伴哮鸣音的呼吸困难，粉红色泡沫痰
E. 哮喘发作 24 小时以上，伴咯血

27. B

解析：支气管哮喘的典型表现：主要为发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难。

28. 肝硬化最常见的并发症是

- A. 自发性腹膜炎
B. 肝肺综合征
C. 急性上消化道出血
D. 肝性脑病
E. 肝肾综合征

28. C

解析：肝硬化并发症中，急性上消化道出血最常见，是主要死因。表现为呕血与黑便，大量出血可引起出血性休克，并诱发腹水和肝性脑病。

29. 不属溃疡性结肠炎主要临床表现的是

- A. 里急后重
B. 腹部包块
C. 腹痛
D. 腹泻
E. 黏液脓血便

29. B

解析：溃疡性结肠炎的消化系统表现：1. 腹泻 为最主要的症状，常反复发作或持续不愈，轻者每天排便 2~4 次，便血轻或无。重者排便频繁，脓血显见，甚至大量便血。黏液血便是本病活动期的重要表现。病变局限在直肠者，鲜血附于粪便表面；病变扩展至直肠以上者，血液混于粪便中。病变累及直肠时，可有里急后重。2. 腹痛 轻型患者在病变缓解期可无腹痛，或仅有腹部不适，部位多在左下或下腹部，亦可涉及全腹，有疼痛→便意→排便→缓解的规律。3. 体征 轻中型患者仅左下腹部压痛，有些患者可触及呈管状的乙状结肠。若有腹肌紧张、反跳痛、肠鸣音减弱，应警惕结肠扩张、肠穿孔等并发症。

30. 慢性胃炎最主要的病因是

- A. 饮食因素
B. 幽门螺杆菌感染
C. 自身免疫反应
D. 十二指肠液反流
E. 遗传因素

30. B

解析：幽门螺杆菌（Hp）感染，是慢性胃炎最主要的病因。

31. 慢性肾衰竭时常有的水与电解质紊乱表现是

- A. 代谢性酸中毒，高钾和低镁血症
B. 代谢性酸中毒，失水和低钠、低钾血症
C. 代谢性酸中毒，低血磷和低钙血症
D. 代谢性碱中毒，低钾和低氮血症
E. 代谢性酸中毒，高磷和低钙血症

31. E

解析：慢性肾衰竭时水、电解质及酸碱平衡紊乱：（1）代谢性酸中毒 食欲不振、呕吐、乏力、反应迟钝、呼吸深大，甚至昏迷。酸中毒可加重高钾血症。（2）水钠代谢紊乱 不同程度的皮下水肿和 / 或体腔积液，也可出现低血压和休克。（3）钾代谢紊乱 易出现或加重高钾血症。在无尿患者，更应警惕高钾血症的出现。进食不足或伴随呕吐、腹泻时，应警惕低钾血症的发生。（4）钙、磷代谢紊乱 主要表现为低钙血症和高磷血症。（5）镁代谢紊乱 有轻度高镁血症，多无任何症状。

32. 关于急性肾盂肾炎临床表现。说法错误的是

- A. 肉眼血尿
B. 贫血
C. 畏寒、发热
D. 尿频、尿急、尿痛
E. 腰痛

32. B

解析：急性肾盂肾炎临床表现有：①泌尿系统症状：膀胱刺激征、腰痛和（或）下腹部痛、肋脊角及输尿管点压痛、肾区压痛和叩击痛；腰痛程度不一，多为钝痛、酸痛；②全身感染症状：寒战、发热、头痛、恶心呕吐、食欲不振等，体温多在 38℃~39℃，常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。少数患者可出现肉眼血尿。

33. 急性型特发性血小板减少性紫癜的特点是

- A. 多见于女性
B. 无感染病史
C. 多数病程迁延

- D. 骨髓幼稚型巨核细胞增多
E. 多见于成人

33. D

解析：急性型特发性血小板减少性紫癜，以儿童为多见，男女发病率相近。多在发病前1~2周有上呼吸道感染史。起病急骤，可有发热、畏寒，广泛、严重的皮肤黏膜出血或血肿。皮肤瘀点一般先出现于四肢，尤以下肢为多，分布不匀。黏膜出血多见于鼻、牙龈、口腔及舌。胃肠道与泌尿道出血亦多见，偶因视网膜出血而失明。颅内出血是本病致死的主要原因。急性型往往呈自限性；或经积极治疗，常在数周内逐渐恢复或痊愈。少数患者可迁延半年以上，亦可演变为慢性。34. 不属类风湿关节炎关节外表现的是

- A. 类风湿结节
B. 周围神经病变
C. 贫血
D. 肺间质病变
E. 心脏瓣膜病变

34. E

解析：类风湿关节炎关节外表现中，心脏相关病变为：心包炎、心肌炎和心内膜炎。不涉及心脏瓣膜病变。

35. 甲亢时最常见的心律失常类型是

- A. 心房颤动
B. 房室传导阻滞
C. 室性早搏
D. 房性心动过速
E. 交界性早搏

35. A

解析：甲亢时心律失常，以心房颤动、房性早搏等房性心律失常多见。

36. 属感染性发热的疾病是

- A. 风湿热
B. 广泛性皮炎
C. 肝癌
D. 斑疹伤寒
E. 白血病

36. D

解析：斑疹伤寒属感染性发热。

37. 急性心梗患者常有发热，其主要机制是

- A. 变态反应
B. 代谢障碍

- C. 体温调节中枢失常
D. 神经功能障碍

E. 吸收热

37. E

解析：无菌性坏死物质的吸收所致的发热有大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。所以说急性心梗患者发热的主要机制是由于无菌性坏死物质的吸收所造成的。

38. 在非感染性发热中，属抗原-抗体反应性疾病的是

- A. 血清病
B. 中暑
C. 重度安眠药中毒
D. 大面积烧伤
E. 急性心肌梗死

38. A

解析：非感染性发热。（1）无菌性坏死物质吸收 如大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。（2）抗原-抗体反应 如风湿热、血清病、药物热、结缔组织疾病等。（3）内分泌与代谢障碍 如甲亢、大量脱水等。

（4）皮肤散热减少 如广泛性皮炎、鱼鳞癣、慢性心功能不全等。（5）体温调节中枢功能失常 如脑出血、脑外伤、中暑、安眠药中毒等直接损害体温调节中枢，使其功能失常而发热。（6）自主神经功能紊乱 影响到体温调节过程，使产热大于散热，属功能性发热，多为低热。

39. 发热10天，每天体温最高达39.6℃~40.1℃，最低37.6℃，试问该热型属于

- A. 波状热
B. 稽留热
C. 弛张热
D. 不规则热
E. 间歇热

39. C

解析：弛张热：体温在39℃以上，但波动幅度大，24小时内体温差达2℃以上，最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

40. 吸气性呼吸困难表现为

- A. 明显的哮鸣音

- B. 深大呼吸
- C. 桶状胸
- D. 三凹征
- E. 胸部一侧呼吸减弱

40. D

解析：吸气性呼吸困难：表现为胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显凹陷，称为“三凹征”，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。见于急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌、气管异物、支气管肿瘤或气管受压等。

41. 反复发作的呼气性呼吸困难，主要见于
- A. 气道异物
 - B. 支气管哮喘
 - C. 大叶性肺炎
 - D. 肺不张
 - E. 气胸

41. B

解析：呼气性呼吸困难：呼气显著费力，呼气时间延长而缓慢，伴有广泛哮鸣音。常见于支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。

42. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

- A. 呼气费力
- B. 吸气和呼气均感费力
- C. 呼吸浅快
- D. 吸气费力
- E. 呼吸深慢

42. A

解析：呼气性呼吸困难：呼气显著费力，呼气时间延长而缓慢，伴有广泛哮鸣音。常见于支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。

43. 肾源性水肿常见于

- A. 肝硬化
- B. 各型肾炎
- C. 右心衰竭
- D. 低蛋白血症
- E. 妊娠高血压综合征

43. B

解析：肾源性水肿：多由各种肾炎、肾病综合征等引起。

44. 下列可以表现为局部性水肿的是

- A. 创伤

- B. 丝虫病
- C. 局部炎症
- D. 血栓性静脉炎
- E. 以上都是

44. E

解析：局部性水肿见于各种组织炎症、静脉阻塞（静脉血栓形成、静脉炎等）、淋巴回流受阻（丝虫病、淋巴管炎、肿瘤压迫等）及血管神经性水肿。

45. 幽门梗阻时，呕吐物多为

- A. 咖啡色
- B. 黄绿色稀薄液
- C. 含血液
- D. 隔日食物
- E. 大量黏液

45. D

解析：呕吐隔夜或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。

46. 关于腹痛部位，下列叙述正确的是

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

46. B

解析：腹痛的部位：如胃、十二指肠疾病、急性胰腺炎疼痛多在中上腹部；肝、胆疾患疼痛位于右上腹；急性阑尾炎早期疼痛在脐周或上腹部，数小时后转移至右下腹；小肠绞痛位于脐周；结肠疾病疼痛多位于下腹或左下腹；膀胱炎、盆腔炎症及异位妊娠破裂引起的疼痛在下腹部；空腔脏器穿孔后引起弥漫性腹膜炎则为全腹痛；结核性腹膜炎、腹膜转移癌、腹膜粘连等腹痛呈弥漫性与不定位性。

47. 关于黄疸的特点，下列说法正确的是

- A. 溶血性黄疸以非结合胆红素增多为主
- B. 肝细胞性黄疸尿胆红素阴性
- C. 胆汁淤积性黄疸尿胆原增多
- D. 肝细胞性黄疸尿胆原减少
- E. 胆汁淤积性黄疸尿胆红素阴性

47. A

解析：溶血性黄疸实验室检查以非结合胆红素增多为主，结合胆红素一般正常。肝细胞

性黄疸实验室检查示血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原增多，尿胆红素阳性。胆汁淤积性黄疸实验室检查示血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。

48. 下列不属于个人史的是

- A. 社会经历
- B. 习惯与嗜好
- C. 冶游史
- D. 职业和生活条件
- E. 生育史

48. E

解析：个人史包括以下几个方面：①出生地及居住地：注意出生地及居住地区与某种传染病或地方病的关系。②生活与饮食习惯。③过去及现在的职业及工种。④冶游及性病史。

49. 下列不符合心包摩擦音特点的是

- A. 收缩期及舒张期均可听到
- B. 通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到
- C. 将听诊器胸件向胸部加压时，可使摩擦音增强
- D. 屏住呼吸时摩擦音消失
- E. 病人采取坐位稍前倾时，易于听到

49. D

解析：心包摩擦音听诊：在胸骨左缘第 3、4 肋间处较易听到，病人坐位稍前倾，深呼吸后屏住呼吸时易于听到，见于急性心包炎。

50. 高钾血症见于

- A. 肺心病
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 以上均不是

50. C

解析：高钾血症见于：①排出减少：如急性或慢性肾衰竭少尿期、肾上腺皮质功能减退症。②摄入过多：如高钾饮食、静脉输注大量钾盐、输入大量库存血液。③细胞内钾外移增多：如严重溶血、大面积烧伤、挤压综合征、组织缺氧和代谢性酸中毒等。

51. 突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气，急查心电图见各导联 ST 段均呈水平型下移达

0.1mV，伴有 T 波倒置，以往心电图正常。

最可能的诊断是

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性心肌梗死
- C. 典型心绞痛发作
- D. 陈旧性心肌梗死
- E. 左心室劳损

51. C

解析：典型心绞痛：面对缺血区的导联上出现 S-T 段水平型或下垂型下移 $\geq 0.1\text{mV}$ ，T 波低平、双向或倒置，时间一般小于 15 分钟。

52. 不属确立诊断的步骤及原则的是

- A. 调查研究
- B. 搜集资料
- C. 综合分析
- D. 患者签名
- E. 初步诊断

52. D

解析：建立正确的诊断，一般要经过“调查研究、搜集资料”，“综合分析、初步诊断”和“反复实践、验证诊断”3 个步骤。

53. 叩诊肝浊音界下移见于

- A. 右肺纤维化
- B. 胃肠穿孔
- C. 气腹
- D. 腹胀
- E. 右侧张力性气胸

53. E

解析：肝浊音界向上移位见于右肺不张、气腹及鼓肠等；肝浊音界向下移位见于肺气肿、右侧张力性气胸等。

54. 尿中不会出现管型的疾病是

- A. 慢性肾炎
- B. 肾盂肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 狼疮性肾炎
- E. 急性膀胱炎

54. E

解析：管型：（1）透明管型 偶见于健康人；少量出现见于剧烈运动、高热等；明显增多提示肾实质病变，如肾病综合征、慢性肾炎等。（2）细胞管型：1）红细胞管型 见于急性肾炎、慢性肾炎急性发作、狼疮性肾

炎、肾移植术后急性排斥反应等。2) 白细胞管型提示肾实质感染性疾病, 见于肾盂肾炎、间质性肾炎。3) 肾小管上皮细胞管型提示肾小管病变, 见于急性肾小管坏死、慢性肾炎晚期、肾病综合征等。

55. 高热 3 天, 体温 39.9℃, 胸痛, 咳嗽, 咯痰。胸片显示肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈大叶性分布, 在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影。考虑是

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 右上肺不张
- D. 肺结核
- E. 中心性肺癌

55. A

解析: 大叶性肺炎: 充血期 X 线无明显变化, 或仅可见肺纹理增粗; 实变期肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈肺段性 or 大叶性分布, 在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影, 即支气管充气征。消散期 X 线可见实变区密度逐渐减退, 表现为散在性的斑片状影, 大小不等, 继而可见到增粗的肺纹理, 最后可完全恢复正常。CT 在充血期即可见病变区磨玻璃样阴影, 边缘模糊。实变期可见呈肺段性 or 大叶性分布的密实阴影, 支气管充气征较 X 线检查更为清楚。

56. 对医学道德的认识不正确的是

- A. 医务人员容易理解、接受
- B. 人道主义精神的集中体现
- C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
- D. 在内容上具有稳定性、连续性
- E. 在形式上比较具体、生动

56. C

解析: 医学道德是社会一般道德在医学领域中的具体表达, 是医务人员自身的道德品质和调节医务人员与病人、他人、集体及社会之间关系的行为准则、规范的总和, 而不单单是存在于从事医生职业活动的人们中间, 故 C 选项不正确。

57. 医务人员对患者诚信、宽厚, 潜心医学事业, 对医学科学忠诚, 体现了

- A. 仁爱

B. 严谨

C. 诚挚

D. 公正

E. 奉献

57. C

解析: 医德品质中诚挚, 表现在医生忠诚医学科学、潜心医学事业, 对患者讲诚信, 具有宽厚、诚挚的人格品德。

58. 生命质量论的伦理意义在于

- A. 有利于提高人口素质
- B. 有利于控制人口增长
- C. 有利于人类自我认识的飞跃
- D. 为医务人员对不同生命质量人群采取相应的治疗原则、方法和手段提供了理论依据
- E. 以上皆是

58. E

解析: 生命质量论有利于提高人口素质; 有利于控制人口增长; 有利于人类自我认识的飞跃。为医务人员对某些不同生命质量的病人, 采取相应的治疗原则、方法和手段提供了理论依据, 对于合理、公正地分配卫生资源也具有十分重要的意义。

59. 患者的基本权利不包括

- A. 基本医疗权
- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 自主决定权
- E. 社会免责权

59. D

解析: 综合国内外关于病人权利方面的研究成果并根据我国国情, 可将患者的基本权利归纳为以下几个方面: ①基本医疗权; ②疾病认知权; ③知情同意权; ④保护隐私权; ⑤社会免责权; ⑥经济索赔权。

60. 人体实验类型中, 无需承担道德代价的是

- A. 天然实验
- B. 自愿实验
- C. 欺骗实验
- D. 强迫实验
- E. 自我实验

60. A

解析: 天然实验是不受研究者控制的, 在天然条件下 (如战争、旱灾、水灾、地震以及

疾病高发区等)下的人体实验。这种实验的开始、发展、结束都是自然演进的结果,与研究者的意志无关,所以这种研究是没有道德代价的。志愿实验和自我实验都属于自愿实验,出于医学目的,因受试者本人存在一定的社会目的、健康目的或者经济利益目的,可能承担道德代价。欺骗实验,是对一些风险较大的人体实验,实验者对受试者告知的实验信息不准确,或者采用蒙骗手段使受试者受试。强迫实验,是指在一定的军事、政治或行政组织的强大压力下,强迫受试者进行的人体实验。

61. 国家卫生部关于《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》的制定时间是

- A. 1990 年
- B. 1995 年
- C. 2000 年
- D. 2003 年
- E. 2005 年

61. D

解析:卫生部于 2003 年颁布《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》。

A2

62. 患者,女,38 岁,脘腹绵绵作痛,喜温喜按,呕吐便溏,脘痞食少,畏寒肢冷,口不渴,舌淡苔白润,脉沉细。治宜选用 A. 小建中汤

- B. 吴茱萸汤
- C. 参苍白术散
- D. 补中益气汤
- E. 理中丸

62. E

解析:理中丸由人参、干姜、甘草、白术组成,有湿中祛寒,补气健脾的功用,治疗中焦虚寒;阳虚失血和小儿慢惊等,方中干姜为君,人参大补元气为臣,其他为佐使。

63. 患者,男,58 岁,近日生气后胸膈痞闷,脘腹胀痛,暖腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消,治疗应首选

- A. 藿香正气散
- B. 平胃散
- C. 半夏厚朴汤

D. 半夏泻心汤

E. 越鞠丸

63. E

解析:越鞠丸由苍术、香附、川芎、神曲、梔子组成,有行气解郁的功用,治疗气郁所致的胸膈痞闷,脘腹胀满,暖腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消等病证。本方重于行气解郁,气机流畅,则痰、火、湿、食诸郁自解。香附行气解郁为君,以治气郁,川芎治血郁,梔子治火郁,苍术治疗湿郁,神曲治食郁,均为辅助药物。

64. 患者素有水饮,复感风寒,水寒相搏,以致肺寒气逆,喘咳痰多而稀,恶寒发热无汗,面部与四肢浮肿,身体重痛,舌苔白滑,脉浮。治疗应选用

- A. 小青龙汤
- B. 五苓散
- C. 苓桂术甘汤
- D. 麻黄汤
- E. 藿香正气散

64. A

解析:小青龙汤由麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、半夏、五味子组成,有解表蠲饮,止咳平喘的功用,用于治疗风寒客表,水饮内停的病证,方中麻黄、桂枝为君,干姜、细辛为臣,五味子、芍药和半夏为佐,五味子和芍药既可防治温燥伤津,又可防止耗伤肺气,炙甘草兼佐、使之用。

65. 患者,男,48 岁。近日寒热如疟,寒轻热重,口苦膈闷,吐酸苦水,或呕黄涎而粘,舌红苔白腻,脉弦滑数。治疗应首选

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 半夏泻心汤
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 逍遥散

65. D

解析:蒿芩清胆汤由青蒿、竹茹、半夏、茯苓、黄芩、枳壳、陈皮、碧玉散组成,有清利湿,和胃化痰的功用,治疗寒热如疟,汗轻热重,方中青蒿、黄芩并为君药,竹茹、半夏消化痰热,陈皮、枳壳和胃降逆,并为臣药,茯苓、碧玉散清利湿热,作为佐药。

66. 张某, 60 岁, 干咳、胸痛、发热、消瘦 1 个月, 经检查诊断为小细胞肺癌, 其治疗首选

- A. 化疗
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 干扰素
- E. 集落刺激因子

66. A

解析: 小细胞肺癌发现时多已转移, 难以通过外科手术根治, 主要依赖化疗或放、化疗综合治疗。

67. 女性, 26 岁, 支气管哮喘病史 13 年, 今晨上班途中因吸入汽车尾气突然发作, 以喘憋、呼吸困难为主, 伴心悸、乏力, 遂急诊, 为控制发作应首选的药物是

- A. 沙丁胺醇气雾剂
- B. 溴化异丙托品气雾剂
- C. 泼尼松口服
- D. 色甘酸钠 E.

茶碱缓释片答

案: A

解析: 患者病情危急, 需要首先缓解哮喘症状。

β_2 受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。常选用短效-速效 β_2 受体激动剂如沙丁胺醇。

68. 患者节律性上腹痛伴有恶心、呕吐、反酸等, 胃镜检查诊断为胃溃疡, 提示处于活动期的内镜下表现是

- A. 溃疡基底部有白色厚苔
- B. 溃疡表浅苔变薄
- C. 黏膜皱襞向溃疡集中
- D. 溃疡基底部呈现红色瘢痕
- E. 溃疡基底部呈现白色瘢痕

68. A

解析: 胃溃疡活动期的表现: 病灶多呈圆形或椭圆形, 溃疡基底部覆有白色或黄白色厚苔, 周围黏膜充血、水肿。

69. 男性, 52 岁, 胃溃疡病史 10 年, 近 1 个月来疼痛的节律性消失, 食欲减退, 体重减轻, 粪便隐血试验持续(+++), 应首先考虑的诊断是

- A. Hp 感染
- B. 消化道出血

- C. 癌变
- D. 慢性穿孔
- E. 幽门梗阻

69. C

解析: 粪便隐血试验呈阳性, 提示溃疡活动。粪便隐血持续阳性者, 应怀疑癌变的可能性。

70. 男性, 37 岁, 十二指肠溃疡病史 6 年余, 近日劳累后频发上腹疼痛, 食欲不振, 乏力, 2 小时前突感恶心, 随后呕吐暗红色血性液体, 量较大而急诊, 应立即应用的止血药物是

- A. 止血环酸 B.
- 垂体后叶素 C.
- 安络血

D. 奥美拉唑 E.

血小板悬液答

案: D

解析: 消化性溃疡患者胃内 pH 值下降可抑制血小板聚集, 使形成的血栓溶解, 并抑制凝血酶活性, 不利于止血。故提高胃内 pH 值, 有利于止血。静脉使用抑制胃酸分泌的药物如西咪替丁、雷尼替丁或质子泵抑制剂奥美拉唑等, 升高胃内 pH 值, 可有效止血。故此题选 D。

71. 女性, 30 岁, 风湿热病史 6 年, 现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血, 查体心尖部闻及舒张中晚期杂音, 心电图显示左房增大, 该患者的诊断是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 联合瓣膜病变
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

71. C

解析: 心尖区隆隆样舒张中晚期杂音, 并有左心房肥大的证据, 即可诊断为二尖瓣狭窄。

72. 患者, 男, 65 岁, 临床诊断为急性心肌梗死, 入院第 2 天出现三度房室传导阻滞, 最恰当的治疗措施是

- A. 静注阿托品
- B. 静注异丙肾上腺素
- C. 口服阿托品

- D. 安装临时心脏起搏器
- E. 安装永久性心脏起搏器

72. D

解析:

73. 患者男性, 60 岁, 由于情绪激动, 突然剧烈头痛、头晕、呕吐, 随之出现“三偏征”, 诊断为脑出血, 其最主要的病因是

- A. 高血压性动脉硬化
- B. 血液病
- C. 动脉瘤
- D. 脑血管畸形
- E. 脑动脉炎

73. A

解析: 脑出血是指脑内血管破裂导致的脑实质内的出血, 脑出血最主要病因是高血压性动脉硬化。

74. 患者胃溃疡病史 12 年, 因上腹痛、呕吐、消瘦就诊, 经胃镜检查确诊为进展期胃癌, 治疗最好的方法是

- A. 免疫疗法
- B. 放射治疗
- C. 手术治疗
- D. 内镜下治疗
- E. 化疗

74. E

解析: 进展期胃癌一般是在全身化疗的基础上, 内镜下局部化疗、微波、激光等方法, 可以杀灭癌细胞, 延长生存期限。

75. 患者十二指肠溃疡病史 7 年, 饮酒后突发上腹剧痛, 查体呈板状腹, 拟诊为急性穿孔, 确诊最重要的检查是

- A. 粪便隐血试验
- B. 腹腔穿刺
- C. 腹部 X 线透视
- D. 钡餐透视
- E. 血常规

75. C

解析: 腹部 X 线透视见膈下游离气体影, 是诊断穿孔的重要依据。

76. 患者男性, 65 岁, 高血压病史 10 年, 今晨起床突然发现右侧肢体瘫痪、感觉障碍、失语, 经检查诊断为动脉血栓性脑梗死, 最常见的病因是

- A. 动脉粥样硬化

- B. 细菌性血管炎

- C. 心脏病

- D. 糖尿病

- E. 高血压病

76. A

解析: 动脉血栓性脑梗死最常见的病因是动脉粥样硬化, 斑块破溃可穿通和破坏血管内膜, 破溃处血小板聚集而形成血栓, 加重管腔狭窄甚至闭塞, 导致血管供血区的脑组织缺血、软化和坏死, 产生脑局灶性症状。77. 患者王某, 因水肿、高血压、蛋白尿就诊, 经查拟诊为慢性肾炎, 需与慢性肾盂肾炎鉴别, 需要做何检查

- A. 肾功能检测

- B. 静脉肾盂造影

- C. 尿细菌培养

- D. 尿常规

- E. 血常规

77. C

解析: 慢性肾炎与慢性肾盂肾炎的鉴别要点之一就是: 慢性肾盂肾炎尿细菌培养异常, 而慢性肾炎多是蛋白尿, 尿细菌培养没有异常。

78. 患者男性, 24 岁, 服毒物后昏迷、呼吸衰竭、呼气有特殊的大蒜臭味, 毒物可能是

- A. 安眠药

- B. 麻醉剂

- C. 一氧化碳

- D. 砷

- E. 有机磷杀虫药

78. E

解析: 有机磷杀虫药中毒的典型症状就是: 呼气有特殊的大蒜臭味。

79. 男性患者, 25 岁, 慢性肾炎病史 7 年, 近日来恶心、呕吐、气喘, 血压 175/100mmHg, 颈静脉怒张, 双肺底闻及湿啰音, 血尿素氮 30mmol/L, 血肌酐 752umol/L, 血钾 7.2mmol/L, 最宜采用的治疗是

- A. 5%碳酸氢钠静滴

- B. 硝普钠静滴

- C. 葡萄糖酸钙静推

- D. 血液透析

- E. 50%葡萄糖静滴

79. D

解析:

80. 女性, 29 岁, 因月经量多 2 年, 出现贫血表现, 拟诊断为缺铁性贫血, 可作为缺铁依据的检查结果是

- A. 转铁蛋白饱和度 < 15%
- B. FEP > 4.5 $\mu\text{g/g}$
- C. 血清铁蛋白 < 12 $\mu\text{g/L}$
- D. 总铁结合力 > 64.4 $\mu\text{mol/L}$
- E. 血清铁 < 8.9 $\mu\text{mol/L}$

80.C

解析: 血清铁蛋白 < 12 $\mu\text{g/L}$ 可作为缺铁依据。由于血清铁蛋白浓度稳定, 与体内贮铁量的相关性好, 可用于早期诊断和人群铁缺乏症的筛检。

81. 男性, 55 岁, 患有慢性肾炎, 水肿明显, 血压 160 / 95mmHg, 控制血压应首选的药物是

- A. 利血平
- B. 降压灵
- C. 苯那普利
- D. 硝苯地平
- E. 呋塞米

81.C

解析: 对于慢性肾炎患者, 降血压首选具有肾脏保护作用的降压药如 ACEI 或 ARB。苯那普利属于 ACEI 类药物。

82. 某男, 12 岁。发热伴鼻出血 1 周。检查皮肤出血点, 胸骨中下段有压痛。Hb90g/L, WBC $10 \times 10^9/\text{L}$, PLT $50 \times 10^9/\text{L}$, 血涂片可见幼稚细胞。下列哪项检查对诊断最有意义

- A. 胸片检查
- B. 尿液检查
- C. 骨髓检查
- D. 酸化血清溶血试验
- E. 网织红细胞计数

82.C

解析:

83. 某男, 50 岁, 确诊为慢性髓细胞白血病慢性期。首选治疗是

- A. 骨髓移植
- B. 泼尼松
- C. 长春新碱
- D. 羟基脲
- E. 环磷酰胺

83.D

解析: 慢性髓细胞白血病慢性期首选治疗是羟基脲

84. 某男, 40 岁。牙龈出血、发热半月。检查: Hb50g/L, WBC $12 \times 10^9/\text{L}$, 原始粒细胞 0.30, Plt $7 \times 10^9/\text{L}$, 患者贫血的主要原因是

- A. 出血
- B. 红细胞寿命缩短
- C. 造血原料缺乏
- D. 红细胞生成受到异常增生细胞的干扰
- E. 无效性红细胞生成

84.D

解析:

85. 首选糖皮质激素治疗的疾病是 A.

- 白细胞减少症
- B. 原发免疫性血小板减少症
- C. 缺铁性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 急性白血病

85. 答案: B

解析: 原发免疫性血小板减少症首选糖皮质激素治疗。

86. 1 型糖尿病患者, 近期由于肺部感染, 原有症状明显加重, 诊断并发酮症酸中毒, 其首要的治疗措施是

- A. 纠正电解质紊乱
- B. 应用胰岛素
- C. 补液
- D. 纠正酸中毒
- E. 控制感染

86.C

解析: 糖尿病酮症酸中毒的治疗: 立即补液为救治的关键性措施, 一般输注 0.9%氯化钠溶液, 补液量根据患者体重及失水程度评估, 一般在体重的 10%以上。

87. 女性患者, 29 岁, 因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是

- A. 轻度贫血
- B. 血沉增快
- C. 反应蛋白升高
- D. 心脏超声示少量心包积液

E. 手部 X 线检查未见骨质改变

87. E

解析:

88. 女性患者, 21 岁, 四肢关节痛 6 个月, 近 2 个月出现面颊部对称性红斑, 口腔溃疡反复发作, 检查白细胞 $2.7 \times 10^9/L$, 血沉 67mm/h , 该患者最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 干燥综合征
- D. 白塞病
- E. 风湿性关节炎

88. B

解析: 患者面颊部对称性红斑, 白细胞 $2.7 \times 10^9/L$, 血沉 67mm/h 诊断为系统性红斑狼疮。

89. 女性患者, 56 岁, 身高 155cm , 体重 55kg , 体检发现空腹血糖 6.4mmol/L , 下列正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
- C. 可排除糖尿病
- D. 应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验
- E. 应做 24 小时尿糖定量

89. B

解析: 患者空腹血糖 6.4mmol/L 。为进一步诊断, 应进行口服葡萄糖耐量试验。

90. 女性患者, 28 岁, 对抗甲状腺药物有过敏反应。治疗宜选择的是

- A. 放射性碘治疗
- B. 甲状腺次全切除术
- C. 抗甲状腺药联合糖皮质激素
- D. 复方碘液
- E. 普萘洛尔

90. A

解析: 患者对抗甲状腺药物有过敏反应, 放射性碘治疗

昼睡夜醒, 精神恍惚。动脉血气分析示

$\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$, PaCO_2 为 70mmHg , 血象: 白细胞 $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.88。

91. 患者的诊断哪项根据不足

- A. 肺部感染
- B. 呼吸衰竭
- C. 肺性脑病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

91. D

解析: 老年男性患者, 既往慢性支气管炎病史, 出现喘憋, 考虑发展为 COPD 可能性大, 受凉后出现症状加重, 考虑肺部感染导致 COPD 急性加重期, 血气分析示 II 型呼吸衰竭, 精神恍惚考虑 COPD 合并肺性脑病, 故支气管哮喘依据不足。

92. 目前的治疗, 哪项措施欠妥

- A. 吸氧
- B. 氨茶碱
- C. 抗菌药物
- D. 呼吸机治疗
- E. 氨溴索

92. D

解析: 患者虽出现 COPD, 仍能够自主呼吸, 无需机械通气。

(93~94 题共用题干)

女性患者, 38 岁。心慌气短十余年, 加重伴不能平卧 2 小时。查体: 心率 142 次/分, 心音强弱不等, 心律绝对不齐, 心尖区闻及收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音, 双肺底闻及细小湿啰音, 心界向左侧扩大, 肝大, 肋下 5cm , 肝颈静脉反流征阳性, 双下肢水肿。

93. 此患者的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
- C. 二尖瓣狭窄、房颤、左心衰竭
- D. 三尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- E. 三尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭

93. A

解析: 中年女性, 心慌气短, 心脏听诊示心音强弱不等, 心律绝对不齐, 心尖区闻及收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音, 考虑二尖瓣狭窄伴房颤, 肝大, 肝颈静脉反流征阳性, 双下肢水肿, 表示出现右心衰竭。

A3

(91~92 题共用题干)

患者张某, 77 岁, 患慢性支气管炎 35 年, 两周前因受凉出现胸闷、咳嗽、喘憋加重, 咳白色黏痰, 经治疗咳嗽减轻, 但出现烦躁,

94. 治疗应首选

- A. 口服地高辛
- B. 静注西地兰
- C. 肌注呋塞米
- D. 皮下注射吗啡
- E. 静注普萘洛尔

94. B

(95~96 题共用题干)

男性患者, 38 岁, 间歇性左下腹痛 5 个月, 解脓血便 2 个月, 反复抗菌药物治疗无效。查体: 腹平软, 左下腹轻压痛, 未扪及包块。

95. 根据以上资料, 最有可能的诊断是

- A. 克隆病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠癌
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 慢性阿米巴痢疾

95. B

解析: 中年男性, 间歇性左下腹痛、解脓血便, 抗菌治疗无效, 查体左下腹疼痛, 考虑溃疡性结肠炎可能性大。

96. 为明确诊断, 最有价值的诊断方法是

- A. 临床症状及体征
- B. 大便常规与培养
- C. X 线钡剂灌肠
- D. 结肠镜检查
- E. 血清免疫球蛋白测定

96. D

解析: 对溃疡性结肠炎诊断最有价值的为结肠镜检查, 可以直接看到肠道内病变, 并可取标本行病理检查。

(97~98 题共用题干)

患者张某, 男, 31 岁。无明显诱因面部浮肿、头晕, 已 1 年余, 未就医, 近两周出现恶心, 食欲差。查体: 血压 175/100mmHg, 心率 90 次/分, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹平软, 无压痛及反跳痛, 双肾区无叩痛。实验室检查: Hb90g/L, BUN29mmol/L, Cr753mmol/L。尿液: 蛋白

(++) , 红细胞(++), 管型(+)

97. 最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾炎

C. 肾病综合征

D. 高血压肾病

E. 慢性肾炎急性发作

97. E

解析: 中年男性患者, 病史 1 年, 此次检查血肌酐升高, 考虑慢性肾炎基础上急性发作。

98. 患者饮食中蛋白质的摄入量哪项为宜

- A. 0.5g/kg
- B. 0.7g/kg
- C. 1.0g/kg
- D. 1.2g/kg
- E. 1.4g/kg

98. B

解析: 尿毒症期患者建议蛋白摄入量为 0.7g/kg。

(99~100 题共用题干)

某男患者, 1 年前出现低热、出汗, 逐渐消瘦, 左肋下有包块, 常伴有左上腹坠痛, 餐后饱胀感, 近 1 月发热, 伴牙龈出血。

Hb90g/L, WBC25×10⁹/L, PLT70×10⁹/L, 血涂片原始粒细胞占 0.50。

99. 此患者最有可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 慢性髓细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 慢性乙型肝炎

99. B

解析: 患者病史 1 年, 以脾大为主要临床表现, 近 1 月, 出现发热、出血, 血常规考虑示全血细胞减少, 最可能的诊断为慢性髓细胞白血病。

100. 此患者最有可能用的药物是

- A. 伊马替尼
- B. 环磷酰胺
- C. 顺铂
- D. 长春新碱
- E. 阿糖胞苷

100. A

解析: 慢性髓细胞白血病首选治疗伊马替尼。

B1

(101~102 题共用备选答案)

- A. 保和丸
- B. 健脾丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 枳实导滞丸
- E. 木香槟榔丸

101. 饮食不节，脘腹痞胀，噎腐吞酸，恶食呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑者，治宜选用

102. 食积内停，脘腹胀痛，下痢泄泻，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉而有力者，治宜选用

101. A

解析：保和丸主治食滞胃脘证，症见脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

102. D

解析：枳实导滞丸主治湿热食积证，症见脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉有力。

(103~104 题共用备选答案)

- A. 归脾汤
- B. 健脾丸
- C. 黄土汤
- D. 槐花散
- E. 十灰散

103. 脾阳不足，统摄无权所致之便血，宜选用

104. 风热客于肠中，损伤脉络所致之便血，宜选用

103. C

解析：黄土汤本方证因脾阳不足，统摄无权所致。治宜温阳止血为主，兼以健脾养血，主治大便下血，先便后血，以及吐血、衄血、妇人崩漏，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。

104. D

解析：槐花散清肠止血，疏风行气，治风热湿毒壅遏肠道、损伤血络之便血。

(105~106 题共用备选答案)

- A. 宣畅气机，清利湿热
- B. 清热化湿，理气和中

- C. 清热泻火，利水通淋
- D. 利湿化浊，清热解毒
- E. 利水渗湿，温阳化气

105. 八正散的功用

106. 三仁汤的功用

105. C

解析：八正散擅长清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。

106. A

解析：三仁汤擅长宣畅气机，清利湿热。主治湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。

(107~108 题共用备选答案)

- A. 玉液汤
- B. 炙甘草汤
- C. 麦门冬汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 清燥救肺汤

107. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

108. 治疗气阴两亏之肺痿，宜用

107. C

解析：麦门冬汤清养肺胃，降逆下气，治疗肺胃阴虚之肺痿。

108. B

解析：炙甘草汤益气滋阴，通阳复脉，治疗气阴两亏之肺痿。

(109~110 题共用备选答案)

- A. 龙骨、牡蛎、鳖甲
- B. 龙骨、龟板、鳖甲
- C. 牡蛎、鳖甲、石决明
- D. 龙骨、牡蛎、龟板
- E. 鳖甲、牡蛎、龟板

109. 大定风珠的组成中含有的药物是

110. 镇肝息风汤组成中含有的药物是

109. E

解析：大定风珠的组成是生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、生鸡子黄、生鳖甲。方歌：大定风珠鸡子黄，胶芍三甲五味襄；麦冬生地麻仁草，滋阴息风是妙方。

110. D

解析：镇肝息风汤的组成是怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生杭芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草。方歌：

镇肝息风芍天冬，玄参龟板赭茵从，龙牡麦芽膝草楝，肝阳上亢能奏功。

(111~112 题共用备选答案)

- A. 丹参饮
- B. 温经汤
- C. 生化汤
- D. 失笑散
- E. 桂枝茯苓丸

111. 具有活血祛瘀，散结止痛功用的方剂是

112. 具有养血祛瘀，温经止痛功用的方剂是

111. D

解析：失笑散活血祛瘀，散结止痛。主治瘀血停滞证。

112. C

解析：生化汤养血祛瘀，温经止痛。主治血虚寒凝，瘀血阻滞证。

(113~114 题共用备选答案)

- A. 风中经络，气血痹阻
- B. 湿痰瘀血，痹阻经络
- C. 风痰阻络，筋肉失养
- D. 肝阳偏亢，化风上扰
- E. 热灼真阴，筋脉失濡

113. 小活络丹所主证候病因病机是

114. 大秦芎汤所主证候病因病机是

113. B

解析：小活络丹证主因风寒湿邪侵袭，痰湿痹阻经络，致肢体筋脉疼痛，麻木拘挛，关节屈伸不利，疼痛游走不定。

114. A

解析：大秦芎汤证因风邪初犯，入侵经络，气血痹阻不通，致口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动。

(115~116 题共用备选答案)

- A. 大黄、芒硝、赤芍
- B. 桃仁、丹皮、芒硝
- C. 大黄、桃仁、甘草
- D. 赤芍、丹皮、甘草
- E. 大黄、赤芍、丹皮

115. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是

116. 桃核承气汤的组成中含有药物是

115. B

解析：大黄牡丹汤的组成是大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝。方歌：金匱大黄牡丹汤，桃仁瓜子芒硝裹；肠痈初起腹按痛，泻热逐瘀自能康。

116. C

解析：桃核承气汤的组成是桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒硝。方歌：桃核承气五药施，甘草硝黄并桂枝；瘀热互结小腹胀，如狂蓄血功效奇。

(117~118 题共用备选答案)

- A. 铁锈色痰
- B. 粉红色乳样或脓性痰
- C. 大量脓臭痰
- D. 粉红色泡沫痰
- E. 红棕色胶冻样痰

117. 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是

118. 急性肺脓肿的典型痰液是

117. A

解析：肺炎链球菌肺炎的痰液特征是：铁锈色痰。

118. C

解析：急性肺脓肿的典型痰液是：大量脓臭痰。

(119~120 题共用备选答案)

- A. 下垂性压陷性水肿
- B. 脾肿大
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 咳嗽、咳痰
- E. 咯血

119. 左心衰竭时最早出现的症状是

120. 右心衰竭时典型的体征是

119. C

解析：左心衰竭时，表现为程度不同的呼吸困难，呼吸困难程度及表现与心力衰竭程度有关：①劳力性呼吸困难：呼吸困难发生在重体力活动时，休息后可缓解；②夜间阵发性呼吸困难：与平卧睡眠后回心血量增加、副交感神经张力增加、膈肌抬高、肺活量减少有关；③端坐呼吸；④急性肺水肿（心源性哮喘）：是呼吸困难最严重的状态。除呼吸困难外，常有咳嗽、咳痰、咯血等。120. A

解析：右心衰竭体征。(1)颈静脉征：颈静脉搏动增强、充盈、怒张，肝颈静脉反流

征阳性。(2) 肝脏肿大: 肝脏因淤血肿大伴压痛。(3) 水肿: 身体低垂部位可有压陷性水肿, 多由脚踝部开始, 逐渐向上进展, 午后加重。(4) 心脏体征: 可出现三尖瓣关闭不全的反流性杂音。(5) 发绀。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 淋巴转移
- B. 种植转移
- C. 直接蔓延
- D. 血行转移
- E. 上行转移

121. 胃癌最早、最常见的转移方式是

122. 原发性肝癌最常见的转移方式是

121. A

解析: 胃癌最早、最常见的转移方式是: 淋巴转移。

122. D

解析: 原发性肝癌最常见的转移方式是: 肝内血行转移。

(123~124 题共用备选答案)

- A. 颗粒管型
- B. 透明管型
- C. 少量白细胞
- D. 畸形红细胞
- E. 白细胞管型

123. 尿沉渣检查, 肾盂肾炎多见

124. 尿沉渣检查, 慢性肾衰竭多见

123. E

124. A

解析: 尿沉渣检查, 肾盂肾炎多见白细胞管型, 慢性肾衰竭多见颗粒管型。

(125~126 题共用备选答案)

- A. 结核病
- B. 急性喉炎
- C. 疟疾
- D. 败血症
- E. 伤寒

125. 稽留热可见于

126. 弛张热可见于

125. E

解析: 稽留热: 体温持续于 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上, 24 小时波动范围不超过 1°C , 达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。

126. D

解析: 弛张热: 体温在 39°C 以上, 但波动幅度大, 24 小时内体温差达 2°C 以上, 最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

(127~128 题共用备选答案)

- A. 白血病
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 急性胆囊炎
- D. 钩端螺旋体病
- E. 流行性感

127. 发热伴寒战常见于

128. 发热伴结膜充血常见于

127. C

解析: 发热伴寒战见于肺炎球菌肺炎、败血症、急性溶血性疾病、急性胆囊炎、疟疾等。

128. D

解析: 发热伴随结膜充血见于流行性出血热、斑疹伤寒、恙虫病、钩端螺旋体病等。

(129~130 题共用备选答案)

- A. 高血压脑病
- B. 有机磷中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 脑外伤
- E. 尿毒症

129. 意识障碍伴发热见于

130. 意识障碍伴高血压见于

129. D

解析: 意识障碍伴发热: 先发热后出现意识障碍见于严重感染性疾病; 先出现意识障碍后出现发热见于脑出血、脑肿瘤、脑外伤等。130. A

解析: 意识障碍的伴随症状: (1) 伴发热先发热后出现意识障碍见于严重感染性疾病; 先出现意识障碍后出现发热见于脑出血、脑肿瘤、脑外伤等。(2) 伴呼吸缓慢见于吗啡或巴比妥类中毒、颅内高压等。(3) 伴呼吸深大 见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等。(4) 伴瞳孔散大 见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。(5) 伴瞳孔缩小 见于海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。

(6) 伴高血压 常见于脑出血、高血压脑病、肾炎等。(7) 伴脑膜刺激征 见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 水肿
- B. 甲状腺肿
- C. 反甲
- D. 爪形手
- E. 梭状关节

131. 类风湿性关节炎时出现

132. 贫血时出现

131. E

解析：指关节变形以类风湿性关节炎引起的梭状关节最常见。

132C

解析：匙状甲（反甲）常见于缺铁性贫血，偶见于风湿热。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 全身性水肿
- B. 双下肢非凹陷性水肿
- C. 单侧肢体水肿
- D. 下肢静脉曲张
- E. 足内翻、足外翻

133. 脊髓灰质炎后遗症可见

134. 下肢浅静脉血液回流受阻可见

133. E

解析：足内翻、足外翻多见于先天畸形、脊髓灰质炎后遗症等。

134. D

解析：下肢静脉曲张多见于小腿，是下肢浅静脉血液回流受阻或静脉瓣功能不全所致。表现为下肢静脉如蚯蚓状怒张、弯曲，久立位更明显，严重时有小腿肿胀感，局部皮肤颜色暗紫红色或有色素沉着，甚至形成溃疡。常见于从事站立性工作者或栓塞性静脉炎患者。

(135~136 题共用备选答案)

- A. 脓血便
- B. 鲜血便
- C. 柏油样便
- D. 灰白色便
- E. 稀糊状便

135. 阻塞性黄疸为

136. 上消化道出血为

135. D

解析：阻塞性黄疸为灰白色便。

136. C

解析：正常成人的粪便为黄褐色圆柱状软便，婴儿粪便呈金黄色。（1）水样或粥样稀便 见于各种感染性或非感染性腹泻，如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进症等。（2）米泔样便 见于霍乱。（3）黏液脓样或脓血便 见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等。阿米巴痢疾时，以血为主，呈暗红色果酱样；细菌性痢疾则以黏液脓样或脓血便为主。

（4）冻状便 见于肠易激综合征、慢性菌痢。（5）鲜血便 多见于肠道下段出血，如痔疮、肛裂、直肠癌等。（6）柏油样便 见于各种原因引起的上消化道出血。（7）灰白色便 见于阻塞性黄疸。（8）细条状便 多见于直肠癌。（9）绿色粪便 提示消化不良。（10）羊粪样便 多见于老年人及经产妇排便无力者。

(137~138 题共用备选答案)

- A. 高糖血症
- B. 尿糖阳性
- C. 血糖减低
- D. 低糖血症
- E. 空腹血糖过高

137. FBG >9.0mmol/L 时为

138. FBG <3.9mmol/L 时为

137. B

解析：FBG >9.0mmol/L 时尿糖阳性。

138. C

解析：FBG <3.9mmol/L 时为血糖减低。

(139~140 题共用备选答案)

- A. 黄色痰
- B. 红色痰
- C. 黄绿色痰
- D. 铁锈色痰
- E. 棕褐色痰

139. 呼吸道化脓性感染多见

140. 肺炎链球菌肺炎多见

139. A

解析：黄色痰：见于呼吸道化脓性感染。

140. D

解析：铁锈色痰：见于肺炎链球菌肺炎。

(141~142 题共用备选答案)

- A. 实变区密度较低呈毛玻璃样
- B. 左上缘影呈直线状斜向外下方
- C. 右上肺与肺门部形成“S”状影

D. 肺内有多发的薄壁空腔

E. 肺内有多发的肿块影

141. 弥漫性肺癌的征象为

142. 右上中心型肺癌的 X 线表现为

141. A

解析：细支气管肺泡癌（弥漫性肺癌）：表现为两肺广泛的细小结节，边界不清，分布不对称，进一步发展可融合成大片肿块，形成癌性实变。CT 可见两肺不规则分布的 1cm 以下结节，边缘模糊，常伴有肺门、纵隔淋巴结转移；融合后的大片实变影中靠近肺门处可见支气管充气征，实变区密度较低呈毛玻璃样，其中可见到高密度的隐约血管影是其重要特征。

142. C

解析：发生于右上叶的肺癌，肺门肿块及右肺上叶不张连在一起可形成横行“S”状下缘。

（143~144 题共用备选答案）

A. 骨骼

B. 软组织与液体

C. 脂肪

D. 气体

E. 胸膜

143. 密度最低，X 线片上呈黑色的是

144. 密度最高，X 线片上呈白色的是

143. D

解析：密度最低，X 线呈黑色的是气体。

144. A

解析：密度最高，X 线片上呈白色的是骨骼。

（145~146 题共用备选答案）

A. 神灵主义医学模式

B. 自然哲学医学模式

C. 机械论医学模式

D. 生物医学模式

E. 生物~心理~社会医学模式

145. 把人比作机器，疾病是机器某部分零件失灵，用机械观解释一切人体现象的医学模式是

146. 认为心理，社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系的医学模式是

145. C

解析：16~17 世纪，受工业革命影响，医学观用机械观解释一切人体现象，认为人也像

一部机器，疾病就是机器某部件失灵。这种医学模式忽视了生命的生物复杂性，具有机械性和片面性的缺点。

146. E

解析：生物-心理-社会医学模式认为人的心理与生理、精神及躯体、机体内外环境是一个完整的统一体，心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切联系。强调生物、心理、社会三因素是相互联系、不可分割的。

（147~148 题共用备选答案）

A. 对服务对象实施有利的医学行为

B. 善待生命，同情、关心、体贴患者

C. 在医护实践中尊重能够自主的病人的自主性

D. 在医学服务中公平、正直地对待每一位病人的伦理原则

E. 在诊治，护理过程中努力避免病人不应有的医疗伤害

147. 尊重原则的含义是

148. 无伤原则的含义是

147. C

解析：尊重原则的含义是在医护实践中主要是对能够自主的病人自主性的尊重。 148. E

解析：无伤原则的含义是指在诊治，护理过程中努力避免病人不应有的医疗伤害。

（149~150 题共用备选答案）

A. 要有急病人所急的紧迫感

B. 要有敢担风险团结协作的使命感

C. 要有深厚的同情感

D. 抢救前了解诊疗经过

E. 要有经济头脑，保证少花钱多办事

149. 在抢救危重病人时，保证抢救成功的前提条件是

150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

149. A

解析：抢救病情危重病人时，要有紧迫感，争分夺秒，竭尽全力抢救病人。

150. E

解析：抢救危重病人，随机性强、时间性强、协作性强，要求医务工作者有急病人所急的紧迫感、敢担风险团结协作的使命感、以及深厚的同情感，一切以挽救患者生命为先，经济方面的问题不属于优先考虑的问题。

第三单元

一、A1 型选择题 (1~60 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项不是时行感冒的特征

- A. 传染性大
- B. 病情较重
- C. 发病急
- D. 易于流行
- E. 不传变

1. E

解析：时行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生传变，化热入里，继发或合并它病，具有广泛的传染性、流行性。2. 咳嗽初起，忌用

- A. 黄芩、冬花
- B. 沙参、麦冬
- C. 双花、连翘
- D. 诃子、五味子
- E. 半夏、陈皮

2. D

解析：咳嗽初起，不能使用收敛性质的药物，以免闭门流寇。因此本题答案选 D。

3. 哮喘病的宿根

- A. 寒
- B. 热
- C. 痰
- D. 气
- E. 火

3. C

解析：哮喘病的病理因素以痰为主。痰的产生主要由于人体津液不归正化，凝聚而成，如

伏藏于肺，则成为发病的潜在“夙根”，因各种诱因如气候、饮食、情志、劳累等诱发。

4. 喘咳气急，胸部胀闷，不得卧，痰稀白量多，恶寒发热，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。

其治疗应首选

- A. 麻黄汤
- B. 木防己汤
- C. 苓桂术甘汤
- D. 越婢加半夏汤
- E. 葶苈大枣泻肺汤

4. A

解析：喘证“实喘 风寒壅肺证 喘息咳逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多稀薄而带泡沫，色白质黏，常有头痛，恶寒，或有发热，口不渴，无汗，苔薄白而滑，脉浮紧。”代表方：麻黄汤合华盖散加减。

5. 《千金》苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合

- A. 肺痈
- B. 肺痿
- C. 肺胀
- D. 肺消
- E. 肺癆

5. A

解析：《千金》苇茎汤主要在治疗肺痈之成痈期的时候应用。

6. 肺癆虚火灼肺，咳血较著者，在辨证方中宜加入

- A. 当归、三七
- B. 泽兰、红花
- C. 黑山栀、紫珠草
- D. 冬虫夏草、蛤蚧
- E. 木蝴蝶、诃子

6. C

解析：肺癆虚火灼肺证，火旺较甚，热势明显升高者，加胡黄连以苦寒坚阴清热；骨蒸劳热，加秦艽、白薇、鳖甲；痰热蕴肺，咳嗽痰黏色黄，酌加桑皮、花粉、知母、海蛤粉以清热化痰；咯血较著者，加丹皮、黑山栀、紫珠草、醋制大黄，或配合十灰丸以凉血止血。

7. 小青龙汤治疗肺胀哪一型

- A. 外寒内饮
- B. 痰热郁肺

- C. 痰蒙神窍
- D. 肺肾气虚
- E. 阳虚水泛

7. A

解析：肺胀若属外感风寒诱发，痰从寒化为饮，喘咳，痰多黏白泡沫，见表寒里饮证者，宗小青龙汤意加麻黄、桂枝、细辛、干姜散寒化饮

8. 下列关于肺痿治疗的各项叙述中，错误的是

- A. 重视调理肝肾
- B. 以补肺生津为原则
- C. 不可妄投燥热，以免助火伤津
- D. 忌苦寒滋腻碍胃
- E. 慎用祛痰峻剂

8. A

解析：应该是重视调理“脾肾”。脾胃为后天之本，肺金之母，培土有助于生金；肾为气之根，司摄纳，温肾可以助肺纳气，补上制下。

9. 下列哪项不是惊悸与怔忡的鉴别要点

- A. 致病多由外因或内因引起
- B. 诱因常与惊恐、恼怒或劳累有关
- C. 全身情况较好或较差
- D. 病性属实或属虚
- E. 病位在肝或在心

9. E

解析：两者鉴别要点：①病因：惊悸多与情绪因素有关，可由骤遇惊恐，忧思恼怒，悲哀过极，过度紧张引发；怔忡多由久病体虚，心脏受损所致，无精神等因素亦可发作。②症状：惊悸呈阵发性，时作时止；怔忡持续心悸，心中惕惕，不能自控。③病性：惊悸实证居多，怔忡虚证居多。④病势：惊悸病情较轻；怔忡病情较重，病变部位都在心，所以病位在肝或在心不是两者鉴别要点。10. 胸痹心痛发作时，疼痛可以放射到

- A. 右胸
- B. 肩背
- C. 左胁下
- D. 右胁下
- E. 背正中

10. B

解析：胸痹以胸部闷痛为主症，患者多见膻中或心前区憋闷疼痛，甚则痛彻左肩背、咽喉、胃脘部、左上臂内侧等部位。

11. 不寐的辨证，应首辨的要点是

- A. 寒热
- B. 久暂
- C. 病位
- D. 虚实
- E. 标本

11. D

解析：本病辨证首分虚实。虚证，多属阴血不足，心失所养，临床特点为体质瘦弱，面色无华，神疲懒言，心悸健忘。实证为邪热扰心，临床特点为心烦易怒，口苦咽干，便秘溲赤。

12. 下列哪项不是外感头痛的特征

- A. 灼痛
- B. 掣痛
- C. 重痛
- D. 胀痛
- E. 空痛

12. E

解析：空痛属于内伤头痛的特点。

13. 眩晕的病变脏腑为

- A. 心、肝、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 肝、脾、肾
- D. 心、肺、脾
- E. 心、肝、肺

13. C

解析：眩晕的病位在头脑，与肝、脾、肾相关。

14. 补阳还五汤适用于中风何证型

- A. 气血亏虚
- B. 肝肾阴虚
- C. 气虚络瘀
- D. 风痰阻络
- E. 肾虚精亏

14. C

解析：中风之气虚络瘀证证候主症：肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄，舌质淡紫或有瘀斑，苔薄白，脉细涩或细弱。治法：益气养血，化瘀通络。代表方：补阳还五汤加减。

15. 狂证痰火扰神证治疗方剂宜选

- A. 滚痰丸
- B. 生铁落饮
- C. 清气化痰丸
- D. 顺气导痰汤
- E. 温胆汤

15. B

解析：狂证之痰火扰神证。证候主症：起病先有性情急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，逾垣上屋，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌质红绛，苔多黄腻或黄燥而垢，脉弦大滑数。证机概要：五志化火，痰随火升，痰热上扰清窍，神明昏乱。治法：清心泻火，涤痰醒神。代表方：生铁落饮加减。

16. 痫病发生的主要病理基础为何脏的损伤

- A. 肺、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 肝、脾、肾
- D. 肺、肝、肾
- E. 心、肝、脾

16. C

解析：痫病的病位在脑，涉及肝、脾、心、肾诸脏。其中肝、脾、肾的损伤是痫病发生的主要病理基础。

17. 痴呆痰浊蒙窍证，若风痰瘀阻，应选用的方剂是

- A. 二陈汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 半夏厚朴汤
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 天麻钩藤饮

17. D

解析：痴呆痰浊蒙窍证，若风痰瘀阻，应选用的方剂是：半夏白术天麻汤。

18. 胃痛的治疗，主要是

- A. 调肝理气止痛
- B. 调肝和胃止痛
- C. 理气和胃止痛
- D. 调理脾胃止痛
- E. 调肝理脾止痛

18. C

解析：胃痛的治疗以理气和胃止痛为主，审证求因。

19. 胃痞与鼓胀的相同症状是

- A. 胀满之苦
- B. 外有胀大之形
- C. 触之无形
- D. 按之无痛
- E. 心下痞塞

19. A

解析：胃痞与鼓胀两者均为自觉腹部胀满的病证，但鼓胀以腹部胀大如鼓、皮色苍黄、脉络暴露为主症，胃痞则以自觉满闷不舒、外无胀形为特征。

20. 下列哪项不是实证呕吐的特点

- A. 发病较急
- B. 病程较短
- C. 多由外邪及饮食所伤而发
- D. 有邪实之象
- E. 时发时止

20. E

解析：“时发时止”为虚证呕吐的症状特点。

21. 下列关于噎膈的预防调护叙述中，错误的是

- A. 避免食用发霉的食物
- B. 每餐进食后不宜立即喝水
- C. 多食新鲜蔬菜、水果
- D. 戒烟酒
- E. 及时治疗食管慢性炎症

21. B

解析：噎膈的预防调护：改变不良饮食习惯，戒烟酒，避免进烫食、吃饭太快、咀嚼不足以及喜食酸菜、泡菜等。避免食用发霉的食物，如霉花生、霉玉米。管好用水，防止污染，减少水中亚硝酸盐含量。加强营养，多食新鲜水果、蔬菜。及时治疗食管慢性疾病，如食管炎、食管白斑、贲门失弛缓症、食管疤痕性狭窄、憩室和食管溃疡等，防止癌变。加强护理，嘱病人每餐进食后，可喝少量的温开水或淡盐水，以冲淡食管内积存的食物和黏液，预防食管黏膜损伤和水肿。保持心情舒畅，适当锻炼身体，增强体质。

22. 呃逆的病位在

- A. 食管
- B. 膈
- C. 胃
- D. 脾

E. 肝

答案: B

解析: 呃逆的病位在膈, 病变的关键脏腑在胃, 还与肝、脾、肺、肾诸脏腑有关。

23. 以腹痛的部位辨证, 胁痛、少腹疼痛者, 多属

A. 肝胆病

B. 虫证

C. 肠痈

D. 胃痛

E. 膀胱病

23. A

解析: 胁腹、两侧少腹痛多属肝经病证, 为足厥阴、足少阳经脉所主; 大腹疼痛, 多为脾胃病证, 为足太阴、足阳明经脉所主; 脐腹疼痛多为大小肠病证, 为手阳明、手太阳经脉所主; 脐以下小腹痛多属肾、膀胱、胞宫病证, 为足少阴、足太阳经脉及冲、任、带脉所主。

24. 从下列泻下粪便中辨出何为湿热泄泻的特点

A. 泄泻清稀甚至如水样

B. 泄下粪色黄褐而臭

C. 泄泻如水

D. 泻下粪便臭如败卵, 伴有不消化之物

E. 时溇时泄, 水谷不化

24. B

解析: 泄泻之湿热伤中证; 证候主症: 泄泻腹痛, 泻下急迫, 或泻而不爽, 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 小便短黄, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或濡数。

25. 寒湿痢的表现是

A. 痢下赤白脓血, 不甚臭秽

B. 痢下鲜紫脓血

C. 痢下纯为白冻

D. 痢下赤多白少

E. 痢下脓血黏稠

25. C

解析: 寒湿痢证候主症: 痢下赤白黏冻, 白多赤少, 或为纯白冻, 腹痛拘急, 里急后重, 口淡乏味, 脘腹胀满, 头身困重, 舌质或淡, 舌苔白腻, 脉濡缓。

26. 大便干, 小便清长, 面色㿔白, 四肢不温, 腹中冷痛, 舌淡苔白, 脉沉迟。此属

A. 气秘

B. 冷秘

C. 气虚秘

D. 血虚秘

E. 阳虚秘

26. E

解析: 阳虚秘; 证候主症: 大便干或不干, 排出困难, 小便清长, 面色㿔白, 四肢不温, 腹中冷痛, 或腰膝酸冷, 舌淡苔白, 脉沉迟。27. 下列哪一项不是肝郁气滞胁痛的特点

A. 胁肋胀痛

B. 走窜不定

C. 入夜痛甚

D. 胸闷暖气

E. 疼痛每因情志变化而增减

27. C

解析: 胁痛之肝郁气滞证。证候主症: 胁肋胀痛, 走窜不定, 甚则引及胸背肩臂, 疼痛每因情志变化而增减, 胸闷腹胀, 暖气频作, 得暖气而胀痛稍舒, 纳少口苦, 舌苔薄白, 脉弦。

28. 黄疸脾虚湿滞证的治法是

A. 温中化湿, 健脾和胃

B. 调和肝脾, 理气助运

C. 利湿化浊运脾, 佐以清热

D. 疏肝泄热, 利胆退黄

E. 健脾养血, 利湿退黄

28. E

解析: 黄疸之脾虚湿滞证。证候主症: 面目及肌肤淡黄, 甚则晦暗不泽, 肢软乏力, 心悸气短, 大便溇薄, 舌质淡苔薄, 脉濡细。治法: 健脾养血, 利湿退黄。

29. 下列哪项不是积证的特征

A. 结块有形

B. 结块固定不移

C. 痛有定处

D. 病在气分

E. 是为脏病

29. D

解析: 积属有形, 结块固定不移, 痛有定处, 病在血分, 是为脏病。

30. 下列哪项是血鼓的特征

A. 腹部胀满膨大

B. 暖气或矢气则舒

- C. 腹臃大如蛙腹
- D. 按之如囊裹水
- E. 常伴下肢浮肿

30. A

解析：血鼓即辨证病位入血分的鼓胀，教材上的定义是胀病日久，腹部胀满，青筋暴露，内有癥积，按之胀满疼痛，颈部可见赤丝血缕，此为血鼓。

31. 三焦经在上肢的循行部位是

- A. 外侧前缘
- B. 内侧中线
- C. 外侧后缘
- D. 内侧前缘
- E. 外侧中线

31. E

解析：上肢外侧为手三阳经，按正立姿势，两臂下垂拇指向前的体位，将上下肢的内外侧分别分成前、中、后三条区线。手足阳经为阳明在前、少阳在中、太阳在后。故手少阳三焦经在上肢的循行部位为外侧中线。

32. 下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列

- A. 胆经、肝经、肺经
- B. 心经、小肠经、肾经
- C. 大肠经、胃经、脾经
- D. 肾经、心包经、三焦经
- E. 三焦经、胆经、肝经

32. B

解析：按照气血流注次序，小肠经后边应该是膀胱经。

33. 手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是

- A. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- B. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
- C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- D. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后
- E. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后

33. A

解析：手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是：太阴在前，厥阴在中，少阴在后。

34. 手阳明大肠经的主治特点是

- A. 后头、神志病
- B. 侧头、肋肋病
- C. 侧头、耳病、肋肋病侧

- D. 前头、鼻、口、齿病
- E. 气喘、咽喉病、胃肠病

34. D

解析：手阳明大肠经的主治特点是：前头、鼻、口、齿病。

35. 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 照海
- D. 公孙
- E. 大陵

35. B

解析：八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是：内关。八脉交会穴歌诀：公孙冲脉胃心胸，内关阴维下总同，临泣胆经连带脉，阳维目锐外关逢，后溪督脉内眦颈，申脉阳跷络亦通，列缺任脉行肺系，阴跷照海膈喉咙。

36. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是

- A. 井穴
- B. 荥穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

答案：C

解析：阴经五脏之原穴，与五输穴中的输穴为同一穴，所谓“阴经之输并于原”（《类经图翼》），或说成“以输为原”。

37. 病在胃者及以饮食不节得病者，适用的特定穴为

- A. 井穴
- B. 荥穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

37. E

解析：病在脏者，取之井；病变于色者，取之荥；病时间时甚者，取之输；病变于音者，取之经；经满而血者，病在胃及以饮食不节得病者，取之合。

38. 肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是

- A. 1.5 寸
- B. 3 寸
- C. 4 寸

- D. 6 寸
E. 8 寸

38. B

解析：肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是 3 寸。

39. 循行“入下齿中”的经脉是

- A. 小肠经
B. 大肠经
C. 胃经
D. 脾经
E. 肝经

39. B

解析：手阳明大肠经：“其支脉，从缺盆部上行至颈部，经面颊进入下齿之中，又返回经口角到上口唇，交会于人中（水沟穴），左脉右行，右脉左行，止于对侧鼻孔旁。” 40. 经脉循行中，不与目内眦或目外眦发

生联系的是

- A. 手少阳三焦经
B. 手太阳小肠经
C. 手阳明大肠经
D. 足太阳膀胱经
E. 足少阳胆经

40. C

解析：手阳明大肠经循行过程中未与目内眦或目外眦发生联系。手阳明大肠经经脉循行如下：手阳明大肠经，起于食指之尖端（桡侧），沿食指桡侧，经过第 1、2 掌骨之间，上行至腕后两筋之间，沿前臂外侧前缘，至肘部外侧，再沿上臂外侧前缘上行到肩部，经肩峰前，向上循行至背部，与诸阳经交会于大椎穴，再向前行进入缺盆，络于肺，下行穿过横膈，属于大肠。其支脉，从缺盆部上行至颈部，经面颊进入下齿之中，又返回经口角到上口唇，交会于人中（水沟穴），左脉右行，右脉左行，止于对侧鼻孔旁。41. 在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉

是

- A. 足太阴脾经
B. 手厥阴心包经
C. 足少阴肾经
D. 足阳明胃经
E. 手太阴肺经

41. D

解析：在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是足阳明胃经。

42. “起于大指之端…夹咽，连舌本，散舌下”的经脉是

- A. 手少阴心经
B. 足厥阴肝经
C. 足太阴脾经
D. 足少阴肾经
E. 手厥阴心包经

答案：C

解析：《灵枢·经脉》：脾足太阴之脉，起于大指之端，循指内侧白肉际，过核骨（第 1 跖趾关节内侧的圆形突起）后，上内踝前廉，上踇（即腓肠肌部）内，循胫骨后，交出厥阴之前，上循膝股内前廉，入腹，属脾，络胃，上膈，夹咽（食道），连舌本（舌根），散舌下。

43. 下列腧穴中，治疗便秘效果较好的是

- A. 关冲
B. 中渚
C. 阳池
D. 支沟
E. 外关

43. D

解析：支沟的主治：①便秘；②热病；③耳鸣、耳聋、咽喉肿痛、暴暗、头痛等头面五官病证；④肘臂痛，肋肋痛，落枕；⑤瘰疬。

44. 以下哪项不是得气的感觉或反应

- A. 针刺部位有酸胀、麻重感
B. 针刺部位出现热、凉、痒、痛、抽搐、蚁行等感觉
C. 患者出现循经性肌肤瞤动、震颤
D. 医者刺手体会到针下空松、虚滑
E. 医者刺手体会到针体颤动

44. D

解析：若针刺得气，医者的刺手能体会到针下沉紧、涩滞或针体颤动等反应。若针刺后未得气，则患者无任何特殊感觉或反应，医者刺手亦感觉到针下空松、虚滑。

45. 仰靠坐位适宜取哪些部位的腧穴

- A. 头、面、胸背部腧穴和上、下肢部分腧穴
B. 身体侧面腧穴和上、下肢部分腧穴
C. 头、项、脊背、腰骶部的腧穴

- D. 前头、颜面和颈前等部位的腧穴
E. 后头和项、背部的腧穴

45. D

解析：前头、颜面和颈前等部位的腧穴针刺宜选取仰靠坐位。

46. 有关提插法叙述不正确的是

- A. 将针刺入腧穴一定深度后，施以上提下插的操作
B. 幅度不宜过大，一般以 3~5 分为宜
C. 指力一定要均匀一致
D. 频率应较快，每分钟 100 次左右
E. 保持针身垂直

46. D

解析：提插法：操作时，指力要均匀一致，幅度不宜过大，一般以 3~5 分为宜，频率不宜过快，每分钟 60 次左右，保持针身垂直，不改变针刺角度、方向。

47. 有关灸法的注意事项，叙述不正确的是

- A. 先灸上部，后灸下部
B. 先灸阴部，后灸阳部
C. 壮数应先少后多
D. 艾炷应先小后大
E. 施灸也应注意补泻的操作方法

47. B

解析：临床上一一般是先灸上部，后灸下部，先灸阳部，后灸阴部，壮数是先少而后多，艾炷是先小而后大。

48. 留罐法的留置时间一般为

- A. 3~5 分钟
B. 5~10 分钟
C. 5~15 分钟
D. 15~20 分钟
E. 20~30 分钟

48. C

解析：留罐的时间视拔罐后皮肤的反应与患者的体质而定，一般为 5~15 分钟。

49. 下列哪项不是三棱针的常用操作方法

- A. 点刺法
B. 散刺法
C. 透刺法
D. 刺络法
E. 挑刺法

49. C

解析：三棱针常用操作方法包括：点刺法、散刺法、刺络法、挑刺法。

50. 位于耳垂正面中央部，即耳垂 5 区的耳穴是

- A. 舌
B. 颌
C. 牙
D. 眼
E. 内耳

50. D

解析：眼的部位：在耳垂正面中央部，即耳垂 5 区。主治：急性结膜炎、电光性眼炎、麦粒肿、假性近视。

51. 下列哪项不属于同名经配穴

- A. 耳鸣取中渚、足临泣
B. 头痛取外关、阳陵泉
C. 失眠取神门、三阴交
D. 牙痛取合谷、内庭
E. 便秘取天枢、合谷

51. C

解析：同名经配穴法是将手足同名经的腧穴相互配合组成处方的方法。神门属于手少阴心经，三阴交属于足太阴脾经。所以不属于同名经配穴。

52. 治疗郁证的主穴是

- A. 内关、水沟、丰隆、后溪、百会、印堂
B. 内关、水沟、太冲、神门、百会、印堂
C. 四神聪透百会、神庭透上星
D. 照海、申脉、神门、印堂、百会
E. 内关、郄门、神门、巨阙、印堂

52. B

解析：郁证的处方：主穴：百会、印堂、水沟、内关、神门、太冲。

53. 属于艾炷灸的是

- A. 温针灸
B. 隔盐灸
C. 回旋灸
D. 温和灸
E. 蒜泥灸

53. B

解析：艾炷灸分为直接灸与间接灸，隔盐灸属于艾炷灸中的间接灸。

54. 以下腧穴中，治疗痢证有较好作用的是

- A. 长强
- B. 腰阳关
- C. 命门
- D. 秩边
- E. 志室

54. A

解析：长强的主治：①便血、痔疾、脱肛等肠腑病证；②腰痛，尾骶骨痛，脊强反折；③癫狂痫等神志病证。长强是督脉的起穴，督脉主全身之阳，痫证发作时，长强可以解痉，缓解肌肉痉挛。

55. 华佗夹脊穴位于后正中线旁开 0.5 寸

- A. 第 1 颈椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- B. 第 7 颈椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- C. 第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- D. 第 1 胸椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- E. 第 1 胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

55. C

解析：华佗夹脊穴的定位：在脊柱区，第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 0.5 寸，一侧 17 穴。

56. 针灸治疗绝经前后诸症的主穴，除气海、三阴交外，还包括

- A. 肝俞、脾俞、太冲
- B. 肾俞、肝俞、太溪
- C. 脾俞、带脉、中极
- D. 肝俞、地机、足三里
- E. 肾俞、归来、命门

答案：B

解析：治疗绝经前后诸症的主穴：肾俞、肝俞、太溪、气海、三阴交。

57. 后溪穴是手太阳小肠经的

- A. 荣穴
- B. 输穴
- C. 经穴
- D. 络穴
- E. 郄穴

57. B

解析：后溪穴是手太阳小肠经的输穴。

58. 治疗产后乳少，或见乳房胀满疼痛，或见乳房柔软无胀感，针灸治疗应选用

- A. 乳根、太冲、期门
- B. 乳根、膻中、少泽
- C. 肝俞、太冲、期门

- D. 乳根、脾俞、足三里
- E. 中脘、天枢、期门

58. B

解析：根据题干症状诊断为产后缺乳。缺乳的针灸处方：主穴：乳根、膻中、少泽。

59. 日月的定位是

- A. 乳头直下，第 5 肋间隙，前正中线旁开 4 寸
- B. 乳头直下，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸
- C. 乳头直下，第 7 肋间隙，前正中线旁开 4 寸
- D. 第 11 肋游离端下际
- E. 侧腰部，第 12 肋游离端下际处

59. C

解析：日月的定位：在胸部，第 7 肋间隙，前正中线旁开 4 寸。

60. 落枕病在少阳经者，针灸治疗配

- A. 风池、肩井
- B. 大椎、束骨
- C. 风池、合谷
- D. 内关、合谷
- E. 肩髃、天宗

60. A

解析：落枕的针灸配穴：病在督脉、太阳经者配大椎、束骨；病在少阳经配风池、肩井。风寒袭络配风池、合谷；气滞血瘀配内关、合谷。肩痛配肩髃；背痛配天宗。

二、A2 型选择题（61~102 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。61. 一患者男性，久居岭南，寒战，壮热，

发作时热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数。治法宜

- A. 解毒除瘴，芳化湿浊
- B. 祛邪截疟，和解表里
- C. 清热解表，和解祛邪
- D. 和解表里，温阳达邪
- E. 解毒除瘴，清热保津

答案：B

解析：温症。证候：发作时热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数。治法：祛邪截疟，和解表里。

62. 患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，恶风发热，咽红，舌红苔薄黄，脉滑数。治疗应首选

- A. 越婢加术汤合桑白皮汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
- E. 实脾饮合五味消毒饮

答案：B

解析：湿毒浸淫，损伤肺脾三焦气化不利，水液内停出现水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，辨证属于湿毒浸淫证，其治法为宣肺解毒，利湿消肿，方用麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减。

63. 患者小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 气淋
- D. 血淋
- E. 劳淋

63. D

解析：六种淋证均有小便频涩，滴沥刺痛，小腹拘急，引痛腰腹，患者主症表现有尿色深红，或夹有血块，则辨证为淋证之血淋。

64. 患者男性，65岁，排尿不畅3年，加重1个月，小便点滴而出，小腹胀痛，腰膝酸痛，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉沉细无力，应诊为

- A. 淋证
- B. 关格
- C. 少尿
- D. 腰痛
- E. 癃闭

64. E

解析：癃闭的诊断要点以排尿困难为主要表现，小便不利，点滴不畅为主，而患者有排尿不畅3年，加重1个月，小便点滴而出等

特征，无淋漓涩痛，小腹拘急特点，可以排除淋证，两者易混淆。故辨证为癃闭。

65. 患者精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸，舌淡苔薄白，脉弦细。其治法是

- A. 益气养血
- B. 补肾宁心
- C. 养心安神
- D. 解郁化痰
- E. 疏肝解郁

65. C

解析：患者精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸等症辨证属于郁证之心神失养证，其治法为甘润缓急，养心安神。

66. 患者男，65岁，患痰饮病，症见喘促，动则尤甚，气短，咳而痰多，食少胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，小便不利，足跗浮肿，舌体胖大，质淡，苔白润，脉沉细而滑，辨证应属

- A. 支饮寒饮伏肺证
- B. 溢饮表寒里饮证
- C. 痰饮脾阳虚弱证
- D. 支饮脾肾阳虚证
- E. 悬饮饮停胸胁证

66. D

解析：支饮之脾肾阳虚证；证候主症：喘促动则为甚，心悸，气短，或咳而气怯，痰多，食少，胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，脐下动悸，小便不利，足跗浮肿，或吐涎沫而头目昏眩，舌体胖大，质淡，苔白润或腻，脉沉细而滑。

67. 患者烦渴多饮半月余，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉洪数有力。治则宜用

- A. 清热润肺，生津止渴
- B. 养阴润肺，生津止渴
- C. 清胃泻火，养阴保津
- D. 滋阴固肾，生津止渴
- E. 滋养胃阴，生津止渴

67. A

解析：上消之肺热津伤证。证候主症：口渴多饮，口干舌燥，尿频量多，烦热多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。治法：清热润肺，生津止渴。

68. 患者午后或夜间发热，自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不欲多饮，肢体疼痛，面色萎黄，舌有瘀点，脉弦。辨证应

属 A. 阴虚发热证

B. 气虚发热证

C. 血虚发热证

D. 血瘀发热证

E. 气郁发热证

68. D

解析：内伤发热之血瘀发热证证候主症：午后或夜晚发热，或自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不多饮，肢体或躯干有固定痛处或肿块，面色萎黄或晦暗，舌质青紫或有瘀点、瘀斑，脉弦或涩。

69. 患者午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。辨证应属

A. 阴虚发热证

B. 气虚发热证

C. 血虚发热证

D. 血瘀发热证

E. 气郁发热证

69. A

解析：内伤发热之阴虚发热证。证候主症：午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。

70. 患者，女，60岁。年老体虚，近1年来，心悸气短，劳则尤甚，自汗面色㿔白，头昏神疲，肢体无力，舌苔淡白，脉细软弱。治疗本病的首选方剂是

A. 天王补心丹

B. 养心汤

C. 大补元煎

D. 七福饮

E. 加味四君子汤

答案：D

解析：心气虚证主症：心悸、气短，劳则尤甚，神疲体倦，自汗，舌质淡，脉弱。其首选方剂为七福饮。

71. 某患者，肢体关节疼痛较剧，部位固定，遇寒痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，舌质淡，苔薄白，脉弦紧，治疗方剂宜选

A. 防风汤

B. 双合汤

C. 薏苡仁汤

D. 乌头汤

E. 宣痹汤

71. D

解析：痛痹证候主症：肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。治法：散寒通络，祛风除湿。代表方：乌头汤加减。

72. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选

A. 独活寄生汤

B. 蠲痹汤

C. 薏苡仁汤

D. 乌头汤

E. 白虎加桂枝汤

72. C

解析：着痹。证候主症：肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁，舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。治法：除湿通络，祛风散寒。代表方：薏苡仁汤加减。

73. 李某，女性，75岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是

A. 地黄饮子

B. 黄连温胆汤

C. 龟鹿二仙膏合大定风珠

D. 导痰汤合羚角钩藤汤

E. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减

73. D

解析：颤证之痰热风动证证候主症：头摇不止，肢麻震颤，重则手不能持物，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，甚则口吐痰涎，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治法：清热化痰，平肝息风。代表方：导痰汤合羚角钩藤汤加减。

74. 腰痛患者，腰部冷痛重着，转侧不利，静卧痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。其证候是

- A. 寒湿腰痛
- B. 风寒腰痛
- C. 瘀血腰痛
- D. 湿热腰痛
- E. 肾虚腰痛

74. A

解析：寒湿腰痛。证候主症：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

75. 患者大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后疲乏，面色苍白，舌淡嫩苔薄，脉虚。其治法是

- A. 补脾和胃
- B. 温阳通便
- C. 益气补肺
- D. 温中健脾
- E. 益气润肠

75. E

解析：患者表现大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后疲乏，面色苍白，舌淡嫩苔薄，脉虚等是气虚秘的特点，其治法为益气润肠通便。

76. 某男，60岁，咳喘胸满，但坐不得卧，喉间痰鸣如拽锯，咯痰黏腻难出，舌苔厚浊，脉象滑实。治疗方剂宜首选

- A. 小青龙汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 三子养亲汤
- D. 定喘汤
- E. 以上都不是

76. C

解析：风痰哮证证候主症：喉中痰涎壅盛，声如拽锯，或鸣声如吹哨笛，喘急胸满，但坐不得卧，咳痰黏腻难出，或为白色泡沫痰液，无明显寒热倾向，面色青暗，起病多急，常倏忽来去，发前自觉鼻、咽、眼、耳发痒，喷嚏，鼻塞，流涕，胸部憋塞，随之迅即发作，舌苔厚浊，脉滑实。治法：祛风涤痰，降气平喘。

代表方：三子养亲汤加味。77. 患者呃声沉缓，膈间及胃脘不舒，遇寒加剧，得热则减，舌苔白润，脉沉缓，证属A. 胃寒呃逆

B. 阴虚呃逆

- C. 阳虚呃逆
- D. 胃热呃逆
- E. 以上都不是

77. A

解析：呃逆之胃寒气逆证；证候主症：呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，遇寒更甚，进食减少，喜食热饮，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。

78. 患者肺胀病史20年，呼吸浅促难续，声低气怯，倚息不能平卧，胸闷如室，心慌，咳痰不爽，脉沉数无力。治疗应首选

- A. 金匱肾气丸
- B. 平喘固本汤
- C. 真武汤
- D. 大补元煎
- E. 七味都气丸

78. B

解析：患者有肺胀病史20年，其主症是呼吸浅促难续，声低气怯，倚息不能平卧，胸闷如室，心慌，与肺胀之肺肾气虚证同，治法是补肺纳肾，降气平喘，选方平喘固本汤合补肺汤加减。

79. 王某，男性，75岁。反复咳喘30年多。

现症：咳吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，舌质淡，脉虚弱。其治疗应首选

- A. 麻黄升麻汤
- B. 生姜甘草汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 七味都气丸
- E. 麦门冬汤

79. B

解析：肺痿之虚寒证。证候主症：咯吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，或遗尿，舌质淡，脉虚弱。治法：温肺益气。代表方：甘草干姜汤或生姜甘草汤加减。

80. 患者突发眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳、郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。证属

A. 肝肾亏虚

- B. 痰火上扰
- C. 痰瘀阻窍
- D. 肝阳上亢
- E. 气血亏虚

80. D

解析：眩晕之肝阳上亢证证候主症：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。

81. 刘某，女，34岁。有痫证病史16年。

近1年来，痫证发作日益频繁，自觉发作后神疲乏力，平素头晕目眩，心悸，失眠多梦，纳呆，大便溏薄，舌苔腻，脉细弱无力。治法当为

- A. 补益气血，健脾宁心
- B. 补益心肾，健脾化痰
- C. 健脾补肾，健脑宁神
- D. 平肝健脾，补肾宁神
- E. 平肝息风，健脾补肾

81. A

解析：痫病之心脾两虚证。证候主症：反复发痫不愈，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。治法：补益气血，健脾宁心。

82. 患者突然跌倒，神志不清，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，口中如作猪羊叫声，移时苏醒，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 导痰汤
- C. 二阴煎
- D. 涤痰汤
- E. 控涎丹

82. A

解析：痫病之风痰闭阻证；证候主症：发病前常有眩晕，头昏，胸闷，乏力，痰多，心情不悦。发作呈多样性，或见突然跌倒，神志不清，抽搐吐涎，或伴尖叫与二便失禁，或短暂神志不清，双目发呆，茫然所失，谈话中断，持物落地，或精神恍惚而无抽搐，舌质红，苔白腻，脉多弦滑有力。治法：涤痰息风，开窍定痫。代表方：定痫丸加减。

83. 某男，70岁，大便艰涩，排出困难，腹中冷痛，面色皤白，四肢不温，畏寒喜暖，

小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗本病，除主穴外，还应加用

- A. 合谷、内庭
- B. 太冲、中脘
- C. 脾俞、气海
- D. 神阙、关元
- E. 足三里、三阴交

83. D

解析：根据题干症状辨证为便秘之冷秘。针灸治疗宜配神阙、关元。

84. 某男，50岁，腹泻2年。晨起即腹痛，泻后痛减，腹冷喜暖，精神疲乏，腰酸腿软，四肢发冷，舌淡，苔白，脉沉细。治疗除神阙、天枢、足三里、公孙外，应加用

- A. 阴陵泉、命门
- B. 阴陵泉、脾俞
- C. 脾俞、太白
- D. 肾俞、关元
- E. 下脘、关元

84. D

解析：根据题干症状辨证为：肾阳虚衰之泄泻。泄泻的配穴：脾气虚弱配脾俞、太白；肾阳虚衰配肾俞、关元；肝气乘脾配肝俞、太冲。久泻虚陷者配百会。

85. 某男，63岁，头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

85. D

解析：根据题干症状诊断为：眩晕虚证之肾精不足证。主穴：百会、风池、肝俞、肾俞、足三里。配穴：肾精不足配太溪、悬钟、三阴交。

86. 某男，37岁，最近工作压力较大，出现心慌心跳，头晕目眩，少寐，腰酸，盗汗，舌红，脉细数。治疗除主穴外，宜加取

- A. 肾俞、太溪
- B. 肾俞、中渚

- C. 肾俞、大陵
- D. 膻中、气海
- E. 膻中、大陵

86. A

解析：根据题干症状，诊断为：心悸之阴虚火旺证。心悸针灸配穴：心胆虚怯配胆俞；心脾两虚配脾俞、足三里；阴虚火旺配太溪、肾俞；水气凌心配气海、阴陵泉；心脉瘀阻配膻中、膈俞。

87. 患者，男，37岁，右上腹痛，阵发性加剧，并向右肩部放射，伴有恶心、呕吐，针灸取穴除阳陵泉、日月外，还可用

- A. 胆囊穴、胆俞
- B. 阑尾穴、中脘
- C. 胆囊穴、京门
- D. 中脘、天枢
- E. 梁丘、太冲

87. A

解析：根据题干症状诊断为：胆绞痛。胆绞痛的针灸治疗：主穴：胆囊穴、阳陵泉、胆俞、日月。

88. 某女，36岁，经血淋漓不净30天，血色淡，质稀薄，伴面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔白，脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外，应加取

- A. 肾俞、命门
- B. 然谷、太溪
- C. 百会、脾俞
- D. 隐白、血海
- E. 隐白、地机

88. C

解析：崩漏虚证的针灸治疗：主穴：气海、三阴交、肾俞、足三里。配穴：脾虚配百会、脾俞；肾虚配肾俞、太溪。

89. 某女，20岁，食海鲜后皮肤出现大小不等，形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。除曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交外，应加取

- A. 外关、风池
- B. 足三里、天枢
- C. 三阴交、天枢
- D. 足三里、大横
- E. 三阴交、风池

89. B

解析：根据题干症状诊断为瘾疹胃肠积热证，针灸治疗宜配天枢、足三里。

90. 某男，75岁，咽喉微感疼痛，色暗红，入夜尤甚。针灸治疗主穴选取

- A. 尺泽、合谷、少商、照海
- B. 关冲、合谷、少商、列缺
- C. 关冲、厉兑、鱼际、内庭
- D. 太溪、照海、鱼际、列缺
- E. 太溪、曲池、鱼际、合谷

90. D

解析：根据题干症状诊断为咽喉肿痛虚证。咽喉肿痛虚证的针灸治疗：主穴：太溪、照海、列缺、鱼际。

91. 某女，53岁，右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取

- A. 外关、风池
- B. 内庭、二间
- C. 太溪、行间
- D. 风池、侠溪
- E. 风池、太冲

91. C

解析：根据题干症状诊断为牙痛之虚火牙痛。牙痛的针灸处方：主穴：合谷、颊车、下关。配穴：风火牙痛配外关、风池；胃火牙痛配内庭、二间；虚火牙痛配太溪、行间。

92. 某男，40岁，阑尾手术后，出现小便闭塞不通，努责无效，小腹满痛，舌紫暗，脉涩。除秩边、阴陵泉、三阴交、中极、膀胱俞外，应加取

- A. 委阳、曲骨
- B. 太冲、大敦
- C. 次髎、血海
- D. 曲骨、太冲
- E. 次髎、太冲

92. C

解析：根据题干症状诊断为：癃闭之浊瘀阻塞证。针灸治疗：浊瘀阻塞配次髎、血海。

93. 患儿，男，8岁。平时注意力不集中、冲动任性，急躁易怒，五心烦热，潮热盗汗，舌红苔黄脉细数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 心俞、脾俞

- B. 阴郄、复溜
- C. 照海、神庭
- D. 中脘、足三里
- E. 三阴交、太冲

93. E

解析：根据患者主症，诊断为小儿多动症之阴虚阳亢。小儿多动症的主穴：印堂、四神聪、太溪、风池、神门、内关。配穴：阴虚阳亢配三阴交、太冲；心脾两虚配心俞、脾俞；烦躁不安配照海、神庭；记忆力差配悬钟；盗汗配阴郄、复溜；纳少配中脘、足三里；遗尿配中极、膀胱俞。

94. 患者，男，24岁。长期在电脑前工作，近来出现颈项强痛，活动受限，昨日因感受风寒后，症状加重，疼痛更加明显。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 膈俞、合谷
- B. 合谷、列缺
- C. 合谷、手三里
- D. 百会、四神聪
- E. 肝俞、肾俞

94. B

解析：结合题干给出的信息，患者诊断为颈椎病之外邪内侵证。颈椎病的主穴：颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴。配穴：病在太阳经配申脉；病在少阳经配外关；病在阳明经配合谷；病在督脉配后溪。外邪内侵配合谷、列缺；气滞血瘀配膈俞、合谷；肝肾不足配肝俞、肾俞。上肢麻痛配合谷、手三里；头晕头痛配百会或四神聪；恶心、呕吐配中脘、内关；耳鸣、耳聋配听宫、外关。

95. 患者，男，50岁。腰部疼痛10余年，有劳伤史，久坐加重，病处固定不移。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 膈俞
- B. 肾俞
- C. 膏肓
- D. 腰阳关
- E. 环跳

95. A

解析：结合题干给出的信息，该患者辨证为瘀血腰痛。腰痛主穴：大肠俞、阿是穴、委中。配穴：督脉病证配后溪；足太阳经证配

申脉；腰椎病变配腰夹脊。寒湿腰痛配命门、腰阳关；瘀血腰痛配膈俞、次髎；肾虚腰痛配肾俞、太溪。

96. 患者，女性，50岁。月经紊乱，潮热出汗，心悸，情绪不稳定，兼头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，口干，小便黄，舌红，苔少，脉数者，治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 行间、侠溪
- B. 太溪、太冲
- C. 膻中、期门
- D. 照海、阴谷
- E. 三阴交、太溪

96. D

解析：根据题干给出的信息，患者诊断为绝经前后诸证之肾阴虚证。绝经前后诸证的主穴：肾俞、肝俞、太溪、气海、三阴交。配穴为肾阴虚配照海、阴谷；肾阳虚配关元、命门；肝阳上亢配风池、太冲；痰气郁结配中脘、丰隆。

97. 患者，女，23岁。痛经9个月，经行不畅，小腹胀痛，拒按，经色紫红，夹有血块，血块下后痛即缓解，脉沉涩。治疗应首选A. 足三里、太冲、三阴交

- B. 中极、次髎、地机
- C. 合谷、三阴交
- D. 曲池、内庭
- E. 合谷、归来

97. B

解析：根据题干主症判断为痛经，由“小腹胀痛，拒按，经色紫红，夹有血块”判断为实证痛经。主穴：中极、次髎、地机、三阴交、十七椎。中极为任脉穴，与足三阴经相交，可通调冲任，理下焦之气；次髎为治疗痛经的经验穴；地机为脾经郄穴，善于治痛治血，取之能行气活血止痛；三阴交为足三阴经交会穴，能调理肝、脾、肾，活血止痛。

98. 患儿，男，10岁。上课时小动作多，注意力涣散，自我控制能力差，情绪不稳定。针灸治疗应选取的经脉是

- A. 督脉、手少阴、手厥阴经
- B. 任脉、手少阴、足少阴经

- C. 任脉、手少阴、手厥阴经
- D. 督脉、足少阴、足厥阴经
- E. 手少阴、足少阴经

98. A

解析：根据患者主症，诊断为小儿多动症。小儿多动症病位在心、脑，基本病机是髓海空虚，元神失养；或气血不足、心神失养。针对小儿多动症的治法是调和阴阳，安神定志。应取督脉及手少阴、手厥阴经穴为主。

99. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

99. A

解析：根据题干给出的信息，该患者诊断为痹证之痛痹。痹证的处方主穴：阿是穴、局部经穴。配穴：行痹配膈俞、血海；痛痹配肾俞、关元；着痹配阴陵泉、足三里；热痹配大椎、曲池。另可根据疼痛的部位循经配穴。

100. 患者，女，30岁，今日发现乳房胀痛，有肿块。伴有急躁易怒，肿块和胀痛随喜怒消长，舌红，苔黄，脉弦滑。治疗除主穴外，还应选择配穴

- A. 足三里、丰隆
- B. 肝俞、肾俞
- C. 关元、肾俞
- D. 肝俞、内关
- E. 丰隆、中脘

100. D

解析：根据题干给出的信息，患者诊断为乳癖之肝郁气滞证。乳癖的主穴：膻中、乳根、屋翳、期门、足三里、太冲。配穴：肝郁气滞配肝俞、内关；痰浊凝结配丰隆、中脘；冲任失调配关元、肝俞、肾俞。

101. 患者，男性，35岁，咽喉红肿疼痛，吞咽困难，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉数。针灸治疗应选取

- A. 鱼际、合谷、少商、照海
- B. 关冲、合谷、尺泽、列缺
- C. 关冲、少商、鱼际、内庭
- D. 太溪、照海、鱼际、列缺
- E. 少商、曲池、鱼际、尺泽

101. C

解析：根据题干症状诊断为咽喉肿痛实证之肺胃热盛证。咽喉肿痛实证的针灸治疗：主穴：少商、合谷、尺泽、关冲。配穴：外感风热配风池、外关；肺胃热盛配内庭、鱼际。

102. 患者，男，45岁。大便秘结不通，排便艰难，伴腹胀痛，身热，口干口臭，喜冷饮，舌红，苔黄，脉滑数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 中脘、太冲
- B. 神阙、关元
- C. 足三里、脾俞
- D. 合谷、曲池
- E. 气海、脾俞

102. D

解析：根据题干给出的信息，患者诊断为便秘之热秘证。便秘的主穴：天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。配穴：热秘配合谷、曲池；气秘配太冲、中脘；冷秘配神阙、关元；虚秘配足三里、脾俞、气海，兼阴伤津亏者加照海、太溪。

三、A3型选择题（103~120题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（103~105题共用题干）

患者，男，37岁，阳痿不举，心悸，失眠多梦，神疲乏力，面色萎黄，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡，苔薄白，脉细弱。

103. 该病诊断为阳痿什么证型

- A. 心脾亏虚
- B. 肝郁不舒
- C. 命门火衰
- D. 肺肾亏虚
- E. 脾肾亏虚

104. 治法是

- A. 温肾壮阳
- B. 补脾益肾
- C. 益肾宁神
- D. 疏肝解郁
- E. 补益心脾

105. 代表方剂是

- A. 赞育丸
- B. 归脾汤
- C. 启阳娱心丹
- D. 济生肾气丸
- E. 无比山药丸

103. A

104. E

105. B

解析：阳痿 - 心脾亏虚证。证候表现：阳痿不举，心悸，失眠多梦，神疲乏力，面色萎黄，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡，苔薄白，脉细弱。治法：补益心脾。代表方：归脾汤。

(106~108 题共用题干)

患者常出现心悸气短，头晕目眩，平时失眠健忘，现面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

106. 该病病机分析是

- A. 气血亏损，心虚胆怯，心神失养
- B. 心血亏耗，心失所养，心神不宁
- C. 脾肾阳虚，水饮内停，上凌于心，扰乱心神
- D. 心阳虚衰，无以温养心神
- E. 肝肾阴虚，水不济火，心火内动，扰动心神

107. 该病选方为

- A. 炙甘草汤
- B. 桃仁红花煎
- C. 安神定志丸
- D. 苓桂术甘汤
- E. 归脾汤

108. 若热病后期损及心阴而心悸者，以

- A. 生脉散
- B. 炙甘草汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 苓桂术甘汤

106. B

107. E

108. A

解析：心悸——心血不足证

证候：心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

证机概要：心血亏耗，心失所养，心神不宁。治法：补血养心，益气安神。

代表方：归脾汤加减。

常用药：黄芪、人参、白术、炙甘草、熟地黄、当归、龙眼肉、茯神、远志、酸枣仁、木香。

加减：若五心烦热，自汗盗汗，胸闷心烦，舌红少苔，脉细数或结代，为气阴两虚，治以益气养血，滋阴安神，用炙甘草汤加减；失眠多梦，加合欢皮、夜交藤、五味子、柏子仁、莲子心等养心安神；若热病后期损及心阴而心悸者，以生脉散加减，有益气养阴补心之功。

(109~111 题共用题干)

患者女，呃声低长无力，气不得续，自觉脘腹不舒，喜温喜按，面色㿔白，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

109. 该病诊断为

- A. 呃逆
- B. 反胃
- C. 噎气
- D. 胃痞
- E. 干呕

109. A

解析：

110. 治法应为

- A. 温中散寒，降逆止呃
- B. 温补脾胃，降逆止呃
- C. 清胃泄热，降逆止呃
- D. 顺气解郁，和胃降逆
- E. 养胃生津，降逆止呃

110. B

解析：

111. 若呃声难续，气短乏力，中气大亏者，可改用

- A. 参苓白术散
- B. 理中丸
- C. 生脉散
- D. 人参养荣汤

E. 补中益气汤

111. E

解析：呃逆——脾胃阳虚证证候：呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒，喜温喜按，面色㿔白，手足不温，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。证机概要：中阳不足，胃失和降，虚气上逆。治法：温补脾胃，降逆止呃。代表方：理中丸加减。加减：若噎腐吞酸，夹有食滞者，可加神曲、麦芽消食导滞；若脘腹胀满，脾虚气滞者，可加法半夏、陈皮理气化浊；若呃声难续，气短乏力，中气大亏者，可加黄芪、党参或改用补中益气汤；若病久及肾，肾阳亏虚，形寒肢冷，腰膝酸软，呃声难续者，为肾失摄纳，可加肉桂、补骨脂、山萸肉、刀豆子补肾纳气。

(112~114 题共用题干)

患者，女，35岁，偶然发现结块肿大，质软不痛，颈部觉胀，胸闷，喜太息，或兼胸胁窜痛，病情常随情志波动，苔薄白，脉弦。

112. 属中医的

- A. 梅核气
- B. 瘰疬
- C. 癭瘤
- D. 郁证
- E. 失荣

113. 辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝肾不足证
- C. 痰结血瘀证
- D. 气郁痰阻证
- E. 冲任失调证

114. 治疗应选代表方剂为

- A. 一贯煎
- B. 栀子清肝汤
- C. 海藻玉壶汤
- D. 开郁散
- E. 四海舒郁丸

112. B

113. D

114. E

解析：瘰疬之气郁痰阻证。证候表现：结块肿大，质软不痛，颈部觉胀，胸闷，喜太息，或兼胸胁窜痛，病情常随情志波动，苔薄白，

脉弦。治法：理气舒郁，化痰消瘿。代表方：四海舒郁丸。

(115~118 题共用题干)

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

115. 其病证候是

- A. 风燥伤肺证
- B. 痰热伤肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 风寒袭肺证
- E. 风热犯肺证

116. 其治法是

- A. 疏风清肺，润燥止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 清肺泻肝，顺气降火
- E. 清热肃肺，豁痰止咳

117. 治疗应首选

- A. 三拗汤合止嗽散加减
- B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减
- C. 桑杏汤加减
- D. 清金化痰汤加减
- E. 桑菊饮加减

118. 若素有寒饮伏肺，兼见咳嗽上气，痰液清稀，胸闷气急，舌淡红，苔白而滑，脉浮紧者，可改投

- A. 沙参麦冬汤
- B. 二陈平胃散
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤加减
- E. 小青龙汤

115. D

116. B

117. A

118. E

解析：咳嗽之风寒袭肺证。证候主症：咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，或见恶寒、发热、无汗等风寒表证，舌苔薄白，脉浮或浮紧。治法：疏风散寒，宣肺止咳。代表方：三拗汤合止嗽散加减。加减：若素有寒饮伏肺，兼见咳嗽上气，痰液清稀，胸闷气急，舌淡红，

苔白而滑，脉浮者或弦滑者，治以疏风散寒，温化寒饮，可改投小青龙汤。

(119~120 题共用题干)

患者，女，43岁。小便不畅或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌红，苔薄黄，脉数。

119. 该病治法为

- A. 升清降浊，化气行水
- B. 清泄肺热，通利水道
- C. 疏利气机，通利小便
- D. 行瘀散结，通利水道
- E. 清利湿热，通利小便

120. 若出现肺阴不足者，可加哪些药

- A. 生地黄、车前子、牛膝
- B. 黄芪、丹参、当归
- C. 丹皮、山梔
- D. 沙参、黄精、石斛
- E. 车前子、通草、制大黄

119. B

120. D

解析：癃闭之肺热壅盛证。证候：小便不畅或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌红，苔薄黄，脉数。治法：清泄肺热，通利水道。代表方：清肺饮加减。加减：有鼻塞、头痛、脉浮等表证者，加薄荷、桔梗宣肺解表；肺阴不足者加沙参、黄精、石斛；兼尿赤灼热、小腹胀满者，合八正散上下并治。

四、B1型选择题(121~150题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~123 题共用备选答案)

- A. 玉屏风散
- B. 补中益气汤
- C. 再造散
- D. 参苏饮
- E. 加减葶藶汤

121. 气虚感冒的代表方宜首选

122. 阳虚感冒的代表方宜首选

123. 阴虚感冒的代表方宜首选

121. D

解析：气虚感冒

证候主症：恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

治法：益气解表。代表方：参苏饮加减。

122. C

解析：见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚感冒，当助阳解表，用再造散加减。

123. E

解析：阴虚感冒

证候主症：身热，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴解表。代表方：加减葶藶汤化裁。

(124~125 题共用备选答案)

A. 二陈汤合三子养亲汤

B. 清金化痰汤

C. 桑杏汤

D. 黛蛤散合黄芩泻白散

E. 三拗汤合止嗽散

124. 治疗肝火犯肺型咳嗽的代表方剂是

125. 治疗痰湿蕴肺型咳嗽的代表方剂是

124. D

解析：咳嗽之肝火犯肺证。证候主症：咳嗽呈阵发性，表现为上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。治法：清肺泻肝，顺气降火。代表方：黛蛤散合黄芩泻白散加减。

125. A

解析：咳嗽之痰湿蕴肺证。证候主症：咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，因痰而嗽，痰出咳平，痰黏腻或稠厚成块，色白或带灰色，每于早晨或食后则咳甚痰多，进甘甜油腻食物加重，胸闷脘痞，呕恶食少，体倦，大便时溏，舌苔白腻，脉象濡滑。治法：燥湿化痰，理气止咳。代表方：二陈平胃散合三子养亲汤加减。

(126~128 题共用备选答案)

A. 养血祛风通络

- B. 平肝潜阳, 活血通络
- C. 息风化痰, 活血通络
- D. 化痰息风, 宣郁开窍
- E. 回阳救阴, 益气固脱

126. 中风中脏腑脱证的治法是
127. 中风中脏腑风痰瘀阻证的治法是
128. 中经络风阳上扰证的治法是

126. E

解析: 中风中脏腑脱证。证候主症: 突然昏仆, 不省人事, 目合口张, 鼻鼾息微, 手撒肢冷, 汗多, 大小便自遗, 肢体软瘫, 舌痿, 脉细弱或脉微欲绝。治法: 回阳救阴, 益气固脱。

127. C

解析: 中风中脏腑风痰瘀阻证。证候主症: 头晕头痛, 手足麻木, 突然口眼歪斜, 语言不利, 口角流涎, 舌强语蹇, 甚则半身不遂。兼见手足拘挛, 舌质紫暗, 或有瘀斑, 舌苔薄白, 脉弦涩或小滑。治法: 息风化痰, 活血通络。

128. B

解析: 中经络风阳上扰证。证候主症: 平素头晕头痛, 耳鸣目眩, 突然发生口眼歪斜, 舌强语蹇, 或手足重滞, 甚则半身不遂等症, 舌质红苔黄, 脉弦。治法: 平肝潜阳, 活血通络。

(129~130 题共用备选答案)

- A. 千金苇茎汤合如金解毒散
- B. 银翘散
- C. 葶苈大枣泻肺汤
- D. 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎
- E. 加味桔梗汤

129. 肺痈初期应选

130. 肺痈成痈期应选

129. B

解析: 肺痈初期

证候主症: 恶寒发热, 咳嗽, 咯白色黏痰, 痰量日渐增多, 胸痛, 咳则痛甚, 呼吸不利, 口干鼻燥, 舌苔薄黄, 脉浮数而滑。

治法: 疏风散热, 清肺化痰。

代表方: 银翘散加减。

130. A

解析: 肺痈成痈期

证候主症: 身热转甚, 时时振寒, 继则壮热,

汗出烦躁, 咳嗽气急, 胸满作痛, 转侧不利, 咳吐浊痰, 呈黄绿色, 自觉喉间有腥味, 口干咽燥, 舌苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清肺解毒, 化痰消痈。

代表方: 《千金》苇茎汤合如金解毒散加减。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 痫病
- B. 眩晕
- C. 厥证
- D. 昏迷
- E. 中风

131. 突然昏仆, 并伴有口眼喎斜、偏瘫等症, 神昏时间较长, 苏醒后有偏瘫、口眼喎斜及失语等后遗症。此为

132. 头晕目眩, 视物旋转不定, 甚则不能站立, 耳鸣, 但无神志异常的表现。此为

133. 突然昏仆, 不省人事, 但发作时间短暂, 且发作时常伴有号叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等。常反复发作, 每次症状均相类似, 苏醒缓解后可如常人。此为

131. E

解析: 中风是以猝然昏仆, 不省人事, 半身不遂, 口眼歪斜, 语言不利为主症的病证。

132. B

解析: 眩是指眼花或眼前发黑, 晕是指头晕甚或感觉自身或外界景物旋转。二者常同时并见, 故统称为“眩晕”。轻者闭目即止; 重者如坐车船, 旋转不定, 不能站立, 或伴有恶心、呕吐、汗出, 甚则昏倒等症。

133. A

解析: 痫病是一种发作性神志异常的病证。临床以突然意识丧失, 甚则仆倒, 不省人事, 强直抽搐, 口吐涎沫, 两目上视或口中怪叫为特征, 移时苏醒, 一如常人为特征。发作前可伴眩晕、胸闷等先兆, 发作后常有疲倦乏力等症。

(134~135 题共用备选答案)

- A. 肺卫不固证
- B. 心血不足证
- C. 阴虚火旺证
- D. 邪热郁蒸证
- E. 脾胃虚弱证

134. 汗证，汗出恶风，稍劳汗出尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华，苔薄白，脉细弱。辨证应属

135. 汗证，自汗或盗汗，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。辨证应属

134. A

解析：汗证之肺卫不固证。证候主症：汗出恶风，稍劳汗出尤甚，或表现半身、某一局部出汗，易于感冒，体倦乏力，周身酸楚，面白少华，舌苔薄白，脉细弱。

135. B

解析：汗证之心血不足证。证候主症：自汗或盗汗，心悸少寐，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。

(136~137 题共用备选答案)

- A. 心阳虚证
- B. 心气虚证
- C. 肾气虚证
- D. 肾阳虚证
- E. 阴虚证

136. 七福饮治疗虚劳的证型为

137. 大补元煎治疗虚劳的证型为

136. B

解析：虚劳之心气虚证。证候主症：心悸，气短，劳则尤甚，神疲体倦，自汗。治法：益气养心。代表方：七福饮加减。

137. C

解析：虚劳之肾气虚证。证候主症：神疲乏力，腰膝酸软，小便频数而清，白带清稀，舌质淡，脉弱。治法：益气补肾。代表方：大补元煎加减。

(138~140 题共用备选答案)

- A. 病起发热，皮肤干燥，咳呛少痰
- B. 肢体困重，手足麻木，喜凉恶热
- C. 神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言
- D. 腰膝酸软，眩晕耳鸣，咽干干燥
- E. 手足麻木不仁，四肢青筋显露，舌痿不能伸缩

138. 痿证之湿热浸淫证症见

139. 痿证之脉络瘀阻证症见

140. 痿证之脾胃虚弱证症见

138. B

解析：痿证之湿热浸淫证。证候主症：起病较缓，逐渐出现肢体困重，痿软无力，尤以

下肢或两足痿弱为甚，兼见微肿，手足麻木，扪及微热，喜凉恶热，或有发热，胸脘痞闷，小便赤涩热痛，舌质红，舌苔黄腻，脉濡数或滑数。

139. E

解析：痿证之脉络瘀阻证。证候主症：久病体虚，四肢痿弱，肌肉瘦削，手足麻木不仁，四肢青筋显露，可伴有肌肉活动时隐痛不适，舌痿不能伸缩，舌质暗淡或有瘀点、瘀斑，脉细涩。

140. C

解析：痿证之脾胃虚弱证。证候主症：起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色皖白或萎黄无华，面浮，舌淡，苔薄白，脉细弱。

(141~142 题共用备选答案)

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

141. 足三阳经的循行走向规律是

142. 手三阴的循行走向规律是

141. D

解析：十二经脉的循行走向规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。

142. A

解析：十二经脉的循行走向规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。

(143~144 题共用备选答案)

- A. 下脘
- B. 建里
- C. 中极
- D. 上脘
- E. 关元

143. 位于前正中线上，脐上 3 寸的腧穴是

144. 位于前正中线上，脐上 5 寸的腧穴是

143. B

解析：位于前正中线上，脐上 3 寸的腧穴是：建里。

144. D

解析：位于前正中线上，脐上 5 寸的腧穴是：上脘。

（145~146 题共用备选答案）

- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
- B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短
- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔

145. 属于提插补法操作的是

146. 属于开阖补法操作的是

145. B

解析：提插补泻操作：①补法：针下得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法；②泻法：针下得气后，先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

146. E

解析：开阖补泻操作：①补法：出针后迅速揉按针孔为补法；②泻法：出针时摇大针孔而不按为泻法。

（147~148 题共用备选答案）

- A. 手太阴、手太阳经穴
- B. 手太阴、足太阴经穴
- C. 手太阴、手阳明经穴
- D. 手太阴、足太阳经穴
- E. 手太阴、手少阳经穴

147. 外感咳嗽，宜选用

148. 内伤咳嗽，宜选用

147. C

解析：咳嗽的治法：①外感咳嗽：疏风解表，宣肺止咳。取手太阴、手阳明经穴为主。②内伤咳嗽：肃肺理气，止咳化痰。取手、足太阴经穴为主。

148. B

解析：解析同上。

（149~150 题共用备选答案）

- A. 陷下则灸之
- B. 热则疾之
- C. 寒则留之
- D. 标本同治
- E. 三因制宜

149. 以上哪项属于补虚泻实的治疗原则

150. 以上哪项属于治病求本的治疗原则

149. A

解析：补虚泻实包括三方面的含义：①虚则补之，陷下则灸之；②实则泻之，菀陈则除之；③不盛不虚以经取之。

150. D

解析：治病求本包括三方面的含义：①急则治标；②缓则治本；③标本同治。

第四单元

一、A1 型选择题（1~54 题）

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 产后浆液性恶露的持续天数是

A. 3~4

B. 5~6

C. 7~10

D. 10~12

E. 12~14

1. C

解析：恶露是产后自子宫排出的余血浊液，先是暗红色的血性恶露，也称红恶露，约持续 3~4 天干净；后渐变淡红，量由多渐少，称为浆液性恶露，约 7~10 天干净；继后渐为不含血色的白恶露，约 2~3 周干净。如果血性恶露 10 天以上仍未干净，应考虑子宫复旧不良或感染，当予以诊治。

2. 下列哪项不属于月经病的临床表现

A. 月经周期缩短，不及 20 天

B. 月经周期正常，经量明显增多

C. 月经 40~60 天一行，或 3~5 个月一行

D. 行经期不足 2 天或超过 7 天以上

E. 月经常每两月来潮一次，无不适

2. E

解析：月经病是妇科临床的常见病，分两类。一是以月经的周期、经期、经量异常为主症的疾病；另一类是以伴随月经周期，或于经断前后出现明显症状为特征的疾病。E 选项身体无病而月经定期两个月来潮一次者，称为并月，属于月经的特殊生理现象。

3. 半夏白术天麻汤用于治疗经行头痛的证型为

- A. 血瘀证
- B. 肝火证
- C. 痰火上扰证
- D. 痰湿中阻证
- E. 肝阳上亢证

3. D

解析：经行头痛痰湿中阻证治法：燥湿化痰，通络止痛。方药：半夏白术天麻汤加葛根、丹参。

4. 经行泄泻主要责之于

- A. 肝脾虚弱
- B. 脾胃虚弱
- C. 脾肾虚弱
- D. 肝胃虚弱
- E. 肝肾虚弱

4. C

解析：经行泄泻的病因病机：本病的发生主要责之于脾肾虚弱。脾主运化，肾主温煦，为胃之关，主司二便。若二脏功能失于协调，脾气虚弱或肾阳不足，则运化失司，水谷精微不化，水湿内停。经行之际，气血下注冲任，脾肾益虚而致经行泄泻。

5. 下列各项，属产后三病的是

- A. 产后血晕、产后发热、产后腹痛
- B. 产后痉病、产后大便难、产后郁冒
- C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛
- D. 产后呕吐、泄泻、盗汗
- E. 产后冲心、冲肺、冲胃

5. B

解析：汉代《金匮要略·妇人产后病脉证治》指出：“新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难。”

6. 痛经气滞血瘀证的腹痛特点是

- A. 冷痛拒按
- B. 灼痛不适
- C. 隐隐作痛
- D. 胀痛拒按
- E. 绵绵作痛

答案：D

解析：痛经气滞血瘀证，主要证候：经前或经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，

血色紫暗有块，块下痛暂减；乳房胀痛，胸闷不舒；舌紫暗或有瘀点，脉弦。

7. 经行乳房胀痛胃虚痰滞证治法为

- A. 健胃祛痰，和胃通络
- B. 健胃祛痰，活血止痛
- C. 燥湿化痰，和胃通络
- D. 理气化痰，化瘀止痛
- E. 养胃益阴，活血止痛

7. B

解析：经行乳房胀痛胃虚痰滞证。治法：健胃祛痰，活血止痛。方药：四物汤合二陈汤去甘草。

8. 妊娠病的常见发病机理除外哪一项

- A. 阴血虚
- B. 脾肾虚
- C. 冲气上逆
- D. 气滞
- E. 瘀血内阻

8. E

解析：妊娠病的发病机理：（1）阴血虚；（2）脾肾虚；（3）冲气上逆；（4）气滞。

9. 导致崩漏的常见病因病机是

- A. 肾虚、脾虚、血热、血瘀
- B. 肾虚、脾虚、血热、血寒
- C. 肾虚、脾虚、肝郁、血瘀
- D. 肾虚、脾虚、肝郁、血热
- E. 肾虚、脾虚、湿热、血瘀

9. A

解析：崩漏的发病是肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴的严重失调。其主要病机是冲任不固，不能制约经血，使子宫藏泻失常。导致崩漏的常见病因有脾虚、肾虚、血热和血瘀。

10. 下列各项，不属于癥瘕主要病因的是

- A. 气滞血瘀
- B. 气虚血瘀
- C. 痰湿瘀结
- D. 湿热瘀阻
- E. 肾虚血瘀

答案：B

解析：癥瘕的主要病因有气滞血瘀、痰湿瘀结、湿热瘀阻和肾虚血瘀。

11. 产后三急是指

- A. 产后血晕、产后痉病、产后腹痛
- B. 产后病痉、产后大便难、产后郁冒

C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛

D. 产后呕吐、泄泻、盗汗

E. 产后冲心、冲肺、冲胃

11. D

解析：产后三急：产后诸病，惟呕吐、盗汗、泄泻为急，三者并见必危。B 选项为产后三病，E 选项为产后三冲。

12. 子门是指

A. 外阴

B. 阴道口

C. 阴道

D. 宫颈口

E. 子宫

12. D

解析：子门又名子户，指子宫颈口的部位。

12. 子门是指

A. 外阴

B. 阴道口

C. 阴道

D. 宫颈口

E. 子宫

12. D

解析：子门又名子户，指子宫颈口的部位。

13. 胎儿期易发生先天畸形的是

A. 妊娠早期 4 周

B. 妊娠早期 12 周

C. 妊娠中期 10 周

D. 妊娠中期 15 周

E. 妊娠晚期 13 周

答案：B

解析：妊娠早期 12 周的胚胎期，从受精卵细胞至基本形成胎儿，最易受到各种病理因素，如感染、药物、劳累、物理、营养缺乏以及不良心理因素等伤害，造成流产、死胎或先天畸形。

14. 小儿易产生感冒、咳喘，原因主要是

A. 脾常不足

B. 肺脏娇嫩

C. 肾常虚

D. 稚阳未充

E. 稚阴未长

14. B

解析：如肺主气、司呼吸，小儿肺脏娇嫩，表现为呼吸不匀、息数较促，易发感冒、咳喘。

15. 新生儿中药用量应为成人量的

A. 1 / 6

B. 1 / 3

C. 1 / 2

D. 2 / 3

E. 等量

15. A

解析：小儿用药剂量常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握，中药汤剂可采用下列比例用药：新生儿用成人量的 1 / 6，乳婴儿用成人量的 1 / 3，幼儿用成人量的 1 / 2，学龄期儿童用成人量的 2 / 3 或接近成人量。

16. 前囟关闭的时间为出生后

A. 2~4 个月

B. 4~6 个月

C. 6~12 个月

D. 12~18 个月

E. 18~24 个月

16. D

解析：前囟是额骨和顶骨之间的菱形间隙，以囟门对边中点间的连线距离表示，出生时约 1.5~20cm，至 12~18 个月闭合。

17. 下列属于病理性黄疸的是

A. 生后 24h 以内出现黄疸

B. 生后第 2~3 日出现黄疸，第 4~6 日达高峰

C. 足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退

D. 足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol} / \text{L}$

E. 小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状

17. A

解析：病理性黄疸：黄疸出现早（出生后 24 小时以内）、发展快（血清总胆红素每日上升幅度 $> 85.5 \mu\text{mol} / \text{L}$ 或每小时上升幅度 $> 8.5 \mu\text{mol} / \text{L}$ ）、程度重（足月儿血清总胆红素 $> 221 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，早产儿 $> 257 \mu\text{mol} / \text{L}$ ）、消退迟（黄疸持续时间足月儿 > 2 周，

早产儿>4周)或黄疸退而复现。伴随各种临床症状。

18. 反复呼吸道感染, 营卫失调证的主治方

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤
- C. 小青龙汤
- D. 黄芪桂枝五物汤
- E. 玉屏风散

18. D

解析: 反复呼吸道感染, 营卫失调证证候: 反复外感, 恶风、恶寒, 面色少华, 四肢不温, 多汗易汗, 舌淡红, 苔薄白, 脉无力, 指纹淡红。治法: 调和营卫, 益气固表。代表方剂: 黄芪桂枝五物汤。

19. 治疗脾虚泻的首选方是

- A. 保和丸
- B. 平胃散
- C. 参苓白术散
- D. 藿香正气散
- E. 附子理中汤

19. C

解析: 脾虚泻证。证候: 大便稀溏, 色淡不臭, 多于食后作泻, 时轻时重, 面色萎黄, 形体消瘦, 神疲倦怠, 舌淡苔白, 脉缓弱, 指纹淡。治法: 健脾益气, 助运止泻。代表方剂: 参苓白术散。

20. 患儿, 1岁6个月。体重9kg, 纳呆, 面色少华, 性急易怒, 大便干稀不调, 舌质淡, 苔薄微腻, 指纹淡。其诊断是

- A. 厌食
- B. 疳气
- C. 疳积
- D. 干疳
- E. 积滞

20. B

解析: 疳气证。证候: 形体略瘦, 面色少华, 毛发稀疏, 不思饮食, 精神欠佳, 性急易怒, 大便干稀不调, 舌质略淡, 苔薄微腻, 脉细有力。治法: 调脾健运。代表方剂: 资生健脾丸。

21. 病毒性心肌炎急性期应卧床休息的时间为

- A. 1~3周

C. 3~6周

D. 6~12周

E. 6~12个月

21. C

解析: 急性期应卧床休息, 一般需休息3~6周, 重者宜休息6个月~1年。待体温稳定3~4周, 心衰控制, 心律失常好转, 心电图改变好转时, 患儿逐渐增加活动量。

22. 下列哪项不属于五迟的范畴

- A. 坐迟
- B. 立迟
- C. 行迟
- D. 齿迟
- E. 语迟

22. A

解析: 五迟指立迟、行迟、齿迟、发迟、语迟。

23. 治疗麻疹逆证邪毒攻喉证的首选方剂是

- A. 定喘汤
- B. 清咽下痰汤
- C. 银翘散
- D. 黄连解毒汤
- E. 麻杏石甘汤

23. B

解析: 麻疹逆证邪毒攻喉证。证候: 咽喉肿痛, 声音嘶哑, 咳声重浊, 声如犬吠, 喉间痰鸣, 甚则吸气困难, 胸高肋陷, 面唇紫绀, 烦躁不安, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。治法: 清热解毒, 利咽消肿。代表方剂: 清咽下痰汤。

24. 治疗蛲虫病首选方剂为

- A. 化虫丸
- B. 驱虫粉
- C. 使君子散
- D. 追虫丸
- E. 贯众汤

24. B

解析: 蛲虫病。证候: 肛门、会阴部瘙痒, 夜间尤甚, 睡眠不宁, 烦躁不安, 或尿频、遗尿, 或女孩前阴瘙痒, 分泌物增多, 或食欲不

振，形体消瘦，面色苍黄。舌淡，苔白，脉无力。治法：杀虫止痒，结合外治。代表方剂：驱虫粉。

25. 下列各项中不属劳伤虚损的是

- A. 过度劳力
- B. 食伤
- C. 过度劳神
- D. 妇女生育过多
- E. 房事过度

25. B

解析：劳伤虚损致病主要是指劳力、劳神、房事过度或妇女生育过多等致病。多为慢性病，可深入筋骨与关节，属寒证者多。26. 阳证的皮肤颜色主要是

- A. 红赤
- B. 晦暗
- C. 青紫
- D. 苍白
- E. 皮色不变

26. A

解析：红活焮赤的属阳；紫暗或皮色不变的属阴。

27. 痒的常见病因是

- A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚
- B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
- C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚
- D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
- E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜

27. A

解析：痒是因风、湿、热、虫之邪客于皮肤肌表，引起皮肉间气血不和，郁而生微热所致；或因血虚风燥阻于皮肤，肤失濡养，内生虚热而发。

28. 具有腐蚀性的膏药是

- A. 千捶膏
- B. 太乙膏
- C. 咬头膏
- D. 阳和解凝膏
- E. 红油膏

28. C

解析：咬头膏具有腐蚀性，功能蚀破疮头，适用于肿疡脓成，不能自破，以及患者不愿接受手术切开排脓者。

29. 生于下列哪一部位的有头疽易致内陷

- A. 项后
- B. 四肢
- C. 颜面
- D. 少腹部
- E. 膻中

29. A

解析：有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病。其特点是初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿疼痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过 9~12cm，大者可在 30cm 以上。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处，多见于中老年人及消渴病患者，并容易发生内陷。

30. 对单发的乳核宜采用何种治疗方法

- A. 手术切除
- B. 中药治疗
- C. 放射治疗
- D. 抗癆治疗
- E. 以上都不是

30. A

解析：对单发纤维腺瘤的治疗以手术切除为宜，对多发或复发性纤维腺瘤可试用中药治疗，可起到控制肿瘤生长，减少肿瘤复发，甚至消除肿块的作用。

31. 脂瘤痰气凝结证选用的方剂为

- A. 柴胡疏肝汤
- B. 逍遥散
- C. 开郁散
- D. 海藻玉壶汤
- E. 二陈汤合四七汤

31. E

解析：脂瘤痰气凝结证候：脂瘤表皮中央有黑点；伴咽喉如有梅核堵塞，胸膈痞闷，情志抑郁，急躁易怒；舌淡，苔腻，脉滑。治法：理气化痰散结。方药：二陈汤合四七汤加减。

32. 以下哪一项为淋病临床特点

- A. 龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物
- B. 外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C. 尿道分泌物少，为黏液状
- D. 尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡

32. D

解析：急性淋病临床表现：尿道口红肿、发痒及轻度刺痛，继而有稀薄黏液流出，引起排尿不适，24 小时后症状加剧。排尿开始时尿道外口刺痛或灼热痛，排尿后疼痛减轻。尿道口溢脓，开始为浆液性分泌物，以后逐渐变稠出现黄色黏稠的脓性分泌物，特别是清晨起床后分泌物的量较多。

33. 白秃疮的西医病名是

- A. 黄癣
- B. 白癣
- C. 手癣
- D. 脚癣
- E. 股癣

33. B

解析：白秃疮相当于西医的白癣。

34. 下列哪种疾病无脱垂症状

- A. II 期内痔
- B. 肛裂
- C. 混合痔
- D. 息肉痔
- E. 脱肛

34. B

解析：肛裂的定义：肛管的皮肤全层纵行裂开并形成感染性溃疡者称肛裂。临床上以肛门周期性疼痛、出血、便秘为主要特点。

35. 精浊之气滞血瘀证的代表方剂是

- A. 前列腺汤
- B. 八正散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 抵挡丸
- E. 知柏地黄汤

35. A

解析：精浊之气滞血瘀证。证候：病程较长，少腹、会阴、睾丸、腰骶部坠胀不适、疼痛，有排尿不净之感。舌暗或有瘀斑，苔白或薄黄，脉沉涩。治法：活血祛瘀，行气止痛。方药：前列腺汤加减。

36. 破伤风前驱期不应有的症状是

- A. 头痛、头晕
- B. 乏力、多汗
- C. 烦躁、打呵欠
- D. 咀嚼无力

E. 张口困难

36. E

解析：破伤风前驱期：一般 1~2 天，患者常有头痛、头晕、乏力、多汗、烦躁不安、打呵欠，下颌微感紧张酸胀，咀嚼无力，张口略感不便；伤口往往干陷无脓，周围皮肤暗红，创口疼痛并有紧张牵制感。

37. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为

- A. 散发
- B. 暴发
- C. 流行
- D. 流行性
- E. 大流行

37. A

解析：流行性是指传染病在人群中连续发生造成不同程度蔓延的特性。①散发：某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平。②流行：某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。③大流行：某传染病流行范围广，甚至超过国界或洲界。④暴发：某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内，多是同一传染源或传播途径导致的。

38. 传染病病原学诊断的“金指标”是

- A. 血常规检查
- B. 大便常规检查
- C. 分子杂交技术
- D. 聚合酶链反应
- E. 病原体分离培养

38. E

解析：病原体的直接检出或分离培养是传染病病原学诊断的“金指标”。

39. 慢性乙型肝炎的治疗关键是

- A. 休息
- B. 保肝
- C. 降酶
- D. 抗病毒
- E. 调节免疫

39. D

解析：抗病毒治疗是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的关键治疗，只要有适应证，且条件允许，就应进行规范的抗病毒治疗。

40. 流行性出血热的“三痛”是

- A. 头痛、全身痛和腰痛
- B. 头痛、关节痛和腰痛
- C. 头痛、腓肠肌痛和腰痛
- D. 头痛、眼眶痛和腰痛
- E. 头痛、腹痛和腰痛

40. D

解析：流行性出血热发热期：主要表现为感染中毒症状、毛细血管损伤和肾脏损害。起病急骤，突然畏寒、发热，体温在 1~2 日内可达 39~40℃，热型多为弛张热或稽留热，一般持续 3~7 日。同时出现全身中毒症状，高度乏力，周身酸痛，常有典型的“三痛”：头痛、腰痛、眼眶痛，常伴较突出的胃肠道症状。

41. 狂犬病的传播途径不包括

- A. 眼结膜
- B. 肛门粘膜
- C. 胃肠粘膜
- D. 角膜移植
- E. 呼吸道

41. C

解析：狂犬病主要通过被患病动物咬伤传播。黏膜也是病毒的重要侵入门户，如眼结膜被病兽唾液玷污、肛门黏膜被狗舐等。此外，亦有经呼吸道及角膜移植传播的报道。

42. 霍乱的典型临床表现是

- A. 先泻后吐
- B. 先吐后泻
- C. 只泻不吐
- D. 腹泻伴腹痛
- E. 吐泻同时发生

42. A

解析：泻吐期多以无痛性急剧腹泻开始，继而呕吐，不伴里急后重（O139 群除外）。大便量多，为米泔水样或清水样，或呈洗肉水样，稍有鱼腥味。呕吐常为喷射性多在腹泻数次后出现，持续数小时至 2~3 日。O139 型霍乱发热、腹痛较常见且可并发菌血症。

43. 流感的症状最主要的是

- A. 全身中毒症状
- B. 发热
- C. 呼吸道症状

- D. 消化道症状
- E. 循环系统症状

43. A

解析：流感潜伏期通常为 1~3 日。起病多急骤，主要以全身中毒症状为主，呼吸道症状轻微或不明显。发热通常持续 3~4 日。44. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪

一期

- A. 潜伏期
- B. 初期
- C. 极期
- D. 缓解期
- E. 恢复期

44. A

解析：伤寒杆菌由口入胃，进入小肠，经肠粘膜侵入集合淋巴结、孤立淋巴滤泡及肠系膜淋巴结中繁殖，再经门静脉或胸导管进入血流，形成初期菌血症。

45. 慢性乙型肝炎的治疗关键是

- A. 休息
- B. 保肝
- C. 降酶
- D. 抗病毒
- E. 调节免疫

45. D

解析：抗病毒治疗是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的关键治疗，只要有适应证，且条件允许，就应进行规范的抗病毒治疗。

46. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期

- A. 潜伏期
- B. 初期
- C. 极期
- D. 缓解期
- E. 恢复期

46. A

解析：伤寒杆菌由口入胃，进入小肠，经肠粘膜侵入集合淋巴结、孤立淋巴滤泡及肠系膜淋巴结中繁殖，再经门静脉或胸导管进入血流，形成初期菌血症。如机体免疫力弱，则细菌扩散至骨髓、肝、脾及淋巴结等组织大量繁殖，至潜伏期末再次大量侵入血流，形成第二次菌血症而开始出现发热、皮疹及肝脾肿大等伤寒表现。

47. 有关隔离的描述, 错误的是
- A. 是控制传染病流行的重要措施
 - B. 便于管理传染源
 - C. 可防止病原体向外扩散给他人
 - D. 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
 - E. 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察

47. D

解析: 传染病患者的隔离期限原则是根据传染病的最长传染期而确定的, 同时尚应根据临床表现和微生物检验结果来决定是否可以解除隔离。某些传染病患者出院后尚应追踪观察。

48. 有关医院感染的概念, 错误的是
- A. 是指在医院内获得的感染
 - B. 出院之后的感染有可能是医院感染
 - C. 与上次住院有关的感染是医院感染
 - D. 入院时处于潜伏期的感染不一定是医院感染
 - E. 婴幼儿经胎盘获得的感染属医院感染

48. E

解析: 依据卫生部医院感染诊断标准(试行), 下列情况不属于医院感染: (1) 皮肤黏膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现。

(2) 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现。(3) 新生儿经胎盘获得(出生后48小时内发病)的感染, 如单纯疱疹、弓形体、水痘等。(4) 患者原有的慢性感染在医院内急性发作。

49. 下列各项中, 在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是
- A. 《中华人民共和国刑法》
 - B. 《中华人民共和国宪法》
 - C. 《中华人民共和国民法通则》
 - D. 《中华人民共和国食品安全法》
 - E. 以上均不是

49. B

解析: 《宪法》是国家的根本大法, 是国家最高权力机关 - 全国人民代表大会依照法定程序制定的具有最高法律效力的规范性文件, 是所有立法的依据, 也是卫生法律法规的立法依据。

50. 下列关于卫生民事责任的特征叙述错误的是

- A. 主要是财产责任
- B. 是补偿当事人的损失
- C. 是一方当事人对另一方的责任
- D. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系
- E. 在法律允许的条件下, 民事责任可以由当事人协商解决

50. D

解析: 卫生民事责任的特征: ①主要是财产责任; ②是一方当事人对另一方的责任; ③是补偿当事人的损失; ④在法律允许的条件下, 民事责任可以由当事人协商解决。选项D中的内容是卫生民事责任的构成内容。故此题的正确选项是D。

51. 《中华人民共和国药品管理法》规定的药品是指用于

- A. 防病、治病的特殊商品
- B. 预防、治疗人的疾病的物质
- C. 预防、诊断人的疾病的物质
- D. 预防、治疗、诊断人的疾病的物质
- E. 预防、治疗、诊断人及动物疾病的物质

51. D

解析: 药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病, 有目的地调节人的生理机能并规定有适应证或者功能主治、用法和用量的物质, 包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。

52. 下列关于假药的情形叙述正确的是
- A. 变质的药品
 - B. 被污染的药品
 - C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
 - D. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品
 - E. 以上均是

52. E

解析: 有下列情形之一的药品, 按假药论处: ①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的; ②依照本法必须批准而未经批准生产、进口, 或者依照本法必须检验而未经检验即销售的; ③变质的; ④被污染的; ⑤使用依

照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。

53. 关于突发公共卫生事件的应急预案措施中，有关部门及医疗卫生机构应当对传染病做到下列哪“四早”

- A. 早发现、早报告、早隔离、早治疗
- B. 早发现、早隔离、早诊断、早治疗
- C. 早发现、早报告、早诊断、早治疗
- D. 早发现、早报告、早诊断、早治疗
- E. 早发现、早报告、早观察、早治疗

53. A

解析：突发公共卫生事件应急预案的实施中，有关部门、医疗卫生机构应当对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，切断传播途径，防止扩散。

54. 下列各项中，属于发生医疗事故争议时，应在医患双方在场的情况下封存和启封的材料是

- A. 会诊意见
- B. 手术同意书
- C. 特殊检查同意书
- D. 手术及麻醉记录单
- E. 医学影像检查资料

54. A

解析：发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应在医患双方在场的情况下封存和启封。除了选项 A 外，其余各项均为医疗事故处置中患者有权进行复印及复制的材料内容。

二、A2 型选择题（55~87 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

55. 患者，女，26 岁。多次发生经间期出血，此次阴道

出血量稍多，色深红，质粘腻，无血块，平素带下量多色黄，时现异味，小腹隐痛，神疲乏力，胸闷烦躁，纳呆腹胀，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数辨属何证

A. 脾虚证

B. 血瘀证

C. 肝郁证

D. 血热证

E. 湿热证

55. E

解析：经间期出血湿热证。主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄，小腹时痛；神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔黄腻，脉细弦或滑数。治法：清利湿热，固冲止血。方药：清肝止淋汤去阿胶、红枣，加小蓟、茯苓。

56. 患者经行量多，色淡红，质清稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色㿔白，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法为

- A. 益气清热，固冲止血
- B. 清热凉血，固冲止血
- C. 养阴清热止血
- D. 活血化瘀止血
- E. 补气摄血固冲

56. E

解析：月经过多气虚证。主要证候：经行量多，色淡红，质清稀；神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色㿔白；舌淡，苔薄，脉细弱。治法：补气摄血固冲。方药：举元煎或安冲汤。

57. 田某，女，27 岁。结婚三年，孕 3 产 0，自然流产 3 次，均在孕 50 天时自然殒堕。现停经 7 周，尿妊娠试验阳性，伴有恶心，呕吐，夜尿频多等早孕反应，2 天前出现阴道少量流血，但无腰酸腹痛。

B 超提示：宫内早孕。妇科检查：宫口未开，子宫增大，符合停经月份。此病案诊断为

- A. 堕胎
- B. 小产
- C. 胎堕不全
- D. 滑胎
- E. 胎动难留

57. D

解析：凡堕胎或小产连续发生 3 次或 3 次以上者，称为“滑胎”，亦称“数堕胎”、“屡孕屡堕”。

58. 一孕妇，孕 6 月余，小便频数，艰涩刺痛，尿少色黄，伴面赤心烦，喜冷饮，舌上溃疡，舌红欠润，少苔，脉细数，治疗首选

- A. 五苓散
- B. 导赤散
- C. 保阴煎
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 知柏地黄丸

58. B

解析：妊娠小便淋痛心火偏亢证。主要证候：妊娠期间，小便频数，尿短赤，艰涩刺痛，面赤心烦，渴喜冷饮，甚者口舌生疮；舌红欠润，少苔或无苔，脉细数。治法：清心泻火，润燥通淋。方药：导赤散加玄参、麦冬。59. 妊娠 8 个月，腹部异常增大，胸膈满

闷，呼吸短促，神疲倦怠，小便短少，喘不得卧，舌质淡苔白，脉沉滑动。最佳治法是

- A. 逐水消肿，养血安胎
- B. 疏肝健脾，逐水消肿
- C. 滋肾健脾，温阳利水
- D. 温肾健脾，泻肺利水
- E. 健脾利水，养血安胎

59. E

解析：子满为本虚标实证，治宜标本兼顾，本着治病与安胎并举的治则，健脾消水而不伤胎。主要证候：妊娠中期后，腹部增大异常，胸膈满闷，呼吸短促，神疲体倦，四肢不温，小便短少，甚则喘不得卧；舌淡胖，苔白，脉沉滑无力。治法：健脾利水，养血安胎。方药：鲤鱼汤加黄芪、桑白皮或当归芍药散。

60. 某患者停经 50 天，阴道少量出血 3 天；伴小腹隐痛，腰酸，恶心，纳差；舌淡红，苔白，脉细滑；妊娠试验阳性。应诊断为

- A. 胎漏
- B. 胎动不安
- C. 胎死不下
- D. 胎堕难留
- E. 激经

60. B

解析：妊娠期间阴道少量出血，时出时止，或淋漓不断，而无腰酸、腹痛、小腹下坠者，

称为“胎漏”，亦称“胞漏”或“漏胎”。妊娠期间出现腰酸、腹痛、小腹下坠，或伴有少量阴道出血者，称为“胎动不安”。本病发生在妊娠早期，类似于西医学的先兆流产，若发生在妊娠中、晚期，则类似于西医学的前置胎盘。

61. 患者，女，25 岁，自诉 3 天来带下量多，赤白相兼，质黏腻，臭秽难闻，小腹疼痛，腰酸酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄，脉滑数。治疗首选方剂是

- A. 五味消毒饮
- B. 完带汤
- C. 易黄汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 止带方

61. A

解析：带下过多热毒蕴结证。主要证候：带下量多，黄绿如脓，或赤白相兼，或五色杂下，质黏腻，臭秽难闻；小腹疼痛，腰酸酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄或黄腻，脉滑数。治法：清热解毒。方药：五味消毒饮加土茯苓、败酱草、鱼腥草、薏苡仁。

62. 一产妇分娩数日后，肢体关节疼痛，屈伸不利或痛无定处或冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，伴恶寒怕风，脉濡细。最佳选方是

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 独活寄生汤
- C. 生化汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 养荣壮肾汤

62. B

解析：本题患者属于产后身痛风寒证。主要证候：产后肢体关节疼痛，屈伸不利，或痛无定处，或冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，或关节肿胀，麻木，重着，伴恶寒怕风；舌淡苔薄白，脉濡细。治法：养血祛风，散寒除湿。方药：独活寄生汤或趁痛散、防风汤。63. 急性盆腔炎患者，下腹部疼痛拒按，

寒热往来，带下量多、色黄、质稠、味臭秽，经量增多，经期延长，淋漓不止，

大便燥结，小便短赤；舌红有瘀点，苔黄厚，脉弦滑。治疗首选

- A. 五味消毒饮
- B. 清营汤
- C. 大黄牡丹汤
- D. 仙方活命饮
- E. 犀角地黄汤

63. D

解析：急性盆腔炎之湿热瘀结证。主要证候：下腹部疼痛拒按，或胀满，热势起伏，寒热往来，带下量多、色黄、质稠、味臭秽，经量增多，经期延长，淋漓不止，大便溏或燥结，小便短赤；舌红有瘀点，苔黄厚，脉弦滑。治法：清热利湿，化瘀止痛。方药：仙方活命饮加薏苡仁、冬瓜仁。

64. 一妇人产后遍身关节酸楚，疼痛，肢体麻木，面色萎黄，头晕，心悸，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法是

- A. 养血活血，温阳通络
- B. 疏肝养血，通络止痛
- C. 养血益气，温经通络
- D. 养血温中，通络止痛
- E. 养血滋阴，通络止痛

64. C

解析：产后身痛血虚证。主要证候：产后遍身关节酸楚、疼痛，肢体麻木；面色萎黄，头晕心悸；舌淡苔薄，脉细弱。治法：养血益气，温经通络。方药：黄芪桂枝五物汤加当归、秦艽、丹参、鸡血藤。

65. 某妇人月经错后，经血量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟。应选方

- A. 生化汤
- B. 《金匮》温经汤
- C. 《良方》温经汤
- D. 乌药汤
- E. 大补元煎

65. B

解析：月经后期虚寒证。主要证候：月经延后，量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟或细弱。治法：扶阳祛

寒调经。方药：温经汤（《金匮要略》）或艾附暖宫丸。

66. 患儿，2岁。发热3~4天出疹，疹形细小，状如麻粒，口腔黏膜出现“麻疹黏膜斑”者，为

- A. 口疮
- B. 鹅口疮
- C. 麻疹
- D. 疟腮
- E. 发颐

66. C

解析：发热3~4天出疹，疹形细小，状如麻粒，口腔黏膜出现“麻疹黏膜斑”者，为麻疹。

67. 患儿，出生32天。症见面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。其证候是

- A. 寒湿阻滞
- B. 气滞血瘀
- C. 湿热郁蒸
- D. 胎黄动风
- E. 胎黄虚脱

67. A

解析：胎黄寒湿阻滞证。证候：面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。治法：温中化湿退黄。代表方剂：茵陈理中汤。

68. 患儿，3岁。平素反复外感。面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。其治法是

- A. 调和营卫，益气固表
- B. 温补肾阳，健脾益气
- C. 养阴润肺，益气健脾
- D. 补肺固表，健脾益气
- E. 健脾益气，养阴益胃

68. B

解析：反复呼吸道感染之脾肾两虚证。证候：反复外感，面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，

动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。治法：温补肾阳，健脾益气。代表方剂：金匱肾气丸合理中丸。

69. 患儿，5岁。咳嗽喘促半天。证见气喘，喉间哮鸣，咳嗽，胸闷，痰稀色白有泡沫，喷嚏鼻塞，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌质淡红，苔薄白，脉浮紧，指纹红。其治法是

- A. 温肺散寒，涤痰定喘
- B. 清肺涤痰，止咳平喘
- C. 解表清里，定喘止咳
- D. 泻肺补肾，标本兼顾
- E. 健脾温肾，固摄纳气

69. A

解析：风寒束肺证证候：气喘，喉间哮鸣，咳嗽，胸闷，痰稀色白有泡沫，喷嚏鼻塞，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌质淡红，苔薄白或白滑，脉浮紧，指纹红。治法：温肺散寒，涤痰定喘。代表方剂：小青龙汤合三子养亲汤。

70. 患儿，7岁。反复咳嗽喘促3年余。证见咳嗽喘促，动则喘甚，胸闷气短，面色欠华，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉细弱。治疗首选方

- A. 苏葶丸
- B. 华盖散
- C. 苏子降气汤
- D. 小青龙汤
- E. 金匱肾气丸

70. E

解析：哮喘脾肾阳虚证。证候：喘促乏力，动则气喘，气短心悸，咳嗽无力，形体消瘦，形寒肢冷，腰膝酸软，面白少华，腹胀，纳差，夜尿多，便溏，发育迟缓，舌质淡，苔薄白，脉细弱，指纹淡。治法：温补脾肾，固摄纳气。代表方剂：金匱肾气丸。

71. 痫证患儿，发作时突然仆倒，神志不清，颈项及全身强直，继而四肢抽搐，两目上视，牙关紧闭，口吐白沫，口唇及面部色青，舌苔白，脉弦滑。治疗应首选方剂是

- A. 定痫丸
- B. 远志丸
- C. 定魄丸
- D. 镇惊丸
- E. 涤痰汤

71. A

解析：风痫证。证候：发作时突然仆倒，神志不清，颈项及全身强直，继而四肢抽搐，两目上视或斜视，牙关紧闭，口吐白沫，口唇及面部色青，舌苔白，脉弦滑。治法：息风止痉。代表方剂：定痫丸。

72. 患儿，7岁，面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，日出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。应诊断为

- A. 惊风
- B. 癫痫
- C. 抽动障碍
- D. 注意力缺陷多动症
- E. 痉挛症

72. C

解析：抽动障碍气郁化火证。证候：面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，口出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。治法：清肝泻火，息风镇惊。代表方剂：清肝达郁汤。

73. 患儿，女，5岁。因右侧腮部肿痛5天就诊。现证见腮部漫肿，灼热疼痛，咀嚼时尤甚，精神倦怠，高热头痛，咽喉红肿，大便干结，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗首选方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 普济消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 三仁汤
- E. 荆防败毒散

73. B

解析：痄腮热毒壅盛证。证候：高热，一侧或两侧耳下腮部肿胀疼痛，坚硬拒按，张口咀嚼困难，或有烦躁不安，口渴欲饮，头痛，咽红肿痛，颌下肿块胀痛，纳少，大便秘结，尿少而黄，舌质红，舌苔黄，脉滑数。治法：

清热解毒，软坚散结。代表方剂：普济消毒饮。

74. 患儿，女，5岁。发热1天，颜面、躯干见丘疹及水疱疹。现低热，恶寒，鼻塞流涕，疹色红润，疱浆清亮，疹粒稀疏，舌质红，苔薄白，脉浮数。其病证诊断为

- A. 幼儿急疹，邪郁肌表
- B. 风疹，邪犯肺卫证
- C. 麻疹，邪犯肺卫证
- D. 水痘，毒炽气营证
- E. 水痘，邪伤肺卫证

74. E

解析：水痘邪伤肺卫证。证候：发热轻微，或无发热，鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，起病后1~2天出皮疹，疹色红润，疱浆清亮，根盘红晕，皮疹瘙痒，分布稀疏，此起彼伏，以躯干为多，舌苔薄白，脉浮数。治法：疏风清热，利湿解毒。代表方剂：银翘散。

75. 患儿，1岁，能抬头，不能独坐及站立，牙齿萌出4颗，头颅呈方形，凶门宽大，发稀而黄，目无神采，反应迟钝，夜卧不安，易倦懒动，肢体无力，睡眠不实，面色不华，形体瘦弱，舌淡苔少，指纹淡。治疗应首选

- A. 加味六味地黄丸
- B. 调元散
- C. 虎潜丸
- D. 调元散合二陈汤
- E. 通窍活血汤合二陈汤

75. A

解析：五迟、五软肝肾亏损证。证候：筋骨痿弱，发育迟缓，坐起、站立、行走、生齿等明显迟于正常同龄小儿，头项痿软，天柱骨倒，头型方大，目无神采，反应迟钝，凶门宽大，易惊，夜卧不安，舌质淡，舌苔少，脉沉细无力，指纹淡。治法：补肾填髓，养肝强筋。代表方剂：加味六味地黄丸。

76. 患儿，男，7岁。诊断为猩红热。现身热渐退，咽喉糜烂，疼痛减轻，皮疹渐消，唇干口渴，食欲不振，舌红少津，脉细。治疗首选方为

- A. 养阴清肺汤
- B. 益胃汤
- C. 沙参麦冬汤

D. 竹叶石膏汤

E. 增液承气汤

76. C

解析：丹痧疹后阴伤证证候：丹痧布齐后1~2天身热渐退，咽部糜烂疼痛减轻，或见低热，唇干口渴，或伴有干咳，食欲不振，舌红少津，苔剥落，脉细数。约2周后可见皮肤脱屑、脱皮。治法：养阴生津，清热润喉。代表方剂：沙参麦冬汤。

77. 患者一侧臀部结块，肿胀疼痛，皮肤灼热，红肿以中心为著，边界不清，步行困难，身热头痛，病前有局部肌肉注射史。应诊断为

- A. 丹毒
- B. 流注
- C. 臀痈
- D. 环跳疽
- E. 附骨疽

77. C

解析：臀痈是发生于臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。由于肌肉注射引起者，俗称针毒结块。其特点是来势急，病位深，范围大，难于起发，成脓较快，但腐溃较难，收口亦慢。

78. 患者女性，26岁，产后第三周出现恶寒发热，右乳肿胀疼痛，体温38.7℃，检查见右乳红肿，无波动感，口渴，舌红，苔薄黄，脉数。此时的治疗方法是

- A. 切开引流
- B. 疏肝理气，化痰散结
- C. 疏肝清胃，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 泻火解毒利湿

78. C

解析：本题患者属于乳痈气滞热壅证，治法为疏肝清胃，通乳消肿。

79. 患者白疮初起，皮损遍身，多呈点滴状，颜色鲜红，层层银屑，瘙痒剧烈，抓之有点状出血，伴口干舌燥，便干溲黄，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。证属

- A. 火毒炽盛证
- B. 湿毒蕴阻证
- C. 气血瘀滞证
- D. 血热内蕴证

E. 以上均不是

79. D

解析：白疔血热内蕴证。证候：多见于进行期。皮疹多呈点滴状，发展迅速，颜色鲜红，层层鳞屑，瘙痒剧烈，刮去鳞屑有点状出血；伴口干舌燥，咽喉疼痛，心烦易怒，便干溲赤；舌质红，舌苔薄黄，脉弦滑或数。治法：清热凉血，解毒消斑。方药：犀角地黄汤加减。

80. 患者，女，40岁，慢性肾病，病程日久，平素头发焦黄，发病时呈大片均匀脱落；伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌质淡，舌苔薄，脉细。治疗宜选用

- A. 八珍汤
- B. 大补阴丸
- C. 通窍活血汤
- D. 六味地黄汤
- E. 七宝美髯丹

80. E

解析：油风肝肾不足证。证候：病程日久，平素头发焦黄或花白，发病时呈大片均匀脱落，甚或全身毛发脱落；伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌质淡，舌苔薄，脉细。治法：滋补肝肾。方药：七宝美髯丹加减。

81. 患者女性，30岁，自觉肛门部不适，排便时因粪便压迫肛隐窝，可感觉肛门疼痛，一般不甚剧烈，数分钟内消失。其最可能的诊断是

- A. 直肠息肉
- B. 肛裂
- C. 肛痿
- D. 肛窦炎
- E. 内痔

81. D

解析：肛隐窝炎是肛隐窝、肛门瓣发生的慢性炎症性疾病，又称肛窦炎。主要症状：自觉肛门部不适，排便时因粪便压迫肛隐窝，可感觉肛门疼痛，一般不甚剧烈，数分钟内消失。若括约肌受刺激而挛缩则疼痛加剧，常可出现不排便时的短时间阵发性刺痛，并波及臀部和股后侧。急性期常伴便秘，粪便常带少许黏液，此种黏液常在粪便前流出，有时混有血丝。若并发肛乳头肥大，并从肛门脱出，可使肛门潮湿瘙痒。

82. 患者肛旁肿痛1周，近3天加重，伴发热恶寒，坐卧不宁。检查肛门左侧饱满，高于右侧，压痛明显，有波动感，最可能的诊断是

- A. 直肠后间隙脓肿
- B. 骨盆直肠间隙脓肿
- C. 肛门旁皮下脓肿
- D. 坐骨直肠间隙脓肿
- E. 坐骨直肠间隙脓肿传向肛提肌

82. D

解析：坐骨直肠间隙脓肿：发于肛门与坐骨结节之间，感染区域比肛门皮下脓肿广泛而深。初起仅感肛门部不适或微痛，逐渐出现发热、畏寒、头痛、食欲不振等症状，而后局部症状加剧，肛门有灼痛或跳痛，在排便、咳嗽、行走时疼痛加剧，甚则坐卧不安。肛门指诊，患侧饱满，有明显压痛和波动感。83. 患者，男，38岁。患急性子痛2天，

恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系（精索），舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选

- A. 透脓散
- B. 滋阴除湿汤
- C. 萆薢化毒汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 枸橘汤加减

83. E

解析：子痛湿热下注证。证候：多见于成年人。睾丸或附睾肿大疼痛，阴囊皮肤红肿，焮热疼痛，少腹抽痛，局部触痛明显，脓肿形成时，按之应指，伴恶寒发热。苔黄腻，脉滑数。治法：清热利湿，解毒消肿。方药：枸橘汤或龙胆泻肝汤加减。

84. 某男，32岁。右下肢麻木、发凉、怕冷2年，每行走约1km需停下休息。体格检查：右下肢皮温较对侧低，色泽苍白，右足背动脉搏动减弱。诊断考虑为

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 大动脉炎
- C. 右下肢动脉硬化性闭塞症
- D. 右下肢深静脉血栓形成
- E. 右下肢血栓性浅静脉炎

84. A

解析：血栓闭塞性脉管炎多发于寒冷季节，以 20~40 岁男性多见；常先一侧下肢发病，继而累及对侧，少数患者可累及上肢；患者多有受冷、潮湿、嗜烟、外伤等病史。动脉硬化性闭塞症多发于老年人，常伴有高脂血症、高血压和动脉硬化病史，常累及大、中动脉。

85. 患者，女，45 岁，甲状腺肿大 20 年，呈漫肿，无痛，随喜怒而消长，属中医

- A. 石瘿
- B. 肉瘿
- C. 瘰疬
- D. 气瘿
- E. 失荣

85. D

解析：气瘿肝郁气滞证证候特点为：颈部弥漫性肿大，边缘不清，随喜怒消长，皮色如常，质软无压痛，肿块随吞咽动作上下移动；伴急躁易怒，善太息；舌质淡红，苔薄，脉沉弦。

86. 8 月上旬，一男性儿童前额部出现 2 个红肿结块，约 2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用

- A. 五味消毒饮
- B. 仙方活命饮
- C. 清暑汤
- D. 防风通圣散
- E. 黄连解毒汤

86. C

解析：疔之暑热浸淫证。证候：发于夏秋季节，以小儿及产妇多见。局部皮肤红肿结块，灼热疼痛，根脚很浅，范围局限。伴发热，口干，便秘，溲赤。舌苔薄腻，脉滑数。治法：清暑化湿解毒。代表方：清暑汤加减。

87. 患者，女，40 岁。双乳肿胀疼痛，月经前加重，经后缓减，肿块大小不等，形态不一，伴乳头溢液，月经不调，腰酸乏力，舌淡苔白，脉弦细。其证候是

- A. 肝郁痰凝
- B. 肝气郁结
- C. 冲任失调
- D. 肝郁火旺
- E. 肝郁脾虚

87. C

解析：此证乃乳癖之冲任失调证。气血瘀滞，痰浊凝结，经脉阻塞而致乳房结块，疼痛，月经不调。治法为调摄冲任。方药为二仙汤合四物汤加减。

三、A3 型选择题（88~114 题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（88~90 题共用题干）

患者经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。

88. 其证是

- A. 寒凝血瘀证
- B. 阳虚内寒证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 气血虚弱证
- E. 肾气亏损证

89. 其治法是

- A. 理气行滞，化瘀止痛
- B. 温经散寒，化瘀止痛
- C. 益气养血，调经止痛
- D. 温经扶阳，暖宫止痛
- E. 补肾益精，养血止痛

90. 治疗应选的方剂是

- A. 温经汤（《金匮要略》）
- B. 艾附暖宫丸
- C. 温经汤（《妇人大全良方》）
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

88. B

89. D

90. A

解析：痛经阳虚内寒证。主要证候：经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。治法：温经扶阳，暖宫止痛。方药：温经汤（《金匮要略》）加附子、艾叶、小茴香。

（91~93 题共用题干）

某妇，孕 28 周，近一个月腹形增长不明显，自觉有胎动，阴道少量下血，头晕，纳少，口淡，乏力，舌淡，苔白，脉细弱略滑。

91. 其证是

- A. 气血虚弱
- B. 脾肾不足
- C. 血寒宫冷
- D. 脾虚湿郁
- E. 心血不足

92. 其治法是

- A. 补肾健脾，益气安胎
- B. 补气养血，固肾安胎
- C. 温阳散寒，补肾安胎
- D. 清热凉血，养血安胎
- E. 健脾温中，益气安胎

93. 治疗应选的方剂是

- A. 人参养荣汤
- B. 八珍汤
- C. 胎元饮
- D. 十全大补汤
- E. 泰山磐石散

91. A

92. B

93. C

解析：胎漏、胎动不安气血虚弱证。主要证候：妊娠期阴道少量下血，色淡红，质稀薄，或小腹空坠而痛、腰酸，面色㿔白，心悸气短，神疲肢倦；舌淡，苔薄白，脉细弱略滑。治法：补气养血，固肾安胎。方药：胎元饮。

(94~96 题共用题干)

李某，新产后，突然出现高热寒战，T39.5℃，伴小腹疼痛，拒按，恶露量多，色紫暗如败酱，气臭秽，心烦口渴，大便秘结，小便黄；舌红，苔黄，脉数有力。

94. 其证是

- A. 感染邪毒证
- B. 外感证
- C. 血瘀证
- D. 血虚证
- E. 肾虚证

95. 其治法是

- A. 清热解毒，化瘀止血
- B. 清热解毒，凉血化瘀
- C. 清热解毒，泻下逐攻

D. 清热解毒，凉血养阴

E. 清热解毒，清心开窍

96. 治疗应选的方剂是

- A. 荆防四物汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 大黄牡丹皮汤
- E. 五味消毒饮

94. A

95. B

96. E

解析：产后发热感染邪毒证。主要证候：产后高热寒战，热势不退，小腹疼痛拒按，恶露量或多或少，色紫暗如败酱，气臭秽；心烦口渴，尿少色黄，大便燥结；舌红苔黄，脉数有力。治法：清热解毒，凉血化瘀。方药：五味消毒饮合失笑散加减或解毒活血汤加减。

(97~99 题共用题干)

患儿，3 岁。体重 10kg，身高 80cm。其形体消瘦，面色无华，毛发干枯，精神萎靡不振，不思饮食，腹膨如鼓，一身浮肿，双踝肿甚，按之凹陷，舌质淡，苔薄白，指纹淡。97. 其治法是

- A. 补益气血，佐以运脾
- B. 养血柔肝，活血化瘀
- C. 滋阴生津，养血安神
- D. 健脾温阳，利水消肿
- E. 调脾健运，开胃进食

98. 其选方是

- A. 防己黄芪汤合五苓散
- B. 黄芪桂枝五物汤合真武汤
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 实脾饮合五苓散
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

99. 根据材料分析，判断该患儿的生长发育状况

- A. 体重正常，身高正常
- B. 体重偏低，身高偏低
- C. 体重偏低，身高正常
- D. 体重偏高，身高偏低
- E. 体重偏低，身高偏高

97. D

解析：根据题干诊断为痞肿胀证。证候：足踝浮肿，甚或颜面及全身浮肿，面色无华，神疲乏力，四肢欠温，小便短少，舌淡嫩，苔薄白，脉沉迟无力。治法：健脾温阳，利水消肿。代表方剂：防己黄芪汤合五苓散。

98. A

解析：解析同上。

99. B

解析：根据 2~12 岁身高公式：身高 (cm) = 75 + 7 × 年龄 (3)，即 96cm，该患儿身高偏低。根据 1 岁以上体重公式：体重 (Kg) = 8 + 2 × 年龄，即 14Kg，该患儿体重偏瘦。

(100~102 题共用题干)

患者，男，3 岁。症见：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，学习成绩低下，腰酸乏力，大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。100. 根据

题干内容进行分析，其证型是 A. 心肾阴虚证

B. 气郁化火证

C. 阴虚风动证

D. 心肝阴虚证

E. 肝肾阴虚证

101. 其首选的方剂是

A. 大定风珠

B. 清肝达郁汤

C. 杞菊地黄丸

D. 六味地黄丸

E. 羚角钩藤汤

102. 以下有关该病的预防与调护说法错误的是

A. 孕妇应保持心情愉快

B. 不责骂不体罚

C. 保证患儿营养

D. 食用兴奋性食物

E. 加强管理，及时疏导

100. E

解析：根据题干进行分析，诊断为注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证，其主症：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，或有记忆力欠佳、学习成绩低下，或有遗尿、腰酸乏力，或有五心烦热、盗汗、大便秘结，舌质

红，舌苔薄，脉细弦。治法：滋养肝肾，平肝潜阳。代表方剂：杞菊地黄丸。

101. C

解析：解析同上。

102. D

解析：注意力缺陷多动障碍预防与调护：(1) 孕妇应保持心情愉快，营养均衡，禁烟酒，慎用药物，避免早产、难产及新生儿窒息。

(2) 关心体谅患儿，对其行为及学习进行耐心的帮助与训练，要循序渐进，不责骂不体罚，稍有进步即应给予表扬和鼓励。(3) 训练患儿有规律地生活，起床、吃饭、学习等都要形成规律，不要过于迁就。加强管理，及时疏导，防止攻击性、破坏性及危险性行为发生。(4) 保证患儿营养，补充蛋白质、水果及新鲜蔬菜，避免食用有兴奋性和刺激性的饮料和食物。

(103~105 题共用题干)

患儿，6 岁。有明显的骨骼改变症状，如头颅方大，肋软骨沟，肋串珠，手镯，足镯，鸡胸，漏斗胸等，O 形或 X 形腿，出牙、坐立、行走迟缓，并有面白虚烦，多汗肢软，舌淡苔少，脉细无力

103. 其证型是

A. 肺脾气虚证

B. 脾虚肝旺证

C. 肾精亏损证

D. 气阴两伤证

E. 肝肾不足证

104. 其治法是

A. 补肾填精，佐以健脾

B. 健脾助运，平肝息风

C. 益气养阴，清解余热

D. 补益肝肾

E. 健脾补肺

105. 治疗应首选

A. 人参五味子

B. 益脾镇惊散

C. 补肾地黄丸

D. 六味地黄丸

E. 杞菊地黄丸

103. C

104. A

105. C

解析：根据题干分析为维生素 D 缺乏性佝偻病肾精亏损证。其主症：有明显的骨骼改变症状，如头颅方大，肋软骨沟，肋串珠，手镯，足镯，鸡胸，漏斗胸等，O 形或 X 形腿，出牙、坐立、行走迟缓，并有面白虚烦，多汗肢软，舌淡苔少，脉细无力。治法：补肾填精，佐以健脾方药：补肾地黄丸。

（106~108 题共用题干）

患者，女，43 岁。颈部呈弥漫性肿大 3 年，表面平坦，质软不痛，边缘不清，随喜怒消长，皮色如常，肿块随吞咽上下移动；伴急躁易怒，善太息。舌质淡红，苔薄白，脉沉弦。

106. 根据题干分析，其诊断是

- A. 肉瘿
- B. 瘰疬
- C. 石瘿
- D. 肉瘤
- E. 气瘿

107. 根据题干分析，该病治法是

- A. 解郁安神，化痰软坚
- B. 补益气血，解毒化痰
- C. 清肝泻火，祛瘀解毒
- D. 益气养阴，软坚散结
- E. 疏肝解郁，化痰软坚

108. 在 107 题的基础上，其首选方剂是

- A. 四海舒郁丸
- B. 逍遥散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 四七汤
- E. 逍遥散合海藻玉壶汤

106. E

解析：根据题干分析“颈部呈弥漫性肿大 3 年，表面平坦，质软不痛，随喜怒消长，皮色如常，伴急躁易怒，善太息”诊断为气瘿。

107. E

解析：据题干分析“随喜怒消长，皮色如常，伴急躁易怒，善太息，脉弦”诊断为肝郁气滞证，故需疏肝解郁，化痰软坚。代表方：四海舒郁丸加减。

108. A

解析：解析同上。

（109~111 题共用题干）

患儿，男。右下肢出现局限性柔软肿块，局部色泽鲜红，触之如海绵状，大小不一，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，尿黄便干，易口舌生疮。舌质红，苔薄黄，脉细数。

109. 诊断为

- A. 脂瘤
- B. 血管瘤
- C. 血瘤
- D. 肉瘤
- E. 脂肪瘤

110. 其首选方剂是

- A. 五味消毒饮合化坚二陈丸
- B. 阳和汤
- C. 顺气归脾丸
- D. 芩连二母丸合凉血地黄汤
- E. 丹栀逍遥散合清肝芦荟丸

111. 根据第 110 题，该病的治则是

- A. 健脾益气，化湿解毒
- B. 温阳散寒，化痰散结
- C. 清心泻火，凉血解毒
- D. 清肝泻火，祛瘀解毒
- E. 清热解毒，化痰散瘀

109. C

解析：根据题干分析“右下肢出现局限性柔软肿块，局部色泽鲜红，触之如海绵状”诊断为血瘤。相当于西医的血管瘤。常见的有毛细血管瘤和海绵状血管瘤。

110. D

解析：根据题干分析诊断为血瘤心肾火毒。其主症：多见于初生婴儿。肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，尿黄便干，易口舌生疮。舌质红，苔薄黄，脉细数等。治法：清心泻火，凉血解毒。代表方剂：芩连二母丸合凉血地黄汤。

111. C

解析：解析同上。

（112~114 题共用题干）

男，31 岁。突发剑突下疼痛，6 小时后疼痛转移到右下腹，恶心纳差，轻度发热。右下腹有压痛，无反跳痛，舌苔白腻，脉弦滑。

112. 根据题干分析，该证型首选方剂是

- A. 复方大柴胡汤

- B. 阑尾化瘀汤
- C. 藿香正气散加减
- D. 大承气汤加减
- E. 大黄牡丹汤合红藤煎

113. 根据题目分析, 其治则是

- A. 行气活血, 通腑泄热
- B. 通腑泻热, 利湿透脓
- C. 通腑排脓, 养阴清热
- D. 温阳散寒, 活血通络
- E. 清热利湿, 解毒活血

114. 根据题干分析, 关于该病的外治法说法正确的是

- A. 无论脓已成或未成, 均可选用金黄散、玉露散或双柏散
- B. 脓已未成者可选用冲和膏、红灵丹油膏外敷
- C. 早期直接采取手术治疗
- D. 用6%~8%的明矾溶液入直肠黏膜下层
- E. 以上说法均属于正确

112. E

解析: 根据题干分析诊断为肠痛的瘀滞证。治宜行气活血, 通腑泄热。方药为大黄牡丹汤合红藤煎加减。

113. A

解析: 解析同上。

114. A

解析: 针对肠痈可采取中药外敷: 无论脓已成或未成, 均可选用金黄散、玉露散或双柏散, 用水或蜜调成糊状, 外敷右下腹。如阑尾周围脓肿形成后, 可先行脓肿穿刺抽脓, 注入抗生素(2~3天抽脓1次), 用金黄膏或玉露膏外敷。

四、B1型选择题(115~150题)

答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(115~116题共用备选答案)

- A. 痛经
- B. 带下过少
- C. 胎动不安

- D. 子晕
- E. 滑胎

115. 肝气郁结, 血为气滞, 冲任不畅, 可发生

116. 肝阴不足, 肝阳偏亢, 可发生

115. A

解析: 肝气郁结, 则血为气滞, 冲任不畅, 发生月经先后无定期、痛经、经行乳房胀痛、闭经、妊娠腹痛、缺乳、不孕症、盆腔炎。

116. D

解析: 肝阳偏亢, 出现经前头痛、经行眩晕、子晕; 阴虚阳亢, 阳化风动, 肝火愈炽, 风火相扇, 发为子痫。

(117~118题共用备选答案)

- A. 异位妊娠已破损稳定型
- B. 异位妊娠已破损休克型
- C. 异位妊娠已破损不稳定型
- D. 异位妊娠已破损包块型
- E. 异位妊娠已破损腑实证

117. 哪种类型首选宫外孕I号方

118. 哪种类型首选宫外孕II号方

117. C

解析: 异位妊娠已破损期不稳定型。主要证候: 腹痛拒按, 腹部有压痛及反跳痛, 但逐渐减轻, 可触及界线不清的包块, 兼有少量阴道流血, 血压平稳, 脉细缓。治法: 活血祛瘀, 佐以益气。方药: 宫外孕I号方。118. D

解析: 异位妊娠已破损期包块型。主要证候: 腹腔血肿包块形成, 腹痛逐渐减轻, 可有下腹坠胀或便意感, 阴道出血逐渐停止, 脉细涩。治法: 活血祛瘀消癥。方药: 宫外孕II号方。

(119~120题共用备选答案)

- A. 胎元饮
- B. 寿胎丸
- C. 温土毓麟汤
- D. 长胎白术散
- E. 四君子汤

119. 气血虚弱胎萎不长的首选方是

120. 血寒宫冷胎萎不长的首选方是

119. A

解析：胎萎不长气血虚弱证。主要证候：妊娠 4~5 个月后，腹形和宫体增大明显小于妊娠月份，胎儿存活，面色萎黄或㿗白，身体羸弱，头晕心悸，少气懒言；舌质淡嫩，苔少，脉稍滑细弱无力。治法：补气益血养胎。方药：胎元饮。

120. D

解析：胎萎不长血寒宫冷证。主要证候：妊娠腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活，形寒怕冷，腰腹冷痛，四肢不温；舌淡苔白，脉沉迟滑。治法：温肾扶阳，养血育胎。方药：长胎白术散加巴戟天、艾叶。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 补肾祛瘀方
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 香棱丸
- D. 大黄牡丹汤
- E. 桃核承气汤

121. 气滞血瘀癥瘕的首选方是

122. 湿热瘀阻癥瘕的首选方是

121. C

解析：癥瘕气滞血瘀证。主要证候：下腹部结块，触之有形，按之痛或无痛，小腹胀满，月经先后不定，经血量多有块，经行难净，经色暗；精神抑郁，胸闷不舒，面色晦暗，肌肤甲错；舌质紫暗，或有瘀斑，脉沉弦涩。治法：行气活血，化瘀消癥。方药：香棱丸或大黄廑虫丸。

122. D

解析：癥瘕湿热瘀阻证。主要证候：下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经行量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤；舌暗红，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数。治法：清热利湿，化瘀消癥。方药：大黄牡丹汤。

(123~124 题共用备选答案)

- A. 脾
- B. 肝
- C. 肺
- D. 大肠
- E. 肾

123. 感冒夹滞的病位在肺和

124. 感冒夹惊的病位在肺和

123. A

解析：小儿脾常不足，饮食不节，感冒之后，脾运失司，乳食停滞，阻滞中焦，则腹胀纳呆，或伴吐泻，此为感冒夹滞；

124. B

解析：小儿神气怯弱，肝气未盛，感邪之后，热扰心肝，引动肝风，扰乱心神，易致睡卧不宁，惊惕抽风，此为感冒夹惊。

(125~126 题共用备选答案)

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 生脉散
- C. 玉屏风散合牡蛎散
- D. 清营汤
- E. 桂枝汤

125. 治疗肺卫不固型汗证的首选方为

126. 治疗营卫失调型汗证的首选方为

125. C

解析：肺卫不固型汗证。证候：以自汗为主，或伴盗汗，以头颈、胸背部汗出明显，动则尤甚，神疲乏力，面色少华，平时易患感冒，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：益气固表。代表方剂：玉屏风散合牡蛎散。

126. A

解析：营卫失调型汗证。证候：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。治法：调和营卫。代表方剂：黄芪桂枝五物汤。

(127~128 题共用备选答案)

- A. 虚证
- B. 实证
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 虚实夹杂证

127. 紫癜起病急，病程短，紫癜颜色鲜明者辨证属

128. 紫癜起病缓，病程长，紫癜颜色暗淡者辨证属

127. B

解析：颜色鲜明者为实。

128. A

解析：颜色暗淡者为虚。

(129~130 题共用备选答案)

- A. 厌恶进食，多食饱胀，精神尚可
- B. 不欲饮食，脘腹胀满，烦躁多啼
- C. 不思进食，食而不化，形瘦肢倦
- D. 不思进食，食少饮多，便干烦躁
- E. 食欲不振，大便稀溏，完谷不化

129. 厌食脾胃气虚证证见

130. 厌食脾胃阴虚证证见

129. C

解析：厌食脾胃气虚证。证候：不思进食，食而不化，大便溏薄夹不消化食物，面色少华。形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。治法：健脾益气，佐以助运。代表方剂：异功散、参苓白术散。

130. D

解析：厌食脾胃阴虚证。证候：不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。治法：滋阴养胃，佐以助运。代表方剂：养胃增液汤、益胃汤。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 热肿
- B. 寒肿
- C. 风肿
- D. 湿肿
- E. 痰肿

131. 发病急骤，漫肿宣浮的是

132. 皮肉重垂胀急，深按凹陷的是

131. C

解析：风肿：发病急骤，漫肿宣浮，或游走无定，不红微热，或轻微疼痛。见于疔腮、大头瘟等。

132. D

解析：湿肿：皮肉重垂胀急，深按凹陷，如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水，浸淫皮肤。见于股肿、湿疮。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 内发丹毒
- B. 赤游风
- C. 流火
- D. 抱头火丹
- E. 类丹毒

133. 患者躯干部皮肤突然发红成片，色如丹涂的急性感染性疾病称

134. 患者头面部皮肤突然发红成片，色如涂丹的急性感染性疾病称

133. A

解析：根据其发病部位的不同，丹毒有不同的病名，如生于躯干部的内发丹毒，发于头面部的抱头火丹，发于小腿足部的流火，多生于新生儿臀部的赤游丹毒等。

134. D

解析：根据其发病部位的不同，丹毒有不同的病名，如生于躯干部的内发丹毒，发于头面部的抱头火丹，发于小腿足部的流火，多生于新生儿臀部的赤游丹毒等。

(135~136 题共用备选答案)

- A. 脓疱疮
- B. 疥疮
- C. 蛇串疮
- D. 湿疮
- E. 以上均不是

135. 侧腰部皮肤有成簇状的丘疱疹，呈带状分布，疼痛剧烈。应诊断为

136. 皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，易转为慢性。诊断为

135. C

解析：蛇串疮特点：皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹，累累如串珠，排列成带状，沿一侧周围神经分布区出现，局部刺痛或伴淋巴结肿大。

136. D

解析：湿疮的临床特点：皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，有渗出倾向，反复发作，易成慢性等。根据病程可分为急性、亚急性、慢性三类。急性湿疮以丘疱疹为主，炎症明显，易渗出；慢性湿疮以苔藓样变为主，易反复发作。

(137~138 题共用备选答案)

- A. 三金排石汤加减
- B. 八正散加减
- C. 知柏地黄汤加减
- D. 济生肾气丸加减
- E. 金铃子散合石苇散加减

137. 尿石症之气血瘀滞证的主治方剂是

138. 尿石症之肾气不足证的主治方剂是

137. E

解析：尿石症之气血瘀滞证：发病急骤，腰腹胀痛或绞痛，疼痛向外阴部放射，尿频，尿急，尿黄或赤。舌暗红或有瘀斑，脉弦或弦数。治法：理气活血，通淋排石。方药：金铃子散合石苇散加减。

138. D

解析：尿石症之肾气不足证：结石日久，留滞不去，腰部胀痛，时发时止，遇劳加重，疲乏无力，尿少或频数不爽，或面部轻度浮肿。舌淡苔薄，脉细无力。治法：补肾益气，通淋排石。方药：济生肾气丸加减。

(139~140 题共用备选答案)

- A. 体液传播
- B. 土壤传播
- C. 飞沫传播
- D. 水、食物、苍蝇传播
- E. 蚊虫传播

139. 流感传播途径主要是

140. 流脑传播途径主要是

139. C

解析：流感经呼吸道 - 空气飞沫传播，也可通过直接接触或病毒污染物品间接接触传播。

140. C

解析：流行性脑脊髓膜炎简称流脑，是由脑膜炎奈瑟菌引起的一种急性化脓性脑膜炎，以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。主要通过咳嗽、喷嚏、说话等由飞沫借空气经呼吸道传播。

(141~142 题共用备选答案)

- A. 病程超过 2 周
- B. 病程超过 1 月
- C. 病程超过 2 月
- D. 病程超过半年
- E. 病程超过 1 年

141. 慢性肝炎

142. 慢性菌痢

141. D

解析：慢性肝炎指急性肝炎病程超过半年，或原有慢性乙型、丙型、丁型肝炎或慢性肝炎病毒携带史，本次又因同一病原再次出现肝炎症状、体征及肝功能异常者。

142. C

解析：急性菌痢反复发作或迁延不愈达 2 个月以上者即为慢性菌痢。

(143~144 题共用备选答案)

- A. 发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B. 发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C. 腹泻，呕吐，水样大便
- D. 发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E. 低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

143. 急性菌痢典型表现为

144. 霍乱典型表现为

143. B

解析：典型菌痢：起病急，有发热（体温可达 39℃或更高），腹痛、腹泻、里急后重、黏液或脓血便，并有头痛、乏力、食欲减退等全身中毒症状。

144. C

解析：大便量多，为米泔水样或清水样，或呈洗肉水样，稍有鱼腥味。

(145~146 题共用备选答案)

- A. 超声波
- B. 洗手
- C. 碘类消毒
- D. 电离辐射
- E. 紫外线

145. 属高效消毒法的是

146. 属灭菌法的是

145. E

解析：高效消毒法：能杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）病毒、真菌及其孢子，并对细菌芽孢有显著杀灭作用。主要有紫外线消毒法和臭氧、含氯消毒剂、过氧化氢等。

146. D

解析：灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物。该类消毒方法有热力、电离辐射、微波等物理方法和甲醛、戊二醛、过氧乙酸、环氧乙烷等化学灭菌剂。

(147~148 题共用备选答案)

- A. 新药
- B. 麻醉药
- C. 进口药
- D. 处方药
- E. 非处方药

147. 必须持有医师开具的处方才能进行销售、调剂和使用的药品是

148. 消费者可根据自行判断并进行购买和使用的药品是

147. D

解析：处方药就是必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品；而非处方药则不需要凭医师处方即可自行判断、购买和使用的药品。此题属于常识性的知识点。

148. E

解析：处方药就是必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品；而非处方药则不需要凭医师处方即可自行判断、购买和使用的药品。此题属于常识性的知识点。

(149~150 题共用备选答案)

- A. 以人为本，践行宗旨
- B. 遵纪守法，依法执业
- C. 尊重患者，关爱生命
- D. 廉洁自律，恪守医德
- E. 优质服务，医患和谐

149. 弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是

150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨，以病人为中心，全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是

149. D

解析：医疗机构从业人员基本行为规范第八条：廉洁自律，恪守医德。弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物，不利用执业之便谋取不正当利益；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、销售企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成，不参与其提供的各类娱乐活动；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销，不倒卖号源。

150. A

解析：医疗机构从业人员基本行为规范第四条：以人为本，践行宗旨。坚持救死扶伤、防病治病的宗旨，以病人为中心，全心全意为人民健康服务。