

1.男，48岁。3年前行化脓性阑尾炎手术，后常有腹痛。近两天来腹痛加重，频繁呕吐，呕吐物有粪臭味，无肛门排气排便，查体明显腹胀，腹部压痛，拟诊为肠梗阻。最可能的类型是

- A.粘连性肠梗阻
- B.肠扭转所致肠梗阻
- C.肠套叠所致肠梗阻
- D.腹外疝所致肠梗阻
- E.绞窄性肠梗阻

答案：A

解析：

该病人具有典型的“痛、呕、胀、闭”临床特点，应考虑为肠梗阻。结合“患者3年前行化脓性阑尾炎手术，后常有腹痛”，考虑该肠梗阻为黏连性肠梗阻，立位X线检查发现气液平面可明确诊断。肠梗阻是典型的外科急腹症，所有外科急腹症患者非手术治疗期间最重要的护理措施就是禁食、胃肠减压。

2.炎症性病变所致的急腹症一般不会出现

- A.持续性腹痛
- B.体温升高、白细胞计数升高
- C.恶心、呕吐
- D.固定压痛点
- E.肠鸣音亢进

答案：E

解析：

考察急腹症的体征。炎症性疾病所致急腹症一般有麻痹性肠梗阻表现，因此肠鸣音减弱或消失。

3.结肠癌的好发部位是

- A.降结肠
- B.盲肠
- C.升结肠
- D.乙状结肠
- E.横结肠

答案：D

解析：

结肠癌的好发部位是直肠和乙状结肠

4.输卵管峡部妊娠时，最易出现的病理结局是

- A.孕卵向宫腔生长
- B.陈旧性宫外孕
- C.继发性腹腔妊娠
- D.输卵管妊娠破裂
- E.输卵管妊娠流产

答案：D

解析：

孕卵在子宫腔外着床发育的异常妊娠过程。也称“宫外孕”。以输卵管妊娠最常见。病因常由于输卵管管腔或周围的炎症，引起管腔通畅不佳，阻碍孕卵正常运行，使之在输卵管内停留、着床、发育，导致输卵管妊娠流产或破裂。

5.下列疾病中，以假小叶形成为主要病理改变的是

- A.慢性肝淤血
- B.弥漫型肝癌
- C.急性重型肝炎
- D.肝硬化
- E.亚急性重型肝炎

答案：D

解析：

6.胰腺癌最常见的发生部位是

- A.胰管
- B.胰导管
- C.胰头部
- D.胰体部
- E.胰尾部

答案：C

解析：胰腺癌最常见的发生部位是胰头部

7.新生儿低钙血症症状多出现在

- A.生后 10 天
- B.生后 5 ~ 10 天
- C.生后 5 ~ 12 天
- D.生后 6 ~ 10 天
- E.生后 8 ~ 10 天

答案：B

解析：

血清钙低于 2mmol/L 时，称为低钙血症。低钙血症常因甲状旁腺功能不全，维持正常血钙的作用减弱或丧失而发病。多见于甲状旁腺损伤或特发性萎缩的患者，也有因甲状腺后引起甲状旁腺功能减退者，约占 2%。甲状旁腺功能减退时临床表现常不明显，仅在甲状旁腺功能需要增加（如妊娠、哺乳）时，才出现临床症状。症状多出现于生后 5 ~ 10 天。主要表现为烦躁不安、肌肉抽动及震颤，可有惊跳及惊等，手足搐搦和喉痉挛少见。惊厥发作时常伴有呼吸暂停和发绀；发作间期一般情况良好，但肌张力稍高，腱反射亢进，踝阵挛可呈阳性。早产儿生后 3 天内易出现血钙降低，其降低程度一般与胎龄成反比，通常无明显体征，可能与其发育不完善、血浆蛋白低和酸中毒时血清游离钙相对较高等有关。

8.心脏的正常起搏点是

- A.窦房结
- B.结间束
- C.房室结
- D.希氏束
- E.浦肯野纤维

答案：A

解析：心脏的正常起搏点是窦房结

9. 护士执业注册管理办法规定的健康标准不包括

- A. 乙肝表面抗原阳性，但肝功能正常者
- B. 双耳听力障碍
- C. 色弱
- D. 色盲
- E. 精神病史

答案：A

解析：

符合本办法护士执业注册管理办法规定的健康标准：①无精神病史；②无色盲、色弱、双耳听力障碍；③无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。

10. 病理学上区分内痔与外痔的分界线为

- A. 直肠肛门移行带
- B. 内括约肌
- C. 齿状线
- D. 白线
- E. 肛垫

答案：C

解析：区分内痔与外痔的分界线为齿状线，以上为内痔，以下为外痔。

11. 中医在诊治疾病的活动中，主要在于

- A. 辨识治疗方法
- B. 辨识体征
- C. 辨病
- D. 辨证
- E. 辨症

答案：D

解析：中医在诊治疾病的活动中，主要在于辨证

12. 短绌脉常见于

- A. 肺动脉高压患者
- B. 心包积液患者
- C. 左心房传导阻滞患者
- D. 动脉导管未闭患者
- E. 心房纤颤患者

答案：E

解析：短绌脉常见于心房纤颤患者、脉搏短绌指在同一时间内测定的脉率少于心率，且脉搏强弱不等，快慢不一。特点为心律完全不规则，心率快慢不一，心音强弱不等。发生机制是由于心肌收缩力强弱不等，这种现象称为“脉搏短绌”或“绌脉”。见于心房纤维颤动（房颤）的患者。

13. 伤寒病人常见的热型是

- A. 间歇热
- B. 不规则热
- C. 体温最低
- D. 稽留热
- E. 弛张热

答案：D

解析：

患有稽留热的病人体温常常会持续在 39℃-40℃ 以上，而且常见于肺炎链球菌肺炎，伤寒，斑疹伤寒等的发热极期，所以，伤寒病人的热型就是稽留热。

14. 患者，男性，65 岁。发现右腹股沟内侧包块 3 年余。3 天前腹股沟包块突然增大、变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛，8 小时前疼痛有所缓解，但出现发热，患者最可能出现了

- A. 急性阑尾炎
- B. 绞窄性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 难复性疝
- E. 易复性疝

答案：B

解析：

根据疝内容物的病理变化分为以下几种类型，各种类型均有其相应的临床表现。（1）易复性疝：疝的囊颈比较宽大，疝内容物很易回纳到腹腔。在站立、行走、咳嗽或用力排便、排尿时，腹腔内压力增高，疝内容物即突出，平卧休息或轻轻按压即可回纳。当疝内容物突出时有下坠感，一般无其他不适。（2）难复性疝：病程长或曾使用疝托，囊颈受到摩擦增厚，伸展性差，致使不易或只能部分回纳。如盲肠或膀胱及其浆膜也成为疝囊的一个组成部分，又称滑动性疝，内容物一般不可完全回纳。（3）嵌顿性疝：如腹腔内压力骤然升高，疝内容物被强行疝出并卡在狭小坚韧的疝环，不能回纳，疝内容物尚无血运障碍。临床表现为疝块肿大，有剧痛和不能回纳。（4）绞窄性疝：疝内容物嵌顿后发生血运障碍，即转化成绞窄性疝。其临床表现远较嵌顿性疝严重。疝块增大、疼痛加剧，可伴有肠梗阻和毒血症症状，肠管坏死后局部有红、热、压痛等急性炎症表现。严重病例可并发感染性休克危及生命。该患者腹股沟包块突然增大，变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛，开始发热，说明出现组织缺血坏死，属于绞窄性疝。

15. 患儿，女，6 个月。室间隔缺损，哭闹时常有口唇发绀。对其饮食护理正确的是

- A. 勿边喂哺边吸氧
- B. 每餐宜喂饱，以保证营养
- C. 提供低蛋白易消化食物
- D. 喂哺后取仰卧位以利消化
- E. 喂哺过程可暂停，给予休息

答案：A

解析：

患儿有缺氧症状，所以选项 A、D 不正确；选项 B 增加心脏负荷，患儿室间隔缺损，所以选项 B 不可选；患儿 6 个月不宜低蛋白饮食，所以选项 C 不可选。选项 E 可以很好的减轻心脏负荷、改善缺氧症状。故，此题正确答案为选项 E。

16.患者，男性，23岁。胸部外伤致右侧第5肋骨骨折并发气胸，呼吸困难、发绀，出冷汗。查体：血压90/60mmHg，气管向左侧移位，右胸部饱满，叩诊呈鼓音，呼吸音消失，颈胸部有广泛皮下气肿。造成该患者极度呼吸困难、发绀的主要原因是

- A.广泛皮下气肿
- B.健侧肺扩张受限
- C.伤侧胸腔内压力不断升高
- D.静脉血液回流受阻
- E.纵隔向健侧移位

答案：C

解析：

单根肋骨骨折若尖锐的肋骨断端向内移位，刺破壁胸膜和肺组织，可产生气胸、皮下气肿，患者出现呼吸困难、发绀等。

17.新生儿，出生3天，今晨喂奶时护士发现其口腔出现白色斑点，棉签擦拭不去，可采用

- A.0.9%生理盐水清洁口腔
- B.2%碳酸氢钠溶液清洁口腔
- C.2%利多卡因涂抹患处
- D.3%过氧化氢溶液清洁口腔
- E.5%金霉素鱼肝油涂抹患处

答案：B

解析：鹅口疮可用2%碳酸氢钠溶液清洁口腔

18.

患者，女性，69岁。子宫Ⅱ度脱垂合并阴道前后壁膨出，行阴道子宫全切术加阴道前后壁修补术，术后护理措施正确的是

- A.术后3天行盆浴
- B.术后进食少渣半流质8天
- C.术后保留尿管5-7天
- D.术后平卧位1天，次日起半卧位
- E.术后每日测量生命体征2次至正常

答案：E

解析：术后平卧，阴道有伤口禁止盆浴，少渣半流质因素3-5天，留置尿管10天左右。

19.患者，男性，68岁。因“颌下急性蜂窝织炎”入院。患者颈部明显红肿、疼痛，伴严重全身感染症状，自感心慌、气紧、胸闷，口唇发绀。既往有冠心病及慢性支气管炎史。入院后予以补液、抗感染治疗。目前患者最可能发生的并发症是

- A.慢性支气管炎急性发作
- B.急性心肌梗死
- C.急性呼吸衰竭
- D.窒息
- E.急性肺水肿

答案：D

解析：

根据题干，患者颈部明显红肿、疼痛，伴严重全身感染症状，自感心慌、气紧、胸闷，口唇发绀。既往有冠心病及慢性支气管炎史，体征显示此时最可能发生的并发症就是窒息。

20. 产妇，34岁。阴道分娩后发生晚期产后出血，最常见的原因是

- A. 胎盘附着面复旧不全
- B. 蜕膜残留
- C. 肿瘤
- D. 子宫内膜炎
- E. 胎盘、胎膜残留

答案：E

解析：

晚期产后出血就是指分娩24小时以后的出血，在产褥期发生大量出血出血量超过500毫升，主要病因有宫腔内有组织残留，子宫收缩乏力，或者是软产道裂伤等。

21. 患者，男性，56岁。肝硬化多年，行脾脏切除术后10天。目前血氨增高，无临床表现，处于亚临床肝性脑病阶段。饮食原则重点是

- A. 提供优质蛋白质
- B. 避免动物性食物
- C. 肠胃外营养
- D. 流食
- E. 无渣饮食

答案：A

解析：

高蛋白饮食可使肠道产氨较多，血氨升高，诱发HEP应控制蛋白质摄入量。酒精对肝脏损害较大，可加剧肝细胞坏死。指导患者合理安排饮食，保证热量摄入，低盐、低蛋白、高维生素，适量脂肪为原则，忌食粗糙、坚硬粗纤维和刺激性食物。肝硬化患者因肝细胞受损，对蛋白质的代谢和耐受能力均降低，如进食大量蛋白质，可使血氨升高而诱发肝性脑病。

22. 除腹痛外，高位小肠梗阻最主要的症状是

- A. 停止排气排便
- B. 肠腔积气
- C. 呕吐频繁
- D. 肠蠕动亢进
- E. 腹胀明显

答案：C

解析：

患者出现高位小肠梗阻之后，除了会有明显的剧烈腹痛之外，还可能会出现以下比较明显的症状：患者会出现恶心、呕吐，甚至是频繁的呕吐，肠鸣音消失，严重的还可能会出现休克的情况。患者会感觉到全身发冷、四肢冰凉、血压下降。患者可能会出现肛门排气、排便停止。患者会食欲不振，长时间有可能会导致营养不良、消瘦的情况。

23. 细菌性肝脓肿患者最常见的早期症状是

- A. 恶心
- B. 黄疸

- C.贫血
- D.右上腹肌紧张，局部触痛明显
- E.寒战、高热

答案：E

解析：

寒战和高热是最常见的早期症状。

24. 抑郁症患者的核心表现是

- A.情绪低落
- B.思维迟缓
- C.情感淡漠
- D.睡眠障碍
- E.自责负罪

答案：A

解析：抑郁症患者的核心表现是情绪低落

25. 最危急的心律失常类型是

- A.窦性心动过速
- B.心房颤动
- C.室上性心动过速
- D.房室传导阻滞
- E.心室颤动

答案：E

解析：最危急的心律失常类型是心室颤动

26. 夏科(Charcot)三联征是指

- A.腹痛、恶心、高热
- B.恶心、腹胀、寒战
- C.腹痛、腹胀、寒战高热
- D.腹痛、黄疸、恶心
- E.腹痛、寒战高热、黄疸

答案：E

解析：

夏柯（Charcot）三联征是指腹痛、寒战高热、黄疸。常提示胆管化脓性炎。

27. 支气管扩张患者典型的临床表现是

- A.慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血
- B.慢性咳嗽、大量脓痰、喘息
- C.慢性咳嗽、呼吸困难、反复咯血
- D.发作性喘息、大量脓痰、反复咯血
- E.慢性咳嗽、长期低热、反复咯血

答案：A

解析：

支气管扩张的临床表现有慢性咳嗽、大量脓痰，反复咯血，反复肺部感染及慢性感染中毒症状

28. 不符合水痘特点的描述是

- A. 潜伏期 14~16 天
- B. 有瘙痒感
- C. 皮疹多见于面部和四肢
- D. 发热 1~2 天内出疹
- E. 皮疹一般在 1~6 日内分批出齐

答案：C

解析：

以发热及皮肤和黏膜成批出现周身性红色斑丘疹、疱疹、痂疹为特征，皮疹呈向心性分布，主要发生在胸、腹、背，四肢很少。

29. 对流行性腮腺炎腮肿的护理，不合适的措施是

- A. 肿胀处可冷敷
- B. 腺肿处可用醋调青黛散外敷
- C. 宜进食易消化的软食
- D. 保持口腔清洁，餐后漱口
- E. 进食酸性食物以促进食欲

答案：E

解析：

进食水果、果汁和维生素 C 片等酸性食物可引起唾液的分泌增加，而使肿痛加剧，故流行性腮腺炎应忌食酸、辣、硬和干燥等引起唾液分泌增加的食物。

30. 猩红热的临床特点应除外

- A. 全身皮肤弥漫性密集红色小丘疹
- B. 口腔颊黏膜有柯氏斑
- C. 草莓舌
- D. 口周苍白圈
- E. 帕氏线

答案：B

解析：

麻疹黏膜斑（Koplik 斑）是麻疹早期具有特征性的体征，一般在出疹前 1~2 天出现。

31. 有机磷农药中毒时，瞳孔的变化是

- A. 瞳孔缩小
- B. 瞳孔扩大
- C. 瞳孔形状不规则
- D. 瞳孔不等大
- E. 瞳孔忽大忽小

答案：A

解析：有机磷农药中毒时，瞳孔的变化是瞳孔针尖样缩小。



32. 患者，男性，27岁。因右上腹阵发性疼痛2天入院，医生在检查时发现墨菲氏征阳性，提示该患者可能患

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 胆总管结石
- D. 胃十二指肠溃疡穿孔
- E. 肝脾破裂

答案：B

解析：

约85%的急性胆囊炎病人在发病初期有中上腹和右上腹阵发性绞痛，并有右肩胛下区的放射痛。常伴恶心和呕吐，并有墨菲氏征阳性。

33. 患者，女性，50岁。右上腹绞痛3小时，诊断为胆囊结石，为控制胆绞痛，最有效的止痛法是肌肉注射

- A. 阿尼利定(安痛定)
- B. 苯巴比妥钠
- C. 吗啡及阿托品
- D. 阿托品及哌替啶
- E. 地西洋

答案：D

解析：

解痉药可选用阿托品及山莨菪碱；止痛药可选用曲马多、哌替啶或其他作用效果更好的镇痛药，但需要注意的是阿片生物碱类镇痛药，如吗啡；甚至哌替啶，都可引起内脏平滑肌（其中包括胆道括约肌）痉挛，使胆内压增高，甚至诱发胆绞痛。

34. 患者，男性，28岁。工作中右手食指被电锯切割离断，立即将其送到医院行断肢再植。其断指的保存方式应该用无菌纱布包好，放入干净的塑料袋后再置于

- A. 干燥冷藏容器中
- B. 新洁尔灭中
- C. 酒精中
- D. 生理盐水中
- E. 与冰块直接接触的加盖容器中

答案：A

解析：

将断肢用纱布或清洁敷料包扎起来，并随病人一起送到医院。医务人员做好清创消毒后，在手术前要用无菌纱布包好断肢，把它放到4℃冰箱冷藏，若为多指离断则应做好标记分别包好。如没有冰箱可放到无孔塑料袋内放到干燥容器内冷藏。

35. 孕妇，孕5周，突感左下腹隐痛，近5个小时未缓解，急诊就医，体检：阴道后穹窿饱满，宫颈举痛(+)，考虑异位妊娠，需做辅助检查，首选简单可靠的方法是

- A. 阴道后穹窿穿刺
- B. 妊娠试验放免法
- C. 腹腔镜检查
- D. X线腹部平片
- E. B型超声波检查

答案：A

解析：阴道后穹窿穿刺

36.初孕妇，30岁。平素月经规律，妊娠36周，2015年3月2日来医院做产前检查。下次预约检查时间为

- A.2015年3月9日
- B.2015年3月11日
- C.2015年3月13日
- D.2015年3月14日
- E.2015年3月16日

答案：A

解析：

产前检查从确诊早孕开始，妊娠28周前每4周查1次，妊娠28周后每2周检查1次，妊娠36周后每周查1次。凡属高危妊娠者，应酌情增加产前检查次数。所以此题选A

37.初孕妇，30岁。平素月经规律，妊娠36周，2015年3月2日来医院做产前检查。下次预约检查时间为

- A.2015年3月9日
- B.2015年3月11日
- C.2015年3月13日
- D.2015年3月14日
- E.2015年3月16日

答案：A

解析：

产前检查从确诊早孕开始，妊娠28周前每4周查1次，妊娠28周后每2周检查1次，妊娠36周后每周查1次。凡属高危妊娠者，应酌情增加产前检查次数。所以此题选A

38.患者，女，38岁。长期大量饮酒。昨日酗酒后上腹剧烈疼痛并向腰部放射，伴阵发性加剧，体温38.8℃，血压80/50mmHg。初步考虑为急性胰腺炎。治疗过程中患者血压降至80/50mmHg，最可能的原因是

- A.合并感染
- B.食道静脉破裂
- C.伴胃溃疡
- D.出血坏死
- E.上感

答案：D

解析：

患者血压降低，发生休克，怀疑为出血坏死型胰腺炎

39.患者，女，38岁。长期大量饮酒。昨日酗酒后上腹剧烈疼痛并向腰部放射，伴阵发性加剧，体温38.8℃，血压80/50mmHg。初步考虑为急性胰腺炎。治疗过程中患者血压降至80/50mmHg，最可能的原因是

- A.合并感染
- B.食道静脉破裂
- C.伴胃溃疡
- D.出血坏死

E.上感

答案：D

解析：

患者血压降低，发生休克，怀疑为出血坏死型胰腺炎

40.下列有关含氯消毒剂的使用方法，正确的是

- A.溶液可预先配制
- B.可用来进行水的消毒
- C.0.02%的消毒液浸泡物品需 5min
- D.0.2%的消毒液浸泡乙肝病毒污染的物品需 10min
- E.高浓度的含氯消毒液不能杀死芽胞

答案：B

解析：下列有关含氯消毒剂的使用方法，正确的是可用来进行水的消毒，可见自来水

41.

左心衰早期最特征性的临床表现是

- A.劳力性呼吸困难
- B.阵发性夜间呼吸困难
- C.哮鸣音及吸气性呼吸困难
- D.带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E.端坐呼吸

答案：B

解析：左心衰：呼吸困难、甚至端坐呼吸，咳嗽，咯粉红色泡沫样痰，紫绀，乏力，夜尿多，甚至昏迷。体征：心尖区舒张期奔马律，双肺闻及广泛水泡音与哮鸣音。

42.洋地黄中毒最常见的心血管反应为

- A.心房颤动
- B.室早，二联律
- C.室颤
- D.心绞痛
- E.高血压

答案：B

解析：

洋地黄中毒时常见的毒性反应有：胃肠道反应、心脏方面的反应、神经系统反应。心脏方面的反应，可出现各种类型的心律失常，其中以室性早搏形成二联律最为常见。

43.消化性溃疡特征性的临床表现是

- A.黄疸
- B.食欲下降
- C.恶心、呕吐
- D.反酸、暖气
- E.节律性和周期性上腹痛

答案：E

解析：

44. 肝硬化致肝功能障碍可引起

- A. 血浆蛋白增多
- B. 凝血因子合成增多
- C. 脾大
- D. 雌激素水平升高
- E. 雄激素水平升高

答案：D

解析：肝硬化致肝功能障碍可引起雌激素水平升高，主要表现为肝掌、蜘蛛痣。

45. 怀疑急性胰腺炎时，首选的检查项目是

- A. 血钾
- B. 血肌酐
- C. 血淀粉酶
- D. 血尿酸
- E. 血白细胞计数

答案：C

解析：急性胰腺炎首选检查血淀粉酶

46. 经胃肠道传播的疾病是

- A. 麻疹
- B. 艾滋病
- C. 水痘
- D. 疟疾
- E. 脊髓灰质炎

答案：E

解析：

常见的消化道传染病有细菌性痢疾、脊髓灰质炎（即小儿麻痹症）、伤寒、副伤寒、霍乱、副霍乱、阿米巴痢疾、各种肠道病毒感染（如柯萨奇病毒、埃可病毒等），细菌性食物中毒以及各种肠道寄生虫病（如蛔虫病、绦虫病、蛲虫病、姜片虫病）等。

47. 患者，女性，30岁。产后大出血致急性肾衰竭。前1天尿量为200mL，呕吐物300mL，护士计算今天的补液量约为

- A. 2500mL
- B. 1500mL
- C. 1000mL
- D. 600mL
- E. 400mL

答案：C

解析：

急性肾衰竭病人每日进水量为一天液体总排出量加500ml，选C。

48. 患者，女性，60岁。拟择期行食管癌切除手术。现患者能进食粥之类的食物，护士建议的饮食为

- A. 高热量、高蛋白、高脂肪普食

- B.高热量、低蛋白、低脂肪流食
- C.高热量、低蛋白、低脂肪半流食
- D.高热量、高蛋白、高维生素半流食
- E.高热量、低蛋白、高维生素半流食

答案：D

解析：

术前指导病人合理进食高热量、高蛋白、含丰富维生素的流质或半流质饮食，术前 1 天禁食。术后禁食水 4~6 天，每日静脉输液，待肠功能恢复，逐步恢复饮食。

49.患者，女性，35 岁。诊断为侵蚀性葡萄胎，其治疗原则是

- A.定期随访
- B.子宫切除
- C.化疗为主
- D.放疗为主
- E.药物治疗

答案：C

解析：侵蚀性葡萄胎，其治疗原则是化疗为主

50.患者，女性，25 岁。诊断为缺铁性贫血，护士为其讲述服用铁剂的方法，患者如果复述出下列哪项说明该护士还需要再详细解说服用方法

- A.两餐之间服用
- B.饮茶促进铁剂吸收
- C.与维生素 C 同服
- D.不能同时喝牛奶
- E.用吸管吸服铁剂

答案：B

解析：

口服铁剂易引起胃肠道反应，该类药物宜在饭后服用。患者要使用吸管，避免牙齿染色；服铁剂同时忌饮茶、牛奶、咖啡。

51.患儿，男性，9 岁。2 周前因呼吸道感染，出现畏寒、发热，之后四肢皮肤出现大片瘀斑，来医院检查后，确诊为特发性血小板减少性紫癜。目前治疗的首选方案为

- A.输新鲜血小板
- B.使用糖皮质激素
- C.X 线脾区照射
- D.使用止血药
- E.脾切除

答案：B

解析：

本病治疗的目的是控制出血症状，减少血小板的破坏，但不强调将血小板计数提高至正常，以确保患者不因出血发生危险，又不因过度治疗而引起严重不良反应。ITP 的初始治疗 1) 糖皮质激素。2) 重度患者可使用大剂量丙种球蛋白。3) 国外可使用抗 Rh (D) 免疫球蛋白。ITP 的二线治疗 1) 可供选择的二线治疗药物包括硫唑嘌呤、环孢素 A、达那唑、长春生物碱、骁悉等。2) 脾切除术。

52. 患者，男性，60岁。确诊艾滋病病毒感染1年。现阑尾炎术后1天，创面有少量渗血。对该患者的护理措施正确的是
- A. 禁止陪护及探视
  - B. 限制患者与他人接触
  - C. 必须在患者床头卡贴隔离标志
  - D. 告知患者应履行“防止感染他人”的义务
  - E. 在患者床头柜上放置预防艾滋病的提示

答案：D

解析：

艾滋病患者术后创面有渗血，为了防止艾滋病毒的传播，告知患者应履行“防止感染他人”的义务。

53. 患者，男性，60岁。确诊艾滋病病毒感染1年。现阑尾炎术后1天，创面有少量渗血。对该患者的护理措施正确的是
- A. 禁止陪护及探视
  - B. 限制患者与他人接触
  - C. 必须在患者床头卡贴隔离标志
  - D. 告知患者应履行“防止感染他人”的义务
  - E. 在患者床头柜上放置预防艾滋病的提示

答案：D

解析：

艾滋病患者术后创面有渗血，为了防止艾滋病毒的传播，告知患者应履行“防止感染他人”的义务。

54. 患者，男性，30岁。高热待查，体温39.8℃，遵医嘱行乙醇拭浴降温。拭浴过程中，操作不当的是
- A. 以拍拭方式进行，不用力摩擦
  - B. 禁忌擦拭后颈部、腹部、足底等部位
  - C. 腋窝、腹股沟、心前区适当延长擦拭时间
  - D. 患者发生寒战、面色苍白时应立即停止
  - E. 体温降至39℃以下时，可取下头部冰袋

答案：C

解析：

乙醇擦浴时，胸前区、腹部、后颈、足底为擦浴的禁忌部位，擦至腋窝、肘窝、手心、腹股沟、腘窝处稍用力并延长停留时间。这些部位对冷刺激敏感容易引起腹滞、冻伤及反射性心率减慢等。

55. 患者，男性，30岁。高热待查，体温39.8℃，遵医嘱行乙醇拭浴降温。拭浴过程中，操作不当的是
- A. 以拍拭方式进行，不用力摩擦
  - B. 禁忌擦拭后颈部、腹部、足底等部位
  - C. 腋窝、腹股沟、心前区适当延长擦拭时间
  - D. 患者发生寒战、面色苍白时应立即停止
  - E. 体温降至39℃以下时，可取下头部冰袋

答案：C

解析：

乙醇擦浴时，胸前区、腹部、后颈、足底为擦浴的禁忌部位，擦至腋窝、肘窝、手心、腹股沟、腘窝处稍用力并延长停留时间。这些部位对冷刺激敏感容易引起腹滞、冻伤及反射性心率减慢等。

56. 患者，女性，23岁。患支气管扩张。近日来因偶感伤寒，咳大量黄色脓痰，入院治疗。导致本患者支气管扩张的可能因素是幼年时患过

- A. 腮腺炎
- B. 百日咳
- C. 猩红热
- D. 水痘
- E. 风疹

答案：B

解析：

五个选项中只有百日咳为呼吸道感染疾病。

57. 患者，女性，23岁。患支气管扩张。近日来因偶感伤寒，咳大量黄色脓痰，入院治疗。导致本患者支气管扩张的可能因素是幼年时患过

- A. 腮腺炎
- B. 百日咳
- C. 猩红热
- D. 水痘
- E. 风疹

答案：B

解析：

五个选项中只有百日咳为呼吸道感染疾病。

58. 治疗肾病综合征最有效的药物是

- A. 抗生素
- B. 降脂药
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 血管紧张素转化酶抑制剂

答案：C

解析：

使用激素尽管有某些副作用、且尚未解决复发问题，但临床实践证明激素仍是目前能诱导蛋白消失的有效药物，并作为肾病治疗的首选药。

59. 目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法是

- A. 双合诊检查
- B. 阴道B超
- C. 腹腔镜检查
- D. 分段诊断性刮宫
- E. 盆腔X线摄片

答案：C

解析：目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法是腹腔镜检查，直观

60.需夫妻双方同时治疗的炎症是

- A.外阴炎
- B.慢性宫颈炎
- C.细菌性阴道病
- D.滴虫阴道炎
- E.前庭大腺炎

答案：D

解析：

滴虫阴道炎应夫妻双方同时治疗，切断直接传播途径。

61.食管癌最简单易行的普查方法是

- A.B超
- B.CT检查
- C.钡餐X线检查
- D.纤维食管镜检查
- E.带网气囊食管脱落细胞检查(食管拉网)

答案：E

解析：

62.肝癌高发人群的普查方法是

- A.AFP和B超
- B.放射性核素肝扫描
- C.肝穿刺针吸细胞学检查
- D.选择性肝动脉造影
- E.CT检查

答案：A

解析：肝癌高发人群的普查方法是甲胎蛋白AFP和B超

63.胰腺癌的好发部位是

- A.全胰腺
- B.胰腺头颈部
- C.胰腺尾部
- D.胰腺体尾部
- E.胰腺颈体部

答案：B

解析：胰腺癌的好发部位是胰腺头颈部

64.正常小儿白细胞分类出现两次交叉的时间（或年龄）分别是

- A.出生后2~4天和1~3岁
- B.出生后4~6天和4~6岁
- C.出生后6~8天和4~6岁
- D.出生后8~10天和8~10岁
- E.出生后13~15天和13~15岁



答案：B

解析：

白细胞分类中性粒细胞和淋巴细胞有两次交叉。出生时中性粒细胞约占 0.65，淋巴细胞约占 0.30。随着白细胞总数下降，中性粒细胞比例也相应下降，出生后 4~6d 时两者比例约相等，形成第一次交叉；婴幼儿期淋巴细胞约占 0.65，中性粒细胞约占 0.30，至 4~6 岁时两者又相等，即形成第二次交叉；6 岁以后中性粒细胞比例增多，分类逐渐达成年人值。嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞及单核细胞各年龄期差异不大。

65. 急性再生障碍性贫血患者一般不出现

- A. 进行性贫血
- B. 感染
- C. 出血
- D. 全血细胞减少
- E. 肝、脾淋巴结肿大

答案：E

解析：

再生障碍性贫血病人是由各种原因致造血干细胞的数量减少和(或)功能异常而引起的一类贫血。外周血液中红细胞、中性粒细胞、血小板均明显减少。临床主要表现为进行性贫血、感染和出血。

66. DIC 早期最常用的抗凝药物是

- A. 肝素
- B. 双香豆素
- C. 华法林
- D. 枸橼酸钠
- E. 低分子肝素钙

答案：A

解析：DIC 早期最常用的抗凝药物是肝素

67. 宫腔节育器放置的时间，不妥当的是

- A. 哺乳期排除早孕者
- B. 人工流产术后即放置
- C. 月经干净后一周内
- D. 剖宫产 6 个月后
- E. 自然分娩后即可放置

答案：E

解析：

(1) 月经周期间放置一般以月经干净后 3~7 天内放置较为适宜。

(2) 人工流产后即时放置。

(3) 中期妊娠引产后放置在非经阴道手术的中期妊娠后即时放置，如腹部穿刺羊膜腔利凡诺引产者，于胎儿娩出后，清宫手术时放置。

(4) 产后 42 天及哺乳期闭经者，如除外妊娠且子宫收缩恢复良好，恶露干净 5 天以上，无子宫腔或会阴感染现象者，可放置节育器，以减少哺乳期妊娠。

(5) 剖宫产术者宜半年后放置。

(6) 节育器放置期满，无任何症状，可于取器后立即更换。

(7) 产时和剖宫产时胎盘娩出后立即放置，

(8) 房事后(性交后)放置。

68. 某小儿体检时发现头围与胸围两者几乎相等，估计其年龄是

A. 4 个月

B. 6 个月

C. 10 个月

D. 12 个月

E. 20 个月

答案：D

解析：

1 岁时胸围与头围大致相等，1 岁以后胸围超过头围，其差数 (cm) 约等于其岁数减 1。

69. 下列关于护士执业注册应具备的条件不正确的是

A. 必须在教学、综合医院完成 12 个月以上护理临床实习

B. 在中等职业学校、高等学校完成教育部和卫生部规定的普通全日制学习，并取得相应学历证书

C. 通过国务院卫生主管部门组织的护士执业资格考试

D. 符合国务院卫生主管部门规定的健康标准

E. 具有完全民事行为能力

答案：A

解析：应为必须在教学、综合医院完成 8 个月以上护理临床实习

70. 患者，男性，45 岁。患急性肾炎，眼睑及面部水肿，该患者每日饮食中应控制

A. 钠盐量不超过 0.5g

B. 钠盐量不超过 2g

C. 钠盐量不超过 4g

D. 钠盐量不超过 5g

E. 钠盐量不超过 6g

答案：B

解析：患者应低盐饮食钠盐量不超过 2g

71. 患儿，男，3 岁。哭闹时出现口唇发绀，听诊闻及胸骨左缘收缩期杂音，考虑为先天性心脏病。最具有诊断价值的检查是

A. 心电图

B. X 线检查

C. 超声心动图

D. 血常规检查

E. 心肌标志物检查

答案：C

解析：先天性心脏病诊断可用超声心动图

72. 患儿，男，1 岁。腹疼哭闹，腹部可触及腊肠样包块，诊断为肠套叠，其大便性状为

A. 黏液血便

B. 脓血便

- C.果酱样血便
- D.柏油便
- E.白陶土色便

答案：C

解析：

婴儿肠套叠发生血便者达80%以上，为首要症状就诊，多在发病后6~12小时排便，早者在发病后3~4小时即可出现，为稀薄黏液或胶冻样果酱色血便，数小时后可重复排出。

73.患者，王某，28岁。未产妇，诉说平素月经规律，28天一次，每次持续3~4天。末次月经是2月11日，距今已有8周，现患者感觉疲乏，乳房触痛明显。护士若考虑该妇女怀孕，该孕妇的预产期是

- A.10月18日
- B.11月5日
- C.11月18日
- D.12月5日
- E.12月18日

答案：C

解析：

产期的推算：月份减3或加9，日期加7，该孕妇的预产期应该是。11月18日

74.患儿，女，足月儿。出生后1分钟评估患儿情况：躯干皮肤色红，四肢较紫，心率120次/分，哭声响亮，肌张力好，呼吸45次/分。该足月儿最终的Apgar评分是

- A.6分
- B.7分
- C.8分
- D.9分
- E.10分

答案：D

解析：

Apgar评分，即阿氏评分、新生儿评分，是孩子出生后立即检查身体状况的标准评估方法。在孩子出生后，根据皮肤颜色、心搏速率、呼吸、肌张力及运动、反射五项体征进行评分。满10分者为正常新生儿，评分7分以下的新生儿考虑患有轻度窒息，评分在4分以下考虑患有重度窒息。大部分新生儿的评分多在7~10分之间。评分具体标准是：（1）皮肤颜色：评估新生儿肺部血氧交换的情况。全身皮肤呈粉红色为2分，手脚末梢呈青紫色为1分，全身呈青紫色为0分。（2）心搏速率：评估新生儿心脏跳动的强度和节律性。心搏有力大于100次/分钟为2分，心搏微弱小于100次/分钟为1分，听不到心音为0分。（3）呼吸：评估新生儿中枢和肺脏的成熟度。呼吸规律为2分，呼吸节律不齐(如浅而不规则或急促费力)为1分，没有呼吸为0分。（4）肌张力及运动：评估新生儿中枢反射及肌肉强健度。肌张力正常为2分，肌张力异常亢进或低下为1分，肌张力松弛为0分。（5）反射：评估新生儿对外界刺激的反应能力。弹足底或其他刺激大声啼哭为2分，低声抽泣或皱眉为1分，毫无反应为0分。该患者四肢发紫，扣除一分，其他均正常，得9分。故答案选D。

Apgar评分，即阿氏评分、新生儿评分，是孩子出生后立即检查身体状况的标准评估方法。在孩子出生后，根据皮肤颜色、心搏速率、呼吸、肌张力及运动、反射五项体征进行评分。满10分者为正常新生儿，评分7分以下的新生儿考虑患有轻度窒息，评分在4分以下考虑

患有重度窒息。大部分新生儿的评分多在 7~10 分之间。评分具体标准是：(1) 皮肤颜色：评估新生儿肺部血氧交换的情况。全身皮肤呈粉红色为 2 分，手脚末梢呈青紫色为 1 分，全身呈青紫色为 0 分。(2) 心搏速率：评估新生儿心脏跳动的强度和节律性。心搏有力大于 100 次/分钟为 2 分，心搏微弱小于 100 次/分钟为 1 分，听不到心音为 0 分。(3) 呼吸：评估新生儿中枢和肺脏的成熟度。呼吸规律为 2 分，呼吸节律不齐(如浅而不规则或急促费力) 为 1 分，没有呼吸为 0 分。(4) 肌张力及运动：评估新生儿中枢反射及肌肉强健度。肌张力正常为 2 分，肌张力异常亢进或低下为 1 分，肌张力松弛为 0 分。(5) 反射：评估新生儿对外界刺激的反应能力。弹足底或其他刺激大声啼哭为 2 分，低声抽泣或皱眉为 1 分，毫无反应为 0 分。该患者四肢发紫，扣除一分，其他均正常，得 9 分。故答案选 D。

75. 某 26 岁初产妇，双胎妊娠 35 周。因下腹疼痛 2 小时入院，查体：宫口开大 6cm，其最可能发生的情况是

- A. 早产
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥
- D. 妊娠高血压综合征
- E. 子宫收缩乏力

答案：A

解析：

早产的临床表现主要是子宫收缩。前置胎盘和胎盘早剥都会有阴道流血。妊娠高血压的临床表现有高血压，尿蛋白。原发性子宫收缩乏力是指产程开始子宫收缩乏力，宫口不能如期扩张，胎先露部不能如期下降，产程延长；继发性子宫收缩乏力是指产程开始子宫收缩正常，只是在产程进展到某阶段(多在活跃期或第二产程)，子宫收缩转弱，产程进展缓慢，甚至停滞。故答案选 A。

76. 患者，男性，45 岁。因脑外伤入院，神志不清，意识昏迷。查体：体温 39℃，脉搏 108 次/分，呼吸 24 次/分，血压 160/100mmHg，现需通过鼻饲维持营养。胃管插入后，应验证其在胃内，正确的方法是

- A. 注入少量温开水，于胃部听气过水声
- B. 注入少量温开水，听肠鸣音
- C. 注入少量气体，听肠鸣音
- D. 注入少量气体，于胃部听气过水声
- E. 将胃管末端放入水中，见有气泡逸出

答案：D

解析：

胃管插至所标记处，先证实胃管在胃内，方法有三种：1) 将胃管末端接无菌注射器回抽，可抽出胃液。2) 将导管末端放入盛有水的碗中，无气泡溢出。如有大量气泡，证明已误入气管。3) 将听诊器放在病人胃部，用无菌注射器迅速注入 10ml 空气，听到有气过水声。

77. 患者，男性，45 岁。因脑外伤入院，神志不清，意识昏迷。查体：体温 39℃，脉搏 108 次/分，呼吸 24 次/分，血压 160/100mmHg，现需通过鼻饲维持营养。胃管插入后，应验证其在胃内，正确的方法是

- A. 注入少量温开水，于胃部听气过水声
- B. 注入少量温开水，听肠鸣音
- C. 注入少量气体，听肠鸣音
- D. 注入少量气体，于胃部听气过水声

E.将胃管末端放入水中，见有气泡逸出

答案：D

解析：

胃管插至所标记处，先证实胃管在胃内，方法有三种：1) 将胃管末端接无菌注射器回抽，可抽出胃液。2) 将导管末端放入盛有水的碗中，无气泡溢出。如有大量气泡，证明已误入气管。3) 将听诊器放在病人胃部，用无菌注射器迅速注入 10ml 空气，听到有气过水声。

78.患者，男性，38岁。因呼吸道感染伴咳嗽、发热到医院就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌肉注射，每日 2 次。0.1mL 青霉素皮试液含青霉素

- A.10U
- B.20U
- C.60U
- D.100U
- E.200U

答案：B

解析：青霉素过敏史不详的患者在注射青霉素前必须通过青霉素皮试，青霉素皮试液的标准是每毫升试验液含青霉 200 ~ 500U，所以 0.1mL 皮试液含青霉素 20 ~ 50U。

79.患者，男性，38岁。因呼吸道感染伴咳嗽、发热到医院就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌肉注射，每日 2 次。0.1mL 青霉素皮试液含青霉素

- A.10U
- B.20U
- C.60U
- D.100U
- E.200U

答案：B

解析：青霉素过敏史不详的患者在注射青霉素前必须通过青霉素皮试，青霉素皮试液的标准是每毫升试验液含青霉 200 ~ 500U，所以 0.1mL 皮试液含青霉素 20 ~ 50U。

80.患者，男性，38岁。因呼吸道感染伴咳嗽、发热到医院就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌肉注射，每日 2 次。根据患者症状表现，首先选用的药物是

- A.多巴胺
- B.地塞米松
- C.盐酸肾上腺素
- D.去甲肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

答案：C

解析：

立即皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 0.5 ~ 1mL。

81.患者，男性，38岁。因呼吸道感染伴咳嗽、发热到医院就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌肉注射，每日 2 次。根据患者症状表现，首先选用的药物是

- A.多巴胺
- B.地塞米松

- C.盐酸肾上腺素
- D.去甲肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

答案：C

解析：

立即皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 0.5 ~ 1mL。

82. 不符合癫痫患者用药原则的是

- A.选择最佳药物
- B.长期用药
- C.规律用药
- D.三药联合
- E.定时测血药浓度

答案：D

解析：癫痫患者用药应选择最佳药物、规律用药、长期用药、定时测血药浓度。

83. 禁忌使用鼻饲的患者是

- A.昏迷
- B.口腔手术
- C.脑出血
- D.婴幼儿
- E.食管胃底静脉曲张

答案：E

解析：食管—胃底静脉曲张患者禁忌鼻饲，以免引起出血。

84. 以下符合小儿生长发育顺序规律的是

- A.由高级到低级
- B.各系统发育快慢均衡
- C.生长发育年龄阶段速度均衡
- D.先慢后快
- E.由简单到复杂

答案：E

解析：小儿生长发育一般遵循由上到下，由近至远，由粗到细、由低级到高级，由简单到复杂的顺序或规律。

85. 患者，男性，68岁。因肝硬化、肝性脑病、腹水入院，护士给患者家属解释给患者口服乳果糖的主要目的是

- A.减少氨的产生
- B.促进排便
- C.补充能量
- D.抑制大脑假性神经递质的形成
- E.抑制肠内细菌生长

答案：A

86. 患者，男性，45岁，骤起寒战、高热40℃、大汗，肝区或右上腹痛并伴有厌食、乏力。查体右季肋区呈饱满状态，右下胸及肝区叩击痛，怀疑“细菌性肝脓肿”，分析细菌侵入的主要途径为

- A. 肝动脉
- B. 门静脉
- C. 肝外伤后肝内血肿感染
- D. 淋巴系统
- E. 胆道系统

答案：E

解析：细菌侵入的主要途径是胆道系统，常因结石或胆道蛔虫造成化脓性胆管炎，脓性胆汁会沿着胆管上行感染最终导致肝脓肿。

87. 新生儿，出生第1天，应接种以下哪种疫苗

- A. 百白破疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 乙脑疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗

答案：B

解析：该新生儿为出生第1天，所以应接种乙肝疫苗。

88. 患者，女，34岁，因腹痛、腹泻，诊断急性肠炎入院。其精神萎靡，T：37.2℃，粪便呈水样。以上资料中属于主观资料的是

- A. 体温37.2℃
- B. 腹痛
- C. 粪便呈水样
- D. 痛苦面容
- E. 精神萎靡

答案：E

解析：“腹痛”这个指标应该是患者的主诉。

89. 患者，女，34岁，因腹痛、腹泻，诊断急性肠炎入院。其精神萎靡，T：37.2℃，粪便呈水样。以上资料中属于主观资料的是

- A. 体温37.2℃
- B. 腹痛
- C. 粪便呈水样
- D. 痛苦面容
- E. 精神萎靡

答案：E

解析：“腹痛”这个指标应该是患者的主诉。

90. 患儿，女，3岁，体温38.3℃，时有呕吐，神情呆滞，X线胸片有结核病灶，诊断结核性脑膜炎，收住入院。结核性脑膜炎患者死亡的重要原因是

- A. 脑疝

- B.肺炎
- C.休克
- D.昏迷
- E.咯血

答案：A

解析：结核性脑膜炎到昏迷期，其症状逐渐加重，最终因颅内压急剧增高导致脑疝死亡。

91.墨菲征阳性见于

- A.急性腹膜炎
- B.急性胃穿孔
- C.急性胆囊炎
- D.急性胰腺炎
- E.肠扭转

答案：C

解析：在右肋缘下触诊时，使患者深吸气，至胆囊被触及时，患者因感腹痛而停止吸气动作，称为墨菲征阳性，见于急性胆囊炎。

92.对有机磷中毒患者采取的急救措施，不包括

- A.早期足量使用阿托品
- B.及时吸氧、吸痰
- C.遵医嘱给予阿托品及胆碱酯酶复能药
- D.对受污染的皮肤和头发用大量的热水擦洗
- E.口服中毒者用清水反复洗胃

答案：D

解析：皮肤黏膜吸收中毒者应立即脱离现场，脱去污染衣服，用肥皂水反复清洗污染皮肤、头发和指甲缝隙部位，禁用热水或酒精擦洗，以防皮肤血管扩张促进毒物吸收。

93.慢性胃炎的典型临床表现是

- A.上腹饥饿痛，餐后缓解
- B.长期上腹痛，餐后缓解
- C.腹部绞痛、腹胀、停止排便排气
- D.腹痛、腹泻、消化不良、黏液便
- E.上腹饱胀不适，餐后加重

答案：E

解析：慢性胃炎病程迁延，多无明显症状。部分患者有消化不良的表现，多数为上腹部隐痛或不适，反酸、上腹部饱胀、嗝气、食欲缺乏、恶心、呕吐等症状，餐后加重。

94.下肢深静脉血栓脱落最容易栓塞的部位是

- A.肾
- B.肺
- C.脑
- D.心
- E.肝



答案：B

解析：下肢深静脉血栓脱落后，由下腔静脉进入右心房，再到右心室。肺循环从右心室泵血，由肺动脉—肺毛细血管静脉组成。血栓最终会栓塞到肺。

95. 有助于肝癌早期诊断的实验室检查是

- A. 癌胚抗原测定
- B. 肝功能检测
- C. 甲胎蛋白测定
- D. 胆红素代谢试验
- E. 血清脂类测定

答案：C

解析：甲胎蛋白（AFP）测定是肝癌早期诊断的重要方法之一，是肝癌的特异性指标，是肝癌的定性检查，有助于诊断早期肝癌，用于普查。

96. 滴虫性阴道炎分泌物的典型表现是

- A. 脓血性
- B. 豆渣样
- C. 稀薄泡沫状
- D. 干酪样
- E. 黄脓性

答案：C

解析：滴虫阴道炎的主要症状为稀薄泡沫状的分泌物增多及外阴瘙痒。

97. 患者，女性，42岁。胃癌。在硬膜外麻醉下行胃大部切除术，手术顺利，术后安返病房。护士应注意观察的并发症是

- A. 胃肠吻合瘘
- B. 输出段梗阻
- C. 吻合口出血
- D. 早期倾倒综合征
- E. 碱性反流性食管炎

答案：C

解析：吻合口出血常发生在胃大部切除术后当日，表现为胃管引流出大量血液，伴失血性休克。

98. 患者，32岁。已婚，有2次流产史。现停经2个月，阴道少许出血伴轻微下腹痛1天。

查体：阴道有少许血性分泌物，宫颈口未开，子宫大如孕2个月。考虑可能为

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 习惯性流产

答案：A

解析：阴道有少许血性分泌物，宫颈口未开，子宫大如孕2个月与停经时间相符，为先兆流产

99. 早产儿，女，剖腹产娩出，出生后全身皮肤青紫，呼吸不规律，心率 88/分，四肢稍屈，喉反射消失。其 Apgar 评分为

- A. 2 分
- B. 3 分
- C. 6 分
- D. 8 分
- E. 10 分

答案：B

解析：全身皮肤青紫计 0 分，心率 < 100 次计 1 分，呼吸不规律计 1 分，四肢稍屈计 1 分，喉反射消失计 0 分，共计 3 分。故此题选择 B。

100. 患者，男性，67 岁，查体：皮肤苍白，颈动脉搏动明显，有水冲脉，毛细血管搏动征阳性，心尖向左下移位，主动脉瓣第二听诊区有舒张期杂音。此患者最可能的情况是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄并关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

答案：C

解析：颈动脉搏动明显，有水冲脉，主动脉瓣第二听诊区有舒张期杂音是主动脉瓣关闭不全的体征。

101. 患者，男，24 岁，急性淋巴细胞白血病，化疗后完全缓解，医嘱给予甲氨蝶呤鞘内注射。患者取上述体位后，应维持多长时间

- A. 30 分钟
- B. 1~2 小时
- C. 4~6 小时
- D. 8~10 小时
- E. 12 小时

答案：C

解析：鞘内注射化疗药物后去枕平卧 4~6 小时。

102. 对确诊肥厚型心肌病最有价值的检查是

- A. 胸部透视
- B. 十二导联心电图
- C. 超声心动图
- D. 心脏彩超
- E. 心电图运动负荷试验

答案：C

解析：肥厚型心肌病是以心肌的非对称性肥厚、室腔变小为特征，通过超声心动图可准确地显示出来，因此对肥厚型心肌病最有诊断价值的辅助检查是超声心动图。

103. 患者，男性，55 岁，经尿道前列腺电切术术后，护士的健康教育措施中，不正确的是

- A. 预防便秘，给予易消化，高纤维食物

- B.多饮水，预防尿路感染
- C.尽早锻炼如跑步等
- D.锻炼肛提肌，以预防和治疗尿失禁
- E.2个月禁止性生活

答案：C

解析：术后患者给予易消化、高纤维素食物，预防便秘，必要时可服缓泻药；1~2个月内避免剧烈活动，如提举重物、骑自行车、跑步等，防止继发出血；2个月禁止性生活；术后可能仍会有排尿异常现象，应多饮水，预防泌尿系感染。指导患者有意识地收缩肛门，锻炼肛提肌，以预防和治疗尿失禁。

104.急性一氧化碳中毒的发病机制是

- A.脑细胞中毒
- B.呼吸中枢受抑制
- C.血红蛋白不能携氧
- D.血氧含量下降
- E.大脑受抑制

答案：C

解析：一氧化碳(CO)经呼吸道进入血液，与红细胞内的血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白(CO<sub>2</sub>Hb)，失去携氧能力。

105.患者，女性，75岁，有慢性阻塞性肺疾病30余年，近日因呼吸道感染入院。以下症状提示为肺性脑病的是

- A.咳大量脓痰
- B.收缩压升高
- C.呼吸加快
- D.烦躁、嗜睡
- E.尿量减少

答案：D

解析：肺性脑病的先兆表现：呼吸困难加重，夜间尤甚。常有头痛、白天嗜睡、夜间兴奋；加重时出现神志恍惚、谵妄、躁动、抽搐、生理反射迟钝等。

106.患者男，58岁。外伤致股骨干粉碎性骨折，入院后4小时患者出现咳嗽，呼吸困难，并进行性加重，动脉血氧饱和度87%，护士为该患者评估病情，该患者可能是发生了下列哪一并发症

- A.血管损伤
- B.感染
- C.骨筋膜室综合征
- D.休克
- E.脂肪栓塞综合征

答案：E

解析：骨折处髓腔内血肿张力过大，骨髓被破坏，脂肪微粒进入破裂的静脉内，可导致肺、脑脂肪栓塞，病情危急，患者可突然死亡。此患者出现了肺栓塞的症状。

107.甲状腺手术一侧喉返神经损伤时，术后会发生

- A.失声

- B. 吞咽困难
- C. 窒息
- D. 声音嘶哑
- E. 饮水呛咳

答案：D

解析：甲状腺大部分切除术后喉返神经损伤会引起声音嘶哑，喉上神经损伤会引起饮水呛咳和声调改变。

108. 女性，8岁，阵发性剑突下钻顶样痛半天，伴恶心呕吐，既往有类似发作史。查体 T37.5℃，剑突下深压痛，无腹肌紧张，拟诊为

- A. 肝内胆管结石
- B. 胆道蛔虫病
- C. 胆总管结石
- D. 急性胆管炎
- E. 胆囊结石

答案：B

解析：胆道蛔虫病的临床表现：（1）症状：剑突下方阵发性“钻顶样”绞痛，发作时十分剧烈，但间歇期可平息如常。其特点为剧烈腹部绞痛与轻微腹部体征不相称。（2）体征：剑突下或偏右有轻度深压痛。

109. 孕妇由于妊娠期高血压疾病应用硫酸镁治疗，在治疗过程中出现膝反射消失，呼吸浅而慢，每分钟10次，此患者除立即停药外应给下述哪种药

- A. 5%葡萄糖静脉滴注
- B. 肌注山莨菪碱
- C. 静注50%葡萄糖
- D. 静注10%葡萄糖酸钙
- E. 静注低分子右旋糖酐

答案：D

解析：由于钙离子能与镁离子争夺神经细胞上的同一受体，可阻止镁离子的继续结合，所以在应用硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病过量的时候，可应用10%葡萄糖酸钙来拮抗。

110. 患者男，67岁。剧烈压榨样胸痛、呕吐伴窒息感3小时入院。心率110次/分，血压85/60mmHg，心电图示V1~V4导联ST段呈弓背向上抬高，律不齐。若该患者发生了室颤，护士采取的处理措施是

- A. 同步直流电除颤
- B. 非同步直流电除颤
- C. 心内注射利多卡因
- D. 立即肌注阿托品
- E. 立即给予患者心脏按压

答案：B

解析：心室颤动应非同步直流电除颤。

111. 患者男，67岁。剧烈压榨样胸痛、呕吐伴窒息感3小时入院。心率110次/分，血压85/60mmHg，心电图示V1~V4导联ST段呈弓背向上抬高，律不齐。若该患者发生了室颤，护士采取的处理措施是

- A.同步直流电除颤
- B.非同步直流电除颤
- C.心内注射利多卡因
- D.立即肌注阿托品
- E.立即给予患者心脏按压

答案：B

解析：心室颤动应非同步直流电除颤。

112.在消化性溃疡的治疗中，抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A.铝碳酸镁
- B.西咪替丁
- C.碳酸氢钠
- D.枸橼酸铋钾
- E.奥美拉唑

答案：E

解析：质子泵抑制剂是抑酸最强止痛最好的药物（首选奥美拉唑）。

113.患者，5岁，诊断为营养不良，该患儿皮下脂肪最先减少的部位是

- A.腹部
- B.面部
- C.躯干
- D.大腿
- E.臀部

答案：A

解析：营养不良的早期表现为体重不增，以后皮下脂肪逐渐消失，体重减轻，久之出现身材矮小。患儿皮下脂肪消失的顺序：腹部—躯干—臀部—四肢—面部。

114.属于护士的权利是

- A.遵守法律、法规和操作条例
- B.保护患者隐私
- C.患者病情转危，立即报告医生
- D.发现医嘱有错误，应当及时向开具医嘱的医师提出
- E.参加专业培训、从事学术研究和交流

答案：E

解析：ABCD四项属于护士的义务，E项属于护士的权利。

115.患者，男性，16岁。肺炎球菌性肺炎。医嘱青霉素80万U，im，Bid。护士执行医嘱的正确时间为

- A.每8am，1次
- B.每8am，4pm各1次
- C.每8am，12n，4pm，8pm各1次
- D.每8am，12n，4pm，睡前各1次
- E.每8am，8pm各1次

答案：B

解析：Bid 为每日 2 次。肌肉注射的时间安排是上午 8 时和下午 4 时。

116. 经产妇，30 岁，胎儿阴道娩出，剪断脐带时，护士给护生讲解正常的脐带结构是

- A. 一条动脉，一条静脉
- B. 两条动脉，两条静脉
- C. 两条动脉，一条静脉
- D. 静脉较粗但壁厚
- E. 动脉较细但壁厚

答案：C

解析：脐带是连接胎儿与胎盘的带状器官，内有一条脐静脉和两条脐动脉。

117. 下列疾病中，以假小叶形成为主要病理改变的是

- A. 慢性肝淤血
- B. 弥漫型肝癌
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

答案：D

解析：

118. 患者，男性，61 岁。急性肾衰竭少尿期。患者呼吸困难、头痛、软瘫、腹胀，心电图示：T 波高尖、QRS 间期延长。考虑可能的情况是

- A. 低蛋白血症
- B. 高钾血症
- C. 低钙血症
- D. 代谢性碱中毒
- E. 代谢性酸中毒

答案：B

解析：少尿时，K<sup>+</sup> 不能及时排除故而蓄积体内出现高钾血症。同时，T 波高尖也是高钾的典型表现。

119. 患者，女性，18 岁。因双侧甲状腺肿大住院。甲状腺扫描可见弥漫性甲状腺肿，均匀分布。医生诊断为单纯性甲状腺肿，支持诊断的实验室检查结果是

- A. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 升高，TSH 降低
- B. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 降低，TSH 升高
- C. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 升高，TSH 正常
- D. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 降低，TSH 正常
- E. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 正常，TSH 正常

答案：E

解析：单纯性甲状腺肿是机体缺碘、存在致甲状腺肿物质，以及甲状腺激素合成酶缺陷而引起代偿性甲状腺增生肿大，一般无甲状腺功能异常，所以本题 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 和 TSH 都是正常的。

120. 患者，女，50 岁。既往糖尿病病史 10 年，近 3 个月来出现午后低热、颧部潮红、乏力、盗汗、易烦躁、食欲减退、消瘦，近日咯血后高热不退。提示

- A. 组织破坏广泛

- B.结核病灶播散
- C.病灶继续出血
- D.出现继发感染
- E.并发结核性胸膜炎

答案：B

解析：糖尿病患者机体抵抗力下降，容易感染肺结核等疾病，该患者出现了午后低热、颧部潮红、乏力、盗汗、易烦躁、食欲减退、消瘦、咯血等表现，符合肺结核的临床表现。

121.患者，女，65岁。患肝硬化5年。1天前剧烈咳嗽后呕吐鲜红色液体3次，量约800mL，排黑便2次，量约500g，急诊入院。查体：T 37.5℃，P 120次/分，R 22次/分，BP 85/60mmHg。精神萎靡，面色苍白，四肢厥冷，医嘱予以输血800mL。治疗过程中，护士发现该患者淡漠少言，但回答问题尚准确，可引起扑翼样震颤。该患者可能出现了

- A.肝肾综合征
- B.肝肺综合征
- C.肝性脑病
- D.原发性肝癌
- E.低钠血症

答案：C

解析：患者淡漠少言，但回答问题尚准确，可引出扑翼样震颤，患者出现轻度的精神异常，且扑翼样震颤为肝性脑病的特征性体征。

122.患者，女，30岁。足底刺伤后发生破伤风，频繁抽搐。最重要的治疗环节是

- A.补充水分及电解质
- B.镇静，解痉
- C.中和游离毒素
- D.气管切开
- E.病室安静，减少刺激

答案：B

解析：频繁抽搐、肌肉痉挛，可导致患者窒息、受伤等，严重时会导致死亡，故镇静、解痉是治疗的最重要环节。

123.当小儿血清总钙低于一定数值时可出现手足搐搦，该数值是

- A. 2.2~2.7mmol/L
- B. 1.0mmol/L
- C. 2.7mmol/L
- D. 2.2mmol/L
- E. 1.75~1.88mmol/L

答案：E

解析：当血钙下降而甲状旁腺不能代偿性分泌增加，血钙继续降低，当血清总钙<1.75~1.88mmol/L(正常血清总钙浓度为2.2~2.7mmol/L)或血清钙离子<1.0mmol/L时，神经肌肉的兴奋性增高。

124.幼儿期是指

- A.出生~1岁

- B.出生~2岁
- C.1岁~3岁
- D.3岁~5岁
- E.4岁~6岁

答案：C

125.患者，男，58岁，患有肥厚型心肌病5年。近1个月来常有心绞痛发作及一过性昏厥，患者因此非常紧张，整日卧床、不敢活动。该患者出现的角色

- A.角色行为强化
- B.角色行为缺如
- C.角色行为冲突
- D.角色行为差异
- E.角色行为消退

答案：A

126.在使用胰岛素的过程中，中老年糖尿病患者更易发生低血糖的主要原因是

- A.对胰岛素敏感导致血糖降低
- B.肾糖阈降低导致糖排出过多
- C.胃肠功能差导致碳水化合物摄入减少
- D.进食不规律导致碳水化合物摄入减少
- E.肝功能减退导致对胰岛素灭活能力降低

答案：E

127.地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是修

- A.扩张冠状动脉
- B.增强心肌收缩力
- C.减轻心脏前负荷
- D.减少心律失常发生
- E.降低心脏的传导性

答案：B

128.患者，男，60岁，肝硬化10年。近2日嗜睡，今晨测体温时呼之不应，但压迫其眶上神经有痛苦表情。该患者的意识状态是

- A.深昏迷
- B.昏睡
- C.嗜睡
- D.浅昏迷
- E.意识模糊



答案：D

129.急性有机磷农药中毒患者使用胆碱酯酶复能剂的原则，正确的是

- A.应该尽量地少用
- B.应该尽早地使用
- C.不与阿托品合用
- D.只用于轻度中毒
- E.只用于重度中毒

答案：B

130.患儿7个月，腹泻、排黄绿色稀薄样便2天，每日4~5次，精神状态好，为预防脱水给口服补盐液(ORS)，其张力是

- A.1/5张
- B.1/4张
- C.1/3张
- D.1/2张
- E.2/3张

答案：E

