

## 月度考试

- 1、（A3/A4 型题）患者，女，26 岁。因为左下颌角区渐进性膨隆 5 个月余就诊。专科检查面部不对称，触诊有乒乓球样感觉。临床初步诊断为左下颌骨牙源性角化囊性瘤。不出现的临床症状是
- 舌侧膨隆明显
  - 囊肿内牙松动、移位
  - 穿刺检查为黄白色油脂样物
  - 左下颌第一磨牙缺失
  - 同侧下唇麻木
- 2、（A3/A4 型题）患者，女，26 岁。因为左下颌角区渐进性膨隆 5 个月余就诊。专科检查面部不对称，触诊有乒乓球样感觉。临床初步诊断为左下颌骨牙源性角化囊性瘤。X 线片特征为
- 边缘整齐的透光影像
  - 含牙的透光影像
  - 不含牙的透光影像
  - 沿下颌骨长轴发展的透光影像
  - 囊肿边缘呈分叶状或切迹状
- 3、（A3/A4 型题）患者，女，26 岁。因为左下颌角区渐进性膨隆 5 个月余就诊。专科检查面部不对称，触诊有乒乓球样感觉。临床初步诊断为左下颌骨牙源性角化囊性瘤。其治疗方案一般是
- 行下颌骨部分切除，钛板修复
  - 行下颌骨部分切除，髂骨修复
  - 行下颌骨部分切除，腓骨修复
  - 仅行下颌骨部分切除
  - 手术刮除，骨创烧灼或冷冻处理
- 4、（A3/A4 型题）男，63 岁。右舌缘疼痛不适 3 个月。体检见右舌缘中部有一溃疡，3cm×3cm 大小，质地偏硬，深部有一浸润块，伸舌时偏向同侧。右颈上部触及 1cm×1cm 大小淋巴结，质中偏硬、活动、无压痛，边界清。临床考虑为鳞状细胞癌。最适宜的活检方法是
- 切取活检
  - 切除活检
  - 吸取活检
  - 冰冻活检
  - 细针穿刺细胞学活检
- 5、（A3/A4 型题）男，63 岁。右舌缘疼痛不适 3 个月。体检见右舌缘中部有一溃疡，3cm×3cm 大小，质地偏硬，深部有一浸润块，伸舌时偏向同侧。右颈上部触及 1cm×1cm 大小淋巴结，质中偏硬、活动、无压痛，边界清。临床考虑为鳞状细胞癌。对鳞状细胞癌首选的化疗药物是
- 长春新碱
  - 氮芥
  - 平阳霉素
  - 环磷酰胺
  - 氟尿嘧啶
- 6、（A3/A4 型题）男，63 岁。右舌缘疼痛不适 3 个月。体检见右舌缘中部有一溃疡，3cm×3cm 大小，质地偏硬，深部有一浸润块，伸舌时偏向同侧。右颈上部触及 1cm×1cm 大小淋巴结，质中偏硬、活动、无压痛，边界清。临床考虑为鳞状细胞癌。若发生远处转移。最常见的转移部位为
- 脑
  - 骨
  - 肝
  - 肾
  - 肺

- 7、(B1型题)用于消毒头皮部的碘酊浓度为
- A.0.1%
  - B.0.5%
  - C.1%
  - D.2%
  - E.3%
- 8、(B1型题)用于消毒颌面、颈部的碘酊浓度为
- A.0.1%
  - B.0.5%
  - C.1%
  - D.2%
  - E.3%
- 9、(B1型题)用于消毒口腔黏膜的碘酊浓度为
- A.0.1%
  - B.0.5%
  - C.1%
  - D.2%
  - E.3%
- 10、(B1型题)用于消毒皮肤的氯己定浓度为
- A.0.1%
  - B.0.5%
  - C.1%
  - D.2%
  - E.3%
- 11、(B1型题)用于消毒口腔及创口的氯己定浓度为
- A.0.1%
  - B.0.5%
  - C.1%
  - D.2%
  - E.3%
- 12、(B1型题)阻断止血法
- A.大块肌束采用的止血缝扎法是
  - B.临床上止血效果最明显、最可靠的方法是
  - C.有心血管疾病的病人禁用的止血方法
  - D.口腔腔窦内出血及颈静脉破裂出血不能缝合结扎时可用
  - E.全身给予止血敏属于
- 13、(B1型题)贯穿缝合法
- A.大块肌束采用的止血缝扎法是
  - B.临床上止血效果最明显、最可靠的方法是
  - C.有心血管疾病的病人禁用的止血方法
  - D.口腔腔窦内出血及颈静脉破裂出血不能缝合结扎时可用
  - E.全身给予止血敏属于
- 14、(B1型题)碘仿纱条填塞压迫止血
- A.大块肌束采用的止血缝扎法是
  - B.临床上止血效果最明显、最可靠的方法是
  - C.有心血管疾病的病人禁用的止血方法
  - D.口腔腔窦内出血及颈静脉破裂出血不能缝合结扎时可用
  - E.全身给予止血敏属于

- 15、（B1 型题）降压止血
- A.大块肌束采用的止血缝扎法是
  - B.临床上止血效果最明显、最可靠的方法是
  - C.有心血管疾病的病人禁用的止血方法
  - D.口腔腔窦内出血及颈静脉破裂出血不能缝合结扎时可用
  - E.全身给予止血敏属于
- 16、（B1 型题）上颌窦提升术后二期种植手术间隔时间为
- A.3 个月
  - B.4 个月
  - C.6 个月
  - D.7 个月
  - E.6 至 9 个月
- 17、（B1 型题）上颌前牙区种植骨结合时间通常至少为
- A.3 个月
  - B.4 个月
  - C.6 个月
  - D.7 个月
  - E.6 至 9 个月
- 18、（B1 型题）下颌前牙区种植骨结合时间通常至少为
- A.3 个月
  - B.4 个月
  - C.6 个月
  - D.7 个月
  - E.6 至 9 个月
- 19、（B1 型题）缺牙区植骨后种植骨结合时间至少为
- A.3 个月
  - B.4 个月
  - C.6 个月
  - D.7 个月
  - E.6 至 9 个月
- 20、（B1 型题）未经细菌侵入的创口
- A.无菌创口
  - B.延期愈合创口
  - C.感染创口
  - D. I 期愈合创口
  - E.污染创口
- 21、（B1 型题）早期灼伤和某些化学性损伤已及时处理者
- A.无菌创口
  - B.延期愈合创口
  - C.感染创口
  - D. I 期愈合创口
  - E.污染创口
- 22、（B1 型题）眶下间隙感染主要表现为
- A.张口受限
  - B.眶下区弥漫性水肿
  - C.颌下三角区的红肿
  - D.颌下、口底广泛水肿

E.以下颌角为中心的红肿

23、(B1型题)口底蜂窝织炎主要表现为

- A.张口受限
- B.眶下区弥漫性水肿
- C.颌下三角区的红肿
- D.颌下、口底广泛水肿
- E.以下颌角为中心的红肿

24、(B1型题)颌下间隙感染主要表现为

- A.张口受限
- B.眶下区弥漫性水肿
- C.颌下三角区的红肿
- D.颌下、口底广泛水肿
- E.以下颌角为中心的红肿

25、(B1型题)翼下颌间隙感染主要表现为

- A.张口受限
- B.眶下区弥漫性水肿
- C.颌下三角区的红肿
- D.颌下、口底广泛水肿
- E.以下颌角为中心的红肿

26、(B1型题)咬肌间隙感染肿胀区域主要为本单元试卷到此结束参考答案

- A.张口受限
- B.眶下区弥漫性水肿
- C.颌下三角区的红肿
- D.颌下、口底广泛水肿
- E.以下颌角为中心的红肿

27、(A1型题)普鲁卡因不适合

- A.表面麻醉
- B.阻滞麻醉
- C.局部麻醉
- D.静脉麻醉
- E.椎管麻醉

28、(A1型题)哪个乳牙过早缺失影响最大

- A.第二乳磨牙
- B.乳尖牙
- C.第一乳磨牙
- D.第三乳磨牙
- E.乳切牙

29、(A1型题)不能使用旋转力拔除的牙是

- A.下切牙
- B.上中切牙
- C.下前磨牙
- D.下尖牙
- E.上尖牙

30、(A1型题)治疗三叉神经痛首选

- A.卡马西平
- B.苯妥英钠
- C.布洛芬

- D.氯丙嗪
- E.阿托品

- 31、（A1型题）口腔颌面部大手术后引流常用
- A.片状引流
  - B.纱条引流
  - C.管状引流
  - D.正压引流
  - E.负压引流
- 32、（A1型题）皮样囊肿好发于
- A.眼睑
  - B.额
  - C.鼻
  - D.耳下
  - E.口底颊部
- 33、（A1型题）中央有一小黑色素点是
- A.腺样囊肿
  - B.黑痣
  - C.表皮样囊肿
  - D.皮样囊肿
  - E.皮脂腺囊肿
- 34、（A1型题）开口末的弹响是
- A.翼内肌减弱
  - B.翼外肌痉挛
  - C.下颌关节亢进
  - D.翼外肌亢进
  - E.翼内肌亢进
- 35、（A1型题）属于癌前病变的是
- A.苔藓
  - B.糜烂
  - C.出血
  - D.溃疡
  - E.白斑
- 36、（A1型题）双侧唇裂修复的时间为
- A.1~3月
  - B.3~6月
  - C.6~12月
  - D.1~2岁
  - E.2~3岁
- 37、（A1型题）颞下颌关节结构紊乱的常见X线表现是
- A.关节上间隙增宽
  - B.关节后间隙变窄
  - C.髁突有磨损破坏
  - D.关节窝形态异常
  - E.关节上腔造影可见造影剂进入关节下腔
- 38、（A1型题）口腔颌面部创伤引起的阻塞性窒息原因中不包括
- A.咽喉部血凝块
  - B.吸入血液或呕吐物

- C. 颞部粉碎性骨折致舌后坠
- D. 组织水肿压迫呼吸道
- E. 上颌骨横断骨折致组织移位

- 39、（A1 型题）最易发生牙槽突骨折的部位是
- A. 上颌前牙区
  - B. 下颌前牙区
  - C. 上颌后牙区
  - D. 下颌后牙区
  - E. 上颌结节区
- 40、（A1 型题）单侧唇裂整复手术最合适的年龄为
- A. 出生后即可
  - B. 1~2 个月
  - C. 3~6 个月
  - D. 7~10 个月
  - E. 11~12 个月
- 41、（A1 型题）颌面部绷带最常使用的是
- A. 石膏绷带
  - B. 卷带
  - C. 弹力绷带
  - D. 四头带
  - E. 三角巾
- 42、（A1 型题）缝合面颈部皮肤，进针时针尖与皮肤的关系
- A. 针尖与皮肤呈  $15^{\circ}$  角
  - B. 针尖与皮肤呈  $30^{\circ}$  角
  - C. 切口两侧进针间距大于皮下间距
  - D. 切口两侧进针间距小于皮下间距
  - E. 以上都不是
- 43、（A1 型题）皮肤创口缝合后过度外翻是因为
- A. 进针点距创缘过远
  - B. 两侧进针深度不一致
  - C. 皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距
  - D. 皮肤切口两侧进针间距小于皮下间距
  - E. 打结过紧
- 44、（A1 型题）关于颈部淋巴结检查，哪一项是错误的
- A. 患者应取坐位
  - B. 检查者应站在其右侧
  - C. 患者头稍低，略偏向被检查侧
  - D. 淋巴结触诊仅对浅表淋巴结有意义
  - E. 检查者按一定顺序，由浅入深，滑动触诊
- 45、（A1 型题）上颌骨高位骨折出现脑脊液耳漏时，应考虑颅脑损伤是
- A. 脑挫裂伤
  - B. 脑震荡
  - C. 硬膜外血肿
  - D. 颅前窝骨折
  - E. 颅中窝骨折
- 46、（A1 型题）颌骨骨折的治愈标准是
- A. 骨性愈合

- B.纤维性愈合
  - C.骨折线上的牙齿不松动
  - D.恢复原有咬合关系
  - E.无感染发生
- 47、（A1 型题）牙拔除后至少多长时间，拔牙创内形成凝血块而将创口封闭
- A.5 分钟
  - B.10 分钟
  - C.15 分钟
  - D.30 分钟
  - E.45 分钟
- 48、（A1 型题）行气管切开时，切口不宜低于第 5 气管软骨环，否则易
- A.伤及气管后壁
  - B.引起喉狭窄
  - C.损伤食管
  - D.损伤无名动脉
  - E.损伤呼吸道通畅
- 49、（A1 型题）通常不会发生恶变的是
- A.囊性水瘤
  - B.鳃裂囊肿
  - C.角化囊肿
  - D.皮脂腺囊肿
  - E.甲状舌管瘻
- 50、（A1 型题）可用于血管瘤硬化治疗的是
- A.环磷酰胺
  - B.甲氨蝶呤
  - C.平阳霉素
  - D.长春新碱
  - E.紫杉醇
- 51、（A1 型题）痣样基底细胞癌综合征的临床表现不包括
- A.多发性角化囊肿
  - B.皮肤基底细胞痣（癌）
  - C.分叉肋，颅骨异常
  - D.小脑镰钙化
  - E.眶距缩窄
- 52、（A1 型题）与混合瘤的临床表现不符合的是
- A.可发生于任何年龄，以 30~50 岁多见
  - B.一般呈圆形或椭圆形肿块
  - C.肿瘤质地硬，呈结节状
  - D.肿瘤生长缓慢，可伴有明显疼痛
  - E.混合瘤常发生于腮腺
- 53、（A1 型题）对 99m 锝核素扫描有特殊诊断意义的肿瘤是
- A.多形性腺瘤
  - B.黏液表皮样癌
  - C.腺样囊性癌
  - D.腺泡细胞癌
  - E.沃辛瘤
- 54、（A1 型题）患者仅出现面瘫+味觉丧失+涎腺分泌障碍，面神经的损害可能位于

- A.茎乳孔以外
  - B.鼓索与镫骨肌神经节之间
  - C.镫骨肌与膝状神经节之间
  - D.膝状神经节
  - E.脑桥与膝状神经节之间
- 55、（A1 型题）三叉神经功能检查项目中不包括
- A.三叉神经分布区皮肤与黏膜的触、温、痛觉
  - B.角膜反射
  - C.腭反射
  - D.施墨试验
  - E.咀嚼肌运动功能检查
- 56、（A1 型题）治疗颞下颌关节强直引起的开口困难可选用
- A.局部封闭
  - B.开口练习
  - C.理疗
  - D.关节镜手术
  - E.开放手术
- 57、（A1 型题）上颌骨骨折后，骨折片移位，主要取决于
- A.骨折的类型和损伤力量的大小
  - B.咀嚼肌肉的牵引作用
  - C.骨折片上的牙是否存在
  - D.骨折的部位
  - E.患者的年龄和性别
- 58、（A1 型题）易发生骨折的面骨为
- A.颧骨
  - B.颧弓
  - C.上颌骨
  - D.下颌骨
  - E.腭骨
- 59、（A1 型题）颈部双发骨折时，下列何种描述是错误的
- A.正中骨折端多因降颌肌群的作用而向下后方移位
  - B.双侧骨折段多向中线移位
  - C.常发生下颌牙弓缩窄
  - D.常发生呼吸困难和窒息，其主要原因是伴发的牙龈和口底软组织创伤引起口底血肿，进而导致舌后坠
  - E.常引起咬合关系紊乱
- 60、（A1 型题）髁状突颈部骨折后髁状突常被拉向前内方是由于患侧
- A.颞肌的作用
  - B.咬肌的作用
  - C.翼内肌的作用
  - D.翼外肌的作用
  - E.关节韧带的作用
- 61、（A1 型题）下颌骨体部骨折固定的时间应为
- A.3 周
  - B.4 周
  - C.2 个月
  - D.3 个月
  - E.半年



- 62、（A1 型题）描述上颌骨血供特点及临床意义哪项是错误的
- A.血运较下颌骨丰富
  - B.抗感染能力强
  - C.骨折愈合较下颌骨迅速
  - D.具有单源性血供特点
  - E.外伤后出血较多
- 63、（A1 型题）最易并发颅脑损伤的颌骨骨折是
- A.LeFort I 型骨折
  - B.LeFort II 型骨折
  - C.LeFort III 型骨折
  - D.髁状突骨折
  - E.下颌骨正中骨折
- 64、（A1 型题）颌骨骨折伴发脑脊液鼻漏时不应
- A.应用抗生素
  - B.局部保持清洁
  - C.进行鼻腔冲洗，协助引流
  - D.观察脑脊液量及色泽
  - E.脑脊液停止一定时间后处理颅骨骨折
- 65、（A1 型题）唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤，离体组织尚完好，应尽量将离体组织缝回原处，但一般不宜超过
- A.1h
  - B.2h
  - C.4h
  - D.6h
  - E.8h
- 66、（A1 型题）在我国最好发的口腔颌面部恶性肿瘤是
- A.上颌窦癌
  - B.腭癌
  - C.舌癌
  - D.牙龈癌
  - E.颊癌
- 67、（A1 型题）以下哪项不是恶性肿瘤的特征
- A.多呈浸润性生长
  - B.常发生转移
  - C.对机体影响大，常并发恶病质而死亡
  - D.多对周围组织产生破坏，界限不清
  - E.细胞多分化良好
- 68、（A1 型题）以下癌前病变，癌变几率最大的是
- A.疣
  - B.慢性溃疡
  - C.白斑
  - D.红斑
  - E.扁平苔藓
- 69、（A1 型题）以下肿瘤具有恶性倾向的是
- A.乳头状瘤
  - B.血管瘤
  - C.纤维瘤
  - D.牙龈瘤

E.淋巴管瘤

70、(A1型题)下列药物属于细胞毒素类抗癌药的是

- A.平阳霉素
- B.环磷酰胺
- C.5-氟尿嘧啶
- D.长春新碱
- E.肾上腺皮质激素

71、(A1型题)唇舌病变使用双合诊检查时,应该

- A.双手置于病变上下或两侧
- B.双手食指置于病变上下或两侧
- C.一手的食指和拇指置于病变上下或两侧
- D.一手的食指和中指置于病变上下或两侧
- E.一手的食指和另一手拇指置于病变上下或两侧

72、(A1型题)成釉细胞瘤含有

- A.透明、淡黄色水样液体
- B.血性液体
- C.黄褐色液体
- D.草黄色液体
- E.黄白色蛋白样液体

73、(A1型题)用2%碱性戊二醛杀灭手术器械上的乙型肝炎病毒,则至少应浸泡

- A.20分钟以上
- B.15分钟
- C.10分钟
- D.2分钟
- E.1分钟

74、(A1型题)以下哪种囊肿不属于发育性囊肿

- A.鳃裂囊肿
- B.鼻腭囊肿
- C.血外渗性囊肿
- D.球上颌囊肿
- E.甲状舌管囊肿

75、(A1型题)口腔颌面部因炎症而引起的囊肿主要是

- A.根尖囊肿
- B.黏液囊肿
- C.舌下囊肿
- D.始基囊肿
- E.牙龈囊肿

76、(A1型题)关于面部“危险三角区”的说法错误的是

- A.该区域包括鼻根至两侧口角区域
- B.此区域的静脉缺少静脉瓣
- C.该区域内发生的感染容易向颅内扩散
- D.一旦发生感染应该早期切开引流
- E.此区域内的感染应避免挤压

77、(A1型题)眶下间隙脓肿首选的治疗方法是

- A.从口外切开引流
- B.拔除病源牙
- C.从口内切开引流

- D.病源牙行根管开放引流
- E.局部理疗

78、（A1 型题）以下关于海绵状血管瘤的叙述哪项是错误的

- A.表浅肿瘤呈现蓝色或紫色
- B.扪之柔软，可被压缩
- C.有时可扪到静脉石
- D.扪诊有震颤感，听诊有吹风样杂音
- E.体位移动试验阳性

79、（A1 型题）最容易发生恶变的色素痣是

- A.雀斑样色素痣
- B.复合痣
- C.交界痣
- D.皮内痣
- E.毛痣

80、（A1 型题）慢性阻塞性腮腺炎挤压腮腺时导管口分泌情况是

- A.胶冻样分泌物
- B.为黄稠脓性分泌物
- C.分泌物清亮
- D.为雪花样或黏稠的蛋清样唾液
- E.脓血性分泌物

81、（A1 型题）慢性阻塞性腮腺炎腮腺造影的 X 线表现特点是

- A.腮腺腺体有破坏而出现碘油池
- B.导管系统无明显变化
- C.分支导管呈抱球状表现
- D.主导管扩张不整呈腊肠样变
- E.末梢导管呈点状、球状扩张

82、（A1 型题）脓肿或死腔的引流物的去除应根据

- A.放置 24~48 小时后
- B.引流物放置的深浅
- C.24 小时内引流量未超过 20~30mL
- D.脓液及渗出液完全消除
- E.引流物为异物，应尽早拔除

83、（A1 型题）下列关于绷带功效的说法中，哪一项是错误的

- A.保护术区和创部，防止继发感染
- B.止血或减轻水肿
- C.防止或减轻骨折错位
- D.遮挡创口，减少对病员的不良刺激
- E.保温、止痛、固定敷料

84、（A1 型题）关于绷带包扎的注意事项，哪一项是不正确的

- A.包扎颌下区及颈部时，应注意保持呼吸道畅通
- B.腮腺区包扎不应有压力，以免发生面神经损伤
- C.所施压力适度，防止组织受压发生坏死
- D.脓肿切开引流后，首先应加压包扎
- E.骨折复位后，包扎时应注意防止错位

85、（A1 型题）氯己定液皮肤消毒浓度为

- A.0.1%
- B.0.2%

- C.0.3%
- D.0.5%
- E.1%

- 86、(A1 型题) 口腔内缝线打结应打
- A.单重结
  - B.二重结
  - C.三重结
  - D.四重结
  - E.五重结
- 87、(A1 型题) 对放射线不敏感的肿瘤是
- A.未分化癌
  - B.恶性淋巴瘤
  - C.鳞状细胞癌
  - D.恶性淋巴上皮癌
  - E.骨肉瘤
- 88、(A1 型题) 用下列哪种消毒剂浸泡的器械使用前需用灭菌蒸馏水冲洗
- A.乙醇
  - B.戊二醛
  - C.碘伏
  - D.福尔马林
  - E.含氯消毒剂
- 89、(A1 型题) 囊肿属于
- A.肿瘤
  - B.非真性肿瘤
  - C.肿瘤液化
  - D.含液体的肿瘤
  - E.体液在体内的异常存积
- 90、(A1 型题) 正常张口度的简易测量
- A.检查者食、中、无名指三指末节的宽度
  - B.检查者食、中、无名指三指中节的宽度
  - C.被检查者食、中、无名指三指末节的宽度
  - D.被检查者食、中、无名指三指中节的宽度
  - E.被检查者除拇指外的任意三指宽度
- 91、(A1 型题) 张口度是指
- A.上、下唇之间的距离
  - B.上、下前牙的切缘之间的距离
  - C.上、下中切牙的切缘之间的距离
  - D.上、下切牙之间的距离
  - E.上、下颌骨之间的距离
- 92、(A1 型题) 骨纤维异常增殖症常见的典型 X 线表现是
- A.呈日光放射状排列的骨刺
  - B.大小不等的圆形齿状阴影
  - C.不规则骨质破坏
  - D.单囊状阴影
  - E.毛玻璃样阴影
- 93、(A1 型题) 不符合面部疖特点的是
- A.相邻多个毛囊的急性化脓性炎症

- B.好发于上唇
  - C.常伴有剧烈疼痛
  - D.一旦出现头痛、恶心、呕吐等症状，或病情危重
  - E.女性多于男性
- 94、（A1 型题）游离皮片移植皮片越厚，则
- A.越容易成活
  - B.越能耐受摩擦
  - C.色泽变化越大
  - D.收缩越大
  - E.质地越脆
- 95、（A1 型题）属于子宫内膜分泌期中期的是
- A.腺上皮细胞呈立方或低柱状
  - B.腺上皮细胞核下开始出现含糖原小泡
  - C.内膜腺体开口面向宫腔，有糖原等分泌物溢出
  - D.见到顶浆分泌
  - E.在月经周期第 15~19 日
- 96、（A1 型题）关于女性性激素的合成与分泌正确的是
- A.孕烯醇酮激素是雌激素和雄激素的前体物质
  - B.雌酮是雌二醇的前身
  - C.雄激素主要来源于卵巢间质
  - D.排卵后黄体只分泌孕激素
  - E.排卵前卵泡内膜细胞分泌雌激素和少量孕激素
- 97、（A1 型题）宫颈癌的 FIGO 临床分期正确的是
- A.IB 期靠肉眼判断极难诊断
  - B.癌侵及主韧带一部分时属于 II A 期
  - C.癌扩展至盆壁时属于 IIIB 期
  - D.癌使肾功能丧失时属于 IV 期
  - E.膀胱黏膜有癌浸润属于 IVB 期
- 98、（A1 型题）在我国，1 岁内小儿需完成的基础计划免疫中，不包括下列中哪项
- A.卡介苗
  - B.脊髓灰质炎疫苗
  - C.麻疹疫苗
  - D.百日咳-白喉-破伤风混合疫苗
  - E.乙型脑炎疫苗
- 99、（A1 型题）关于预防接种的初种时间，哪项是正确的
- A.2 个月时开始接种脊髓灰质炎疫苗
  - B.2 个月后接种卡介苗
  - C.4~5 个月时接种麻疹疫苗
  - D.6~8 个月时接种乙型脑炎疫苗
  - E.1 岁后开始接种百白破混合疫苗
- 100、（A1 型题）对 1~2 个月婴儿以下哪项不宜作为辅食
- A.鲜果汁
  - B.青菜汁
  - C.米汤
  - D.代乳粉
  - E.蛋黄
- 101、（A1 型题）患维生素 D 缺乏性佝偻病的 9~10 个月婴儿多见的骨骼改变是

- A. 颅骨软化
- B. 肋骨串珠
- C. 方颅
- D. 鸡胸
- E. 肋隔沟

102、（A1 型题）皮肤结节性红斑，疱疹性结膜炎，多发性一过性关节炎，颈淋巴结肿大，常见于

- A. 风湿热
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 类风湿关节炎
- D. 原发性肺结核
- E. 川崎病

103、（A1 型题）提出治疗过程要信任和依靠来访者自身的潜力，而不是依靠治疗师的指导性工作的心理学派观点是

- A. 精神分析
- B. 行为主义
- C. 人本主义
- D. 认知心理
- E. 折中主义

104、（A1 型题）思维的重要特征是

- A. 分析性和综合性
- B. 间接性和概括性
- C. 抽象性和创造性
- D. 深刻性和全面性
- E. 上升性和决策性

105、（A1 型题）按照心身医学的观点，下列中属于心身疾病的是

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症
- C. 消化性溃疡
- D. 大叶性肺炎
- E. 精神发育迟滞

106、（A1 型题）心理评估的常用方法，不包括

- A. 观察法
- B. 会谈法
- C. 前瞻法
- D. 作品分析法
- E. 心理测验法

107、（A1 型题）在印度丛林有个狼抚养的孩子，他们与狼共同生活 7 年，发现之后将其带回人类，10 年后，他们还是不会人类的语言，只有一些简单的表达，但是他还是能够听懂狼的语言，这件事说明

- A. 人类的自制力存在关键期 C
- B. 儿童时期对人的发展很重要
- C. 人的语言与智力发展存在关键期
- D. 人格发展存在关键期
- E. 人接受一种语言后很难改变

108、（A2 型题）男性，22 岁，大学生。经常表现出尊师爱校，助人为乐的行为，不仅在学习上帮助同学，而且在生活上也照顾他人，并积极组织班级的集体活动，这种一贯的行为方式属于性格的

- A. 态度特征 A
- B. 理智特征
- C. 意志特征

- D.情绪特征
- E.行为特征

109、(A1型题)在下列各项中,能反映医学本质特征的是

- A.人才
- B.技术
- C.设备
- D.管理
- E.道德

110、(A1型题)最能反映医患关系性质的是医务人员与患者之间的

- A.信托关系
- B.陌生人之间的关系
- C.主动-被动关系
- D.类似父(母)子间的关系
- E.商品关系

111、(A1型题)世界上第一个安乐死合法化的国家是

- A.澳大利
- B.挪威
- C.比利时
- D.新西兰
- E.荷兰

112、(A1型题)对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的患者,停止采用人工干预方式抢救而缩短患者痛苦的死亡过程称为

- A.医生助死
- B.积极安乐死
- C.消极安乐死
- D.自愿安乐死
- E.非自愿安乐死

113、(A1型题)下列说法符合我国人类辅助生殖技术伦理原则的是

- A.对已婚女性可以实施商业性代孕技术
- B.对离异单身女性可以实施商业性代孕技术
- C.对任何女性都不得实施代孕技术
- D.对自愿的单身女性可以实施代孕技术
- E.对已婚女性可以实施亲属间的代孕技术

114、(A1型题)一名糖尿病患者,足部有严重溃疡,经治疗病情未减轻,并且有发生败血症的危险。根据会诊意见,主管医生在征得患者同意的前提下,对患者实施了截肢术。术后,患者情况良好。这种处置符合

- A.公益原则
- B.公正原则
- C.有利原则
- D.不伤害原则
- E.经济价值原则

115、(A1型题)在疾病三级预防中,做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作在

- A.第一级预防
- B.第二级预防
- C.第三级预防
- D.第一级预防和第二级预防
- E.第二级预防和第三级预防

- 116、(A1 型题)对正态分布曲线的描述错误的是
- A.正态分布曲线以均数为中心
  - B.正态分布曲线上下完全对称
  - C.正态分布曲线是左右完全对称的钟形曲线
  - D.正态分布曲线由两个参数固定
  - E.正态分布曲线在横轴均数上方所在处曲线为最高点
- 117、(A1 型题)某医师欲采用横断面调查研究的方法,调查高血压病在人群中的分布情况,选择最合适的指标为
- A.病死率
  - B.发病率
  - C.死亡率
  - D.患病率
  - E.二代发病率
- 118、(A1 型题)要想了解某种疾病在某一地区的危害情况,最初进行现况调查时,宜选用下列何种方法
- A.个案调查
  - B.抽样调查
  - C.普查
  - D.典型病例调整
  - E.住院病例调查
- 119、(A1 型题)在一种分析性研究中,计算了 RR,可说明暴露因素与发病的关联程度,该指标为
- A.发病率
  - B.发病密度
  - C.归因危险度
  - D.患病率
  - E.相对危险度
- 120、(A1 型题)未经有关部门批准,医师擅自开办诊所,卫生行政部门可采取的措施不包括
- A.没收违法所得
  - B.责令赔偿患者损失
  - C.没收药品、器械
  - D.吊销执业证书
  - E.取缔
- 121、(A1 型题)《执业医师法》规定对考核不合格的医师,卫生行政部门可以责令其暂停执业活动,并接受培训和继续医学教育,暂停期限是 3 个月至
- A.5 个月
  - B.6 个月
  - C.7 个月
  - D.8 个月
  - E.9 个月
- 122、(A1 型选择题)因抢救危急患者,未能及时书写病历的有关医务人员应当在抢救结束后规定的时限内据实补记病历,该时限要求是
- A.6 小时内
  - B.6 小时
  - C.8 小时
  - D.10 小时
  - E.12 小时
- 123、(A1 型题)《医疗事故处理条例》规定患者在发生医疗纠纷的时候可以封存和复印病历,下列资料中哪项属于可以封存但不能复印的病历资料



- A.会诊记录
- B.门诊病历
- C.手术及麻醉记录单
- D.病理报告单
- E.化验报告单

124、(A1型题)《医疗事故处理条例》规定,造成患者中度残疾,器官组织损伤,导致严重功能障碍的,属于几级医疗事故

- A.一级甲等
- B.一级乙等
- C.二级
- D.三级
- E.四级

125、(A1型题)关于医师出现下列情形医疗机构可取消其处方权,说法错误的是

- A.抗菌药物考核不合格的
- B.限制处方权后,仍出现超常处方且无正当理由的
- C.未按照规定开具抗菌药物处方,造成严重后果的
- D.开具抗菌药物处方未获得良好临床效果的
- E.未按照规定使用抗菌药物,造成严重后果的

126、(A2型题)患者,女,65岁,右上第一恒磨牙残根,高血压病8年余,未规律用药,测血压160/110mmHg。正确的处理方法是

- A.内科治疗高血压后再考虑拔除右上第一恒磨牙
- B.2%普鲁卡因加肾上腺素局麻下拔除右上第一恒磨牙
- C.2%利多卡因局麻下拔除右上第一恒磨牙
- D.口服安定半小时后拔除右上第一恒磨牙
- E.口服复方降压片半小时后拔除右上第一恒磨牙

127、(A2型题)男性,70岁。诉全口余留牙松动求治。患者无明显的全身系统性疾病。口腔检查:全口余留牙左下1,右下12345,松动I°~II°,拟一次拔除。正确的拔牙顺序是

- A.先拔除左下1
- B.先拔除右下1
- C.先拔除右下3
- D.先拔除右下4
- E.从右下5开始由右向左顺序拔除

128、(A2型题)男,35岁。拔除下6时,于牙颈部折断,断面平齐牙槽嵴此时。应采取的取根方法为

- A.翻瓣凿骨取根
- B.用丁字挺取根
- C.分根后取根
- D.用根钳取根
- E.用牙挺取根

129、(A2型题)男,20岁。右下颌中位水平阻生第三磨牙拔除术后4h,伤口仍出血。否认全身疾病史。分析出血原因。不包括

- A.未完全缝合软组织切口
- B.损伤下牙槽动脉
- C.牙槽骨内小血管破裂
- D.拔牙创感染后出血
- E.患者未遵医嘱

130、(A2型题)患者,男,23岁,右下后牙肿痛一周,张口困难,进食吞咽时疼痛2天。检查:右下第三磨牙萌出不全,近中阻生,远中牙龈龈瓣红肿,翼下颌皱襞处黏膜水肿,下颌支后缘内侧有轻度肿胀,深压痛,中度张口受限(一横指)。可能的诊断是

- A. 下颌第三磨牙急性冠周炎引起的颊间隙感染
- B. 下颌第三磨牙急性冠周炎引起的舌下间隙感染
- C. 下颌第三磨牙急性冠周炎引起的咽旁间隙感染
- D. 下颌第三磨牙急性冠周炎引起的翼下颌间隙感染
- E. 下颌第三磨牙急性冠周炎引起的下颌下间隙感染

131、(A2型题)患者,男,35岁,右下颌骨急性中央性骨髓炎,松动牙周溢脓,下列治疗方法错误的是

- A. 全身使用足量有效的抗生素
- B. 尽量保留患牙及其余松动牙
- C. 形成骨膜下脓肿后应尽早切开
- D. 引流不畅时可去除部分骨外板
- E. 营养支持

132、(A2型题)患者,男,41岁,右侧面部有瘻管,并排出浅黄色的黏稠脓液,患区皮肤呈紫红色,有不同程度的疼痛,确诊为放线菌病,此时何种治疗最佳

- A. 高压氧加口服碘化钾
- B. 抗生素治疗,首选青霉素
- C. 抗生素治疗加免疫治疗
- D. 脓肿形成后切开引流
- E. 病灶切除术

133、(A2型题)男性患者,65岁。经涎腺专家门诊以“右多形性腺瘤”收入院。以下所述及哪项与此诊断无关

- A. 患者有20年大量吸烟史
- B. 肿物增大缓慢
- C. 右侧腮腺表面均可触及结节状,质硬肿物
- D. 肿物活动度较好
- E. 该肿瘤女性发病率高于男性

134、(A2型题)患者,男,40岁。两侧腮腺反复肿胀疼痛1年,肿胀与进食有关。检查:两侧腮腺稍肿大,能打出肿大的腮腺轮廓,轻微压痛,导管口稍红,挤压腮腺导管口流出混浊“雪花样”唾液。为明确诊断,应做的辅助检查是

- A. 腮腺导管探诊
- B. B型超声波检查
- C. 腮腺造影
- D. 唇腺活检
- E. 实验室检查

135、(A2型题)25岁,孕34周,1周前开始有些乏力,食欲差,3天前病情加重,伴呕吐,巩膜发黄,神志欠清而入院,血压135/90mmHg,ALT454U/L,总胆红素177umol/L,尿蛋白(-)。最可能的诊断是

- A. 妊娠肝内胆汁淤积症
- B. 妊娠合并重症肝炎
- C. 妊娠期高血压疾病性肝损害
- D. 妊娠期急性脂肪肝
- E. 药物性肝损害

136、(A2型题)29岁,初孕妇,妊娠37周,有妊娠期糖尿病,胎心率140次/分,产前监护胎儿监护无刺激实验(NST)无反应型,首先采用的处理措施是

- A. 做OCT
- B. 行B型超声生物物理评分
- C. 人工破膜了解羊水性状
- D. 立即剖宫产
- E. 3日后复查NST

137、(A2型题) 患儿, 1岁, 因食欲差, 母乳少, 以米糊、稀饭喂养, 未添加其他辅食, 诊断为营养不良I度。最先出现的症状是

- A. 身高低于正常
- B. 体重不增
- C. 皮肤干燥
- D. 皮下脂肪减少
- E. 肌张力低下

138、(A2型题) 女婴, 8个月, 诊断为中度营养不良。开始供给热量每日应为

- A. 250kJ/kg(60kcal/kg)
- B. 300kJ/kg(70kcal/kg)
- C. 340kJ/kg(80kcal/kg)
- D. 375kJ/kg(90kcal/kg)
- E. 420kJ/kg(100kcal/kg)

139、(A2型题) 某单位职工, 男性, 48岁, 平时和同事相处甚难, 某同事想让其就诊心理咨询, 但该职工坚决反对, 心理医师也不主张这样的人来门诊治疗, 是因为心理治疗的性质有

- A. 学习性
- B. 自主性
- C. 实效性
- D. 应用性
- E. 操作性

140、(A2型题) 在为一名强迫症患者的治疗中, 医生鼓励患者回忆从童年起所遭受的精神创伤与挫折, 帮助他重新认识, 建立起现实性的健康心理, 这种疗法是

- A. 梦的分析
- B. 移情
- C. 自由联想
- D. 系统脱敏
- E. 自我调节

141、(A2型题) 某生参加高考前数月产生严重焦虑, 来到咨询室后, 该生讲述了其内心的恐惧与担心, 治疗师只是认真地倾听, 不做指令性指导, 这种心理疗法的理论属于

- A. 精神分析理论
- B. 认知理论
- C. 人本主义理论
- D. 心理生理理论
- E. 行为理论

142、(A1型题) 患者, 男, 34岁。因患不育症到某医院泌尿科诊治。为使医生更加了解病情, 患者将自己曾有过不检点的性行为告诉了医生, 希望医生能结合病史确定不育症的原因。然而, 该医生不知出于何种动机, 将此话传播到患者妻子的耳中, 致使患者妻子不能谅解丈夫而离婚, 以致发生患者始终不能谅解医生的纠纷案。从医生伦理学的角度分析, 在该纠纷中医生违背了下列医德范畴

- A. 权利
- B. 情感
- C. 良心
- D. 保密
- E. 荣誉

143、(A2型题) 患者, 女, 26岁。因右侧乳腺癌行右侧乳房全切和周围淋巴结廓清术。术中经检查证实, 病人左侧乳房有腺瘤, 伴有腺体增生活跃, 在未征求患者及家属意见的情况下, 医生又切除了患者的左侧乳房。那么, 医生违背了患者的

- A. 基本医疗权
- B. 监督自己医疗权利的实现
- C. 知情同意权

- D.保密和隐私权
- E.平等医疗权

144、(A2型题)某患者要做腰穿检查,患者有恐惧感,从医德要求考虑,临床医生应向患者做的主要工作是

- A.要征得患者知情同意
- B.告其做腰穿的必要性,嘱患者配合
- C.告其做腰穿时应注意的事项
- D.因诊断需要,先动员,后检查
- E.动员家属做患者思想工作

145、(A2型题)2003年检查某班13岁学生50名,其中患龋病者30名,2年后对这50名学生检查,发现其中10名学生有新的龋损,则这班学生2年的龋病发病率为

- A.20%
- B.30%
- C.40%
- D.50%
- E.60%

146、(A2型题)某幼儿园大班11名6岁儿童接受百白破疫苗注射后,其抗体滴度分别是1:20, 1:20, 1:40, 1:40, 1:80, 1:80, 1:160, 1:160, 1:320, 1:640,描述其抗体滴度的集中趋势的指标应选用

- A.标准差
- B.极差
- C.算术平均数
- D.几何平均数
- E.四分位间距

147、(A1型题)某医院抽样调查得100名健康人血清,求得平均数为4.800,标准差为0.7920,求其标准误为

- A.0.0792
- B.0.7920
- C.0.0079
- D.0.048
- E.7.92

148、(A2型题)医疗保健人员未按规定报告传染病疫情,造成传染病传播、流行或者其他严重后果,尚未构成犯罪的,由卫生行政部门给予的行政处分是

- A.警告、记过或记大过
- B.记过、记大过或降级
- C.记大过、降级或撤职
- D.降级、撤职或开除
- E.撤职、开除或拘留

149、(A1型题)关于下列抗菌药处方权的授予,正确的说法是

- A.具有中级以上专业技术职务任职资格的医师,才可授予特殊使用级抗菌药物处方权
- B.具有中级以上专业技术职务任职资格的医师,才可授予限制使用级抗菌药物处方权
- C.具有高级以上专业技术职务任职资格的医师,才可授予限制使用级抗菌药物处方权
- D.具有初级以上专业技术职务任职资格的医师,才可授予限制使用级抗菌药物处方权
- E.具有初级以上专业技术职务任职资格的医师,才可授予特殊使用级抗菌药物处方权

150、(A1型题)公民临床用血时,交付用于血液的费用不包括

- A.血液采集费用
- B.血液购买费用
- C.血液储存费用
- D.血液分离费用
- E.血液检验费用

## 答案

1、正确答案：E

答案解析：牙源性角化囊性瘤一般不会损伤下牙槽神经,因此不会出现下唇麻木。

2、正确答案：D

答案解析：

3、正确答案：E

答案解析：下颌骨牙源性角化囊性瘤没有浸润生长的生物学特性,不需要同时去除周围组织。

4、正确答案：A

答案解析：诊断的金标准就是切取活检。

5、正确答案：C

答案解析：鳞状细胞癌首选的化疗药物是平阳霉素。

6、正确答案：E

答案解析：最常见的远处转移部位为肺。

7、正确答案：E

答案解析：此题要牢记不同浓度的碘酊所应用的部位。用于消毒头皮部的碘酊浓度为3%,用于消毒颌面、颈部的碘酊浓度为2%,用于消毒口腔黏膜的碘酊浓度为1%,用于消毒皮肤的氯己定浓度为0.5%,用于消毒口腔及创口的氯己定浓度为0.1%。

8、正确答案：D

答案解析：

9、正确答案：C

答案解析：

10、正确答案：B

答案解析：

11、正确答案：A

答案解析：

12、正确答案：B

答案解析：

13、正确答案：A

答案解析：

14、正确答案：D

答案解析：

15、正确答案：C

答案解析：止血→压迫止血(碘仿纱条填塞压迫止血)→结扎止血(阻断止血法、贯穿缝合法)→药物止血(降压止血)。

16、正确答案：E

答案解析：上颌窦提升术后二期种植手术间隔时间为6至9个月。

17、正确答案：B

答案解析：上颌4个月,下颌3个月。

18、正确答案：A

答案解析：上颌4个月,下颌3个月。

19、正确答案：E

答案解析：缺牙区植骨后种植骨结合时间至少为6至9个月。

20、正确答案：A

答案解析：没有细菌侵入的创口属于无菌创口。

21、正确答案：A

答案解析：该种情况也属于无菌创口。

22、正确答案：B

答案解析：

23、正确答案：D

答案解析：

24、正确答案：C

答案解析：

25、正确答案：A

答案解析：

26、正确答案：E

答案解析：

27、正确答案：A

答案解析：普鲁卡因穿透力弱,不适合表面麻醉。

28、正确答案：A

答案解析：第二乳磨牙过早缺失影响最大。乳尖牙早失造成恒尖牙异位萌出,常见唇侧萌出。

29、正确答案：A

答案解析：能使用旋转力拔除的牙齿通常需要先要将牙齿摇松,再略施加旋转力将其拔出,可施加旋转力的牙齿有:11、12、13、21、22、23、33、34、35、43、44、45(上中切牙、上侧切牙、上尖牙,下尖牙、下前磨牙)排除法即可选择A。

30、正确答案：A

答案解析：

31、正确答案：E

答案解析：口腔颌面外科常用的引流物有以下几种:片状引流、纱条引流、管状引流、负压引流。其中负压引流优点较多,具有较强的引流作用,而且不需加压包扎伤口,患者感觉舒适;因创口内是负压,组织间贴合紧密,利于创口愈合,也不易继发感染。

32、正确答案：E

答案解析：皮样或表皮样囊肿多见于儿童及青年,皮样囊肿好发于口底、颞下,表皮样囊肿好发于眼睑、额、鼻、眶外侧、耳下等部位。

33、正确答案：E

答案解析：皮脂腺囊肿常见于皮脂腺丰富的颜面部,小的如豆,大则可至小柑橘样。囊肿呈圆形,位于皮内,并向皮肤表面突出,囊壁与皮肤紧密黏连,中央可有一小黑色素点。临床上可以根据这个主要特征与表皮样囊肿作鉴别。灰白色凝乳状、有臭味的内容物偶可流出。

34、正确答案：D

答案解析：开口末的弹响是翼外肌亢进的典型突出表现。

35、正确答案：E

答案解析：从正常组织到发生癌变的中间阶段称为癌前病变。白斑属于癌前病变,但白斑不一定会癌变。

36、正确答案：C

答案解析：唇裂修复的时间为:单侧 3~6 个月,体重 5~6 kg 以上;双侧 6~12 个月。腭裂修复的时间为:12~18 个月。

37、正确答案：B

答案解析：X 线片可见关节后间隙变窄,前间隙变宽。

38、正确答案：B

答案解析：阻塞性窒息原因包括异物阻塞咽喉部、组织移位和肿胀与血肿。吸入血液或呕吐物窒息属于吸入性窒息。

39、正确答案：A

答案解析：牙槽突骨折常是外力直接作用牙槽突所致,多见于上颌前部。

40、正确答案：C

答案解析：

41、正确答案：B

答案解析：颌面部最常用绷带为卷带(普通绷带)。

42、正确答案：E

答案解析：针尖与皮肤呈 90°角。

43、正确答案：D

答案解析：道理同掐大腿,两手指离得越近,掐的越深,掐住的肉越往外鼓,呈外翻趋势。

44、正确答案：D

答案解析：可检查颈深、浅淋巴结。

45、正确答案：E

答案解析：耳漏:颅中窝；鼻漏:颅前窝；禁止作耳道与鼻腔填塞与冲洗,以减少引起颅内感染的可能。

46、正确答案：D

答案解析：

47、正确答案：C

答案解析：拔牙创出血和凝血块形成(15 min~30 min)。

48、正确答案：D

答案解析：

49、正确答案：A

答案解析：囊性水肿为淋巴管畸形,不属于肿瘤,不会恶变。

50、正确答案：C

答案解析：常用的硬化剂为 5%鱼肝油酸钠、平阳霉素、无水乙醇。

51、正确答案：E

答案解析：多发性角化囊肿同时伴发皮肤基底细胞痣(或基底细胞癌),分叉肋、眶距增宽、颅骨异常、小脑镰钙化等症状时,称为“痣样基底细胞癌综合征”或“多发性基底细胞痣综合征”。

52、正确答案：D

答案解析：多形性腺瘤又名混合瘤,是唾液腺肿瘤中最常见者,属临界瘤。好发部位大唾液腺:腮腺。小唾液腺者,以腭部为最常见。年龄、性别 30~50 岁为多见,女性多于男性,多形性腺瘤生长缓慢,常无自觉症状,病史较长。肿瘤界限清楚,质地中等,扪诊呈结节状,一般可活动,硬腭处可不活动,肿瘤长大后除表现畸形外,一般不引起功能障碍;突然出现生长加速,并伴有疼痛、面神经麻痹等症状时,应考虑恶变。

53、正确答案：E

答案解析：沃辛瘤又名腺淋巴瘤,绝大多数肿瘤位于腮腺后下极,可有消长史, <sup>99mTc</sup>核素显像呈“热结节”。

54、正确答案：B

答案解析：茎乳孔以外:面瘫(同侧);鼓索与镫骨肌神经节之间:面瘫+味觉丧失+唾液腺分泌障碍(同侧);镫骨肌与膝状神经节之间:面瘫+味觉丧失+唾液腺分泌障碍+听觉改变(同侧);膝状神经节:面瘫+味觉丧失+唾液腺、泪腺分泌障碍+听觉改变(同侧);脑桥与膝状神经节之间:除面瘫外,感觉与分泌功能障碍一般均较轻(同侧);核性损害:面瘫+轻度感觉与分泌障碍,但是发生对侧偏瘫;累及皮质延髓束:发生对侧偏瘫。

55、正确答案：D

答案解析：施墨试验用于检测泪腺分泌功能。

56、正确答案：E

答案解析：颞下颌关节强直分为真性关节强直和假性关节强直两类。前者是因关节内纤维性或骨性粘连引起,也称关节内强直;后者是因软组织损伤产生的瘢痕限制下颌运动造成的,也称颌间挛缩。颞下颌关节强直一般采用手术治疗。

57、正确答案：A

答案解析：上颌骨较为固定,骨折片移位的主要原因是骨折的类型和损伤力量的大小。

58、正确答案：D

答案解析：下颌骨占据面下 1/3 及两侧面中 1/3 的一部分,位置突出,易遭受损伤而导致骨折发生率高。

59、正确答案：D

答案解析：引起窒息的原因是由于降颌肌群牵引正中骨折段向后下移动继发舌体的后坠。

60、正确答案：D

答案解析：根据肌肉附着和牵拉方向选择。

61、正确答案：B

答案解析：单纯颌间固定,下颌骨一般固定 4~6 周,上颌骨 3~4 周。

62、正确答案：D

答案解析：上颌骨血供丰富。

63、正确答案：C

答案解析：LeFort III 型骨折为上颌骨高位骨折或颅面分离骨折,易伴有颅底骨折或颅脑损伤,出现耳、鼻出血或脑脊液漏。

64、正确答案：C

答案解析：颌骨骨折伴发脑脊液鼻漏进行鼻腔冲洗,协助引流易引发颅内感染。

65、正确答案：D

答案解析：游离的组织一般不应离体超过 6 h。



66、正确答案：C

答案解析：

67、正确答案：E

答案解析：分化良好的良性肿瘤的特征。

68、正确答案：D

答案解析：

69、正确答案：A

答案解析：乳头状瘤、多形性腺瘤、成釉细胞瘤为临界瘤,有恶性倾向。

70、正确答案：B

答案解析：细胞毒素类抗癌药物代表:氮芥、环磷酰胺。

71、正确答案：C

答案解析：唇颊舌部触诊选用双指双合诊。

72、正确答案：C

答案解析：成釉细胞瘤囊肿内含黄褐色囊液。

73、正确答案：B

答案解析：戊二醛杀菌作用较缓慢,以2%碱性戊二醛浸泡医疗器材进行灭菌,在2分钟内,可杀灭细胞繁殖体,10分钟内可杀灭真菌、结核杆菌,15~30分钟可杀灭乙型肝炎病毒,杀灭细菌芽胞则需4~12小时。

74、正确答案：C

答案解析：血外渗性囊肿为损伤后引起骨髓内出血机化伸出后而形成,与牙组织本身无关。

75、正确答案：A

答案解析：根尖囊肿是有慢性炎症引起的。

76、正确答案：D

答案解析：炎症早期,无全身症状时应以局部保守治疗为主。

77、正确答案：C

答案解析：

78、正确答案：D

答案解析：海绵状血管瘤就是静脉畸形，D是动静脉畸形的特点。

79、正确答案：C

答案解析：恶性黑色素瘤多来自交界痣。

80、正确答案：D

答案解析：慢性阻塞性腮腺炎导管口轻微红肿,挤压腮腺可从导管口流出浑浊的雪花样或黏稠的蛋清样唾液。

81、正确答案：D

答案解析：慢性复发性腮腺炎和慢性阻塞性腮腺炎造影的X线表现区分是前者主要表现为末梢导管的点球状扩张及排空迟缓,而后者主要表现为主导管的扩张不整呈腊肠样变。

82、正确答案：D

答案解析：

83、正确答案：D

答案解析：

84、正确答案：B

答案解析：腮腺区创口的包扎应施以一定压力并应赋予弹性,以免发生涎痿。

85、正确答案：D

答案解析：氯己定消毒,皮肤为 0.5%,口腔内及创口消毒为 0.1%。

86、正确答案：C

答案解析：口腔内三重结。

87、正确答案：E

答案解析：对放疗敏感的肿瘤有恶性淋巴瘤、浆细胞肉瘤、未分化癌、尤文肉瘤、淋巴上皮癌等。对放射性中度敏感的肿瘤是鳞状细胞癌及基底细胞癌。对放射线不敏感的肿瘤有骨肉瘤、纤维肉瘤、肌肉瘤、脂肪肉瘤、腺癌、恶性黑色素瘤等。

88、正确答案：D

答案解析：

89、正确答案：E

答案解析：

90、正确答案：C

答案解析：检查张口度以上下中切牙切缘之间的距离为准,正常人张口度约为自身食指、中指、无名指三指末节的宽度,平均 3.7 cm。

91、正确答案：C

答案解析：

92、正确答案：E

答案解析：分清骨化性纤维瘤与骨纤维异常增殖症的 x 线区别。

93、正确答案：E

答案解析：痈好发于唇部,上唇多于下唇,男性多于女性,伴有剧烈疼痛,多数毛囊、皮脂腺及周围组织的急性炎症。

94、正确答案：B

答案解析：游离皮片移植皮片越厚越不易存活,越耐摩擦,色泽变化小,收缩越小。

95、正确答案：D

答案解析：子宫内膜周期的分泌期中期,腺体内的分泌上皮细胞顶端胞膜破裂,细胞内的糖原排入腺腔称顶浆分泌。腺上皮细胞呈立方形或低柱状为增生期早期内膜表现;腺上皮细胞核下开始出现含糖原小泡,称核下空泡,此为分泌期早期的组织学特征;内膜腺体开口面向宫腔,有糖原等分泌物溢出为分泌期晚期内膜表现;如月经周期为 28 日,分泌期中期在月经周期第 20~23 日。

96、正确答案：A

答案解析：雄烯二酮是雌二醇和雌酮的前体物质,而雌酮和雌二醇可相互转化;女性的雄激素主要来自肾上腺;排卵后黄体能同时分泌雌激素和孕激素;排卵前卵泡内膜细胞除分泌雌激素外,还分泌少量雄激素,不分泌孕激素,但成熟卵泡的颗粒细胞在 LH 峰的作用下开始分泌少量孕酮。

97、正确答案：C

答案解析：IB 期靠肉眼有时能诊断;癌侵及主韧带一部分为 II B 期;癌使肾功能丧失属于 III B;膀胱黏膜有癌浸润属 IV A 期。

98、正确答案：E

答案解析：我国 1 岁内小儿需完成的基础计划免疫包括卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百日咳-白喉-破伤风混合疫苗、麻疹疫苗。

99、正确答案：A

答案解析：疫苗初种时间是：出生时：卡介苗、乙肝疫苗；2个月：脊髓灰质炎疫苗；3个月：百白破混合疫苗；8个月：麻疹疫苗。

100、正确答案：E

答案解析：

101、正确答案：C

答案解析：

102、正确答案：E

答案解析：

103、正确答案：C

答案解析：考核医学心理学主要理论。人本主义学派强调“患者中心疗法”要求对来访者无条件的进行积极关注,反对采取生硬和强制态度对待患者,主张医师要真诚关注自己的感情,通过认真的“听”达到真正的理解,在真诚和谐关系中启发患者运用自我指导能力促进本身内在的健康成长。题中强调患者的自身潜力,属于人本主义的观点。故本题正确答案为C。

104、正确答案：B

答案解析：考核思维的概念与特征。思维是人脑间接地概括地对客观事物的反应。间接性和概括性是思维过程的主要特征。①思维的概括性是指在大量感性材料的基础上,把一类事物共同的特征和规律抽取出来加以概括。②思维的间接性是指人们借助于一定的媒介和知识经验对客观事物进行间接的认识。故本题正确答案为B。

105、正确答案：C

答案解析：本题考核心身疾病的诊断。消化性溃疡是身心疾病,因为应激会导致消化性溃疡的发生,而精神分裂症、抑郁症、精神发育迟滞仅为心理疾病而无躯体障碍,大叶性肺炎仅有躯体障碍。故本题正确答案为C。

106、正确答案：C

答案解析：考核心理评估的几种常用方法。心理评估的常用方法有调查法、观察法、会谈法、作品分析法、心理测验法。故本题正确答案为C。

107、正确答案：C

答案解析：本题考核儿童智力发展时间。①语言发育最关键时期1~3岁(幼儿期);②人格发展最关键时期3~7岁;③智力发展最关键时期7岁前。故本题正确答案为C。

108、正确答案：A

答案解析：考核性格的特征。性格的特征包括态度特征、情绪特征、理智特征、意志特征。态度特征主要表现为对各种社会关系的处理上,其中对社会、集体或他人的态度上起主导作用。意志特征是个体对自己行为自觉调整和控制的水平特点,意志特征的个体差异表现在意识品质的自觉性、果断性、坚决性和自制力四个方面。例中表现的就是性格的态度特征,故本题正确答案为A。

109、正确答案：E

答案解析：考核医学的本质特征。医学伦理学是运用一般伦理学原则解决医疗卫生实践和医学发展过程中的医学道德问题和医学道德现象的学科,故本质特征就是道德。故本题正确答案为E。

110、正确答案：A

答案解析：考核医患关系。医患关系实质是一种信托关系,即在医疗活动中,医患双方都因为和必须遵守一定的道德原则和规范。故本题正确答案为A。

111、正确答案：C

答案解析：考核安乐死合法化的国家。荷兰是世界上第一个安乐死合法化的国家,比利时是第二个在合法化的国家,安乐死在我国尚未合法化的,只能做临终关怀。故本题答案为C

112、正确答案：C

答案解析：考核安乐死的概念和类型的理解。①积极的(主动的)安乐死,指采取促使患者死亡的措施,结束其生命,如当患者无法忍受疾病终末期的折磨时。②消极的(被动的)安乐死,即对抢救中的患者如垂危患者不给予或撤除治疗措施,任其死亡。故本题正确答案为C。

113、正确答案：C

答案解析：考核人类辅助生殖技术伦理原则。①医务人员有义务告知受者通过人类辅助生殖技术出生的后代与自然受孕分娩的后代享有同样的法律权利和义务,包括后代的继承权、受教育权、赡养父母的义务、父母离异时对孩子监护权的裁定等;②医务人员有义务告知接受人类辅助生殖技术治疗的夫妇,他们通过对该技术出生的孩子(包括对有出生缺陷的孩子)负有伦理、道德和法律上的权利和义务;③如果有证据表明实施人类辅助生殖技术将会对后代产生严重的生理、心理和社会损害,医务人员有义务停止该技术的实施;④医务人员不得对近亲间及任何不符合伦理、道德原则的精子 and 卵子实施人类辅助生殖技术;⑤医务人员不得实施代孕技术;⑥医务人员不得实施胚胎赠送助孕技术;⑦在尚未解决人卵胞浆移植和人卵核移植技术安全性问题之前,医务人员不得实施以治疗不育为目的的人卵胞浆移植和人卵核移植技术;⑧同一供者的精子、卵子最多只能使5名妇女受孕;⑨医务人员不得实施以生育为目的的嵌合体胚胎技术。故本题正确答案为C。

114、正确答案：C

答案解析：有利原则是指医务人员的诊治行为以保护病人的利益、促进病人健康、增进其幸福为目的。故选C。

115、正确答案：B

答案解析：本题考核三级预防策略。①一级预防:病因预防(病因明确的疾病:传染病、职业病)②二级预防:三早(早发现、早诊断、早治疗)(多指病因不太明确的或多病因:肿瘤)③三级预防:防伤残、促康复、预防并发症(病因不明的疾病)。故本题正确答案为B。

116、正确答案：B

答案解析：本题考核正态分布曲线的特点。正态分布曲线又名高斯分布,因形态也称钟型曲线,有以下特征:①正态曲线在横轴上方均数处最高。②正态分布以均数为中心,左右对称,而非上下对称。③正态分布有两个参数固定,即均数和标准差,均数决定曲线的位置,标准差决定曲线的形状。④正态曲线下面积的分布有一定规律。故本题正确答案为B。

117、正确答案：D

答案解析：本题考核疾病分布常用指标。①病死率是指一定时期内,患某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例,即该病死亡人数/患该病人数,主要用于说明疾病的严重程度,也可用来反应医疗水平和诊断能力。②发病率是表示特定人群在一定时间内(一般为一年)发生某病新病例出现的频率。③患病率指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占的比值,适用于病程长的慢性病或流行情况,患病率=新旧病例/平均人口数。④死亡率是指在一定时间内(一般为一年),某人群中死于某病(或死于所有原因)的频率。⑤继发性率又称“二代发病率”,指某传染病易感接触者中,在最短潜伏期最长潜伏期之间发病的人数占所有易感人群总数的百分率。故本题正确答案为D。

118、正确答案：B

答案解析：本题考核流行病学调查方法。要了解某种疾病在某地区的危害现况,首选采取抽样调查方法,以便推测对整个地区的危害现状。这种方法较为经济和有效。故正确答案为B。

119、正确答案：E

答案解析：本题考核相对危险度(RR)。相对危险度:是反映暴露因素与发病(死亡)有无关联的指标。 $RR > 1$ ,暴露因素与疾病有正关联; $RR = 1$ ,与疾病无关联; $RR < 1$ ,有负关联。故本题正确答案是E。

120、正确答案：B

答案解析：根据《执业医师法》第三十九条:未经批准擅自开办医疗机构行医,或者非医师行医的,由县级以上人民政府卫生行政部门予以取缔,没收其违法所得及其药品、器械,并处十万元以下的罚款;对医师吊销其执业证书;给患者造成损害的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。本题没有涉及造成损害,故本题正确答案为B。

121、正确答案：B

答案解析：根据《中华人民共和国执业医师法》第三十一条,受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业标准,对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核。对考核不合格的医师,县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动3个月至6个月,并接受培训和继续医学教育,暂停执业活动期满,再次进行考核,如考核合格的,允许其继续执业;对考核还不合格的,由县级以上人民政府卫生行政部门注销注册,收回医师执业证书。故本题正确答案为B。

122、正确答案：A

答案解析：无

123、正确答案：A

答案解析：《医疗事故管理条例》规定:①客观病历资料可复印:如仪器、化验单,门诊病例等复印病历时可按规定收取工本费;②主观病历资料绝对不可复印包括:病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见等。复印病历时可按规定收取工本费。故本题正确答案为A。

124、正确答案：C

答案解析：《医疗事故处理条例》规定,根据对患者人身造成的损害程度,将医疗事故分为四级。一级系指造成患者死亡或重度残疾、植物人状态;二级系指造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍;三级系指造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍;四级系指造成患者明显人身损害的其他后果的医疗事故。故本题正确答案为C。

125、正确答案：D

答案解析：《抗菌药物临床应用管理办法》规定:①抗菌药物考核不合格的;②限制处方权后,仍出现超常处方且无正当理由的;③未按照规定开具抗菌药物处方,造成严重后果的;④开具处方牟取不正当利益的;⑤医师处方和药师处方调剂资格取消后,在6个月内不得恢复期处方权和药物调剂资格。故本题正确答案为D。

126、正确答案：A

答案解析：高血压患者血压低于24/13.3 kPa(180/100 mmHg)时方可拔牙,否则应经内科治疗高血压后再考虑拔牙。

127、正确答案：E

答案解析：由内向外,利于操作,也防止感染。

128、正确答案：C

答案解析：断面平齐牙槽嵴,牙钳夹不住,多根牙先分根再取根。

129、正确答案：D

答案解析：拔牙术后4h仍出血,根据时间排出感染后出血。

130、正确答案：D

答案解析：根据现病史和口腔检查可以很容易判定急性智齿冠周炎,“翼下颌皱襞处黏膜水肿,下颌支后缘内侧有轻度肿胀,深压痛,中度张口受限(一横指)”根据部位和症状考虑为翼下颌间隙感染。

131、正确答案：B

答案解析：急性中央性骨髓炎的外科治疗应及早拔除病灶牙及相邻的松动牙,使脓液从拔牙窝内排出。

132、正确答案：E

答案解析：ABCDE为放线菌病的治疗方法。该题患者症状重,可考虑病灶切除术。

133、正确答案：A

答案解析：A与腺淋巴瘤有关。

134、正确答案：C

答案解析：根据题述患者的病史、症状、体征,考虑为慢性阻塞性腮腺炎,行腮腺造影检查可明确诊断。腮腺造影对腮腺炎症有重要的诊断价值。

135、正确答案：B

答案解析：重型肝炎表现为急性肝炎的症状明显加重,总胆红素超过 171  $\mu\text{mol/L}$ ,出现肝性脑病。

136、正确答案：B

答案解析：NST 无反应型,需进一步行 B 型超声检查以确定胎儿宫内情况。

137、正确答案：B

答案解析：

138、正确答案：A

答案解析：

139、正确答案：B

答案解析：考核心理治疗的性质。心理治疗与一般的医学治疗有许多不同,其中病人的自主性是一个重要区别。尽管该职工可能存在着一一定的心理问题,需要心理咨询,但如果他自己并不认可自己存在心理问题,即便来咨询也会有很强的抵触情绪,对咨询效果也会带来很大的负面影响,因此没有自主性的人是不宜作心理咨询和治疗的。故本题正确答案为 B。

140、正确答案：C

答案解析：考核自由联想的概念。自由联想要求受治疗者讲出他所有的想法:正在想什么,包括突然出现的念头,完全不考虑是否有逻辑关系,是否合乎道德伦理,是否有意义或恰当。在自由联想时,要以患者为主,医生不要随意打断,只做适当的引导即可。一般来说,医生往往鼓励患者回忆从童年起所遭遇到的一切经历或精神创伤与挫折,从中发现那些与病情有关的心理因素。自由联想的最终目的,是发掘患者压抑在潜意识内的致病情结或矛盾冲突,把他们带到意识域,使患者对此有所领悟,并重新建立现实性的健康心理。故本题正确答案为 C。

141、正确答案：C

答案解析：本题考核人本主义的治疗。美国心理学家罗杰斯提出,人本主义的治疗的特点:以“患者为中心”的疗法,将医患关系视为为改变和成长的最重要的治疗因素。此案例患者因高考而焦虑,心理医师一患者为中心,只是认真地倾听,不做指令性指导,是遵循人本主义的理论。故本题正确答案为 C。

142、正确答案：D

答案解析：医学伦理学的基本范畴主要有权利、义务;情感、良心;审慎、保密等。医疗活动中的保密是指医务人员保守在为病人诊治疾病的医疗活动中获得的医疗秘密,它通常包括患者及其家庭隐私、独特的体征或畸形、病人不愿让别人知晓的病情以及不良诊断和预后等任何患者不想让他人知道的事情。故选 D。

143、正确答案：C

答案解析：本题考核医学伦理学的基本原则的理解。知情同意权:患者有权知晓自己的病情,并对医务人员所采取的防治医疗措施决定取舍;知情同意权是由知情、理解、同意三个要素所构成的。医生切除患者腺瘤的行为对患者是有利的,但却违背了患者的知情同意权。故本题正确答案为 C。

144、正确答案：A

答案解析：考核辅助检查对临床医生的道德要求。医师在做辅助检查时应征得患者知情同意、尽职尽责。有些患者对某些检查,如腰穿、骨穿、内镜等,因惧怕痛苦而拒绝检查,只要这些检查是必要的,医生应尽职尽责地向患者解释和规劝,以便尽早确定诊断和进行治疗,不能听其自然而不负责任,也不能强制检查而剥夺患者的自主权。故本题正确答案为 A。

145、正确答案：A

答案解析：本题考核发病率的计算。发病率是表示特定人群在一定时间内(一般为一年)发生某病新病例出现的频率,即发病率=新病例数/暴露人口数=10/50。故本题正确答案为 A。

146、正确答案：D

答案解析：本题考核几何均数的理解和应用。几何平均数常用来反映一组含多个数量级的数据的集中位置,适用于等级资料,尤其是原始资料的对数呈正态分布的计量资料,如抗体滴度、细菌计数、药物平均效价等。故本题正确答案为 D。

147、正确答案：A

答案解析：本题考核标准误的计算。标准误是样本均数的标准差,标准误=标准差/根号 n(n 代表样本含量)。故本题正确答案为 A。

148、正确答案：D

答案解析：《传染病防治法》规定未按照规定报告传染病疫情,或者隐瞒、谎报、缓报传染病疫情的,造成传染病传播、流行或者其他严重后果的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予降级、撤职、开除的处分。故本题正确答案为 D。

149、正确答案：B

答案解析：《抗菌药物临床应用管理办法》规定:(1)非限制使用级:长期临床应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物;非限普通医师均可开据;(2)限制使用级:长期临床应用证明安全、有效,耐药性影响较大,或价格相对较高,必须中级职称以上才可开具;(3)特殊使用级:具有以下情形之一的抗菌药物①具有明显或者严重不良反应,不宜随意使用的药物;②需要严格控制使用,避免细菌过快产生耐药的抗菌药物;③疗效、安全性方面的临床资料较少;④价格昂贵,如:四代头孢等,特殊使用级必须高级职称以上医师开具。故本题正确答案为 B。

150、正确答案：B

答案解析：根据《中华人民共和国献血法》第十四条,公民临床用血时只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用;具体收费标准由国务院卫生行政部门会同国务院价格主管部门制定。无偿献血者临床需要用血时,免交前款规定的费用;无偿献血者的配偶和直系亲属临床需要用血时,可以按照省、市、自治区、直辖市人民政府的规定免交或者减交前款规定的费用。不包括血液购买费用。故本题正确答案为 B。